

理

瀚

駢

文

理瀹駢文

原名外治醫說

錢塘吳師機尙死學

原名

外治無專書先賢洞達元奧不必以是爲說也
世日降則道日微論日卑亦自然之勢耳篇中
歷陳外治之善方隨症列法在其中繁而不節
取便覽也俚而不文取易曉也自知於道無得
以其搜羅彙萃閱十數寒暑而後成此亦旣耗
其心力姑存此說以聽用者之消息焉語云拙
工療病不如不療或不療之療而可進一說歟
醫者意也藥者療也醫不能活人雖熟讀金匱石室之
書無益也藥不能中病雖廣搜橘井杏林之品無當也

在昔集驗之論傷寒則曰傷寒症候難辨慎勿輕聽人

言妄投湯藥濟衆之論瘟疫則曰瘟疫不拘於胗古方

今多不驗弗藥無妨節庵語即張元素古方今病不相能之意又如養葵所

著嵩崖所輯謂夫咳嗽吐衄未必成瘵也服四物知柏

之類不已則瘵成矣所謂非瘵而治成瘵是也胸腹痞滿未必成脹

也服山查神麴之類不已則脹成矣面浮肘腫未必成

水也服泄氣滲利之類不已則水成矣氣滯痞塞未必

成噎也服青皮枳殼之類不已則噎成矣不獨此也干

金云孫眞人著消渴三忌酒色使不服藥亦可漢卿云寶漢卿著

瘡瘍瘡瘍痘疹諸症傷寒痘疹以不服藥爲上廣瘡服輕粉尤害事診

曰服藥於未病

亦即聖人不治已病治未病之意

此攝生之旨甚言病

之可以不藥也

按攝生要言謂髮宜多梳面宜多擦目宜常運耳宜常彈舌宜抵腭齒宜數叩

津宜數咽濁宜常呵背宜常煖胸宜常護腹宜常摩穀

道宜常撮足心宜常擦皮膚宜常乾沐浴大小便宜閉

口勿言數事人人可能止行之有效實治未病之良方

爲外治之首務也○又有四要一慎風寒汗浴當風衝

犯雪霜輕爲感冒重則中傷二節飲食酒毒上攻熏灼

肺金厚味膏粱變生大疔三惜精神多言耗氣喜事煩

心名利熱中房勞喪精四戒嗔怒肝木乘脾必生殭泄

男忿嘔血女鬱不月此非是養生空言實病之外感內

傷悉因于此四要乃不又曰不治得中醫按漢書藝文志經方者本

藥之真詮外治之原也又曰不治得中醫按漢書藝文志經方者本

草石之寒溫量疾病之淺深假藥味之滋因氣感之宜

辨五苦六辛致水火之齊以通閉解結反之於平及失

其宜者以熱益熱以寒增寒精氣內傷不見於外是所

獨失也故諺曰有病不治常得中醫又唐書裴濟傳載

孫思邈云凡人無故不宜服藥藥氣偏有所助令人臟

氣不平二說合觀知古人惟恐人之好服藥而不藥爲

中醫之說亦非僅傷寒然也余此謹疾之道亦謂醫之

之外治實申古不治得中之意

多非其治也以上歷引古語之不服藥者爲證可見自傷寒以及瘡瘍無不然也

蓋誠有

鑒於良工之難得而特戒夫毒物之是嘗思其患以防

其危其心苦而其詞切雖似激焉豈非愛歟至於情欲

之感非藥能愈

七情之病當以情治恐可治喜以遽迫死心之言怖之悲可治怒以愴悻苦楚

之言感之喜可治憂以謔浪褻狎之言娛之怒可治思以污辱欺罔之言觸之思可治恐以慮彼忘此之言奪

之○欲遂

卒暴之遭有醫莫及

凡壓縊溺凍魔五絕及卒中暴死醫緩不濟急

救法兩人以竹管吹其耳或生半夏末吹鼻并吹耳心頭溫者一日猶可活醒灌生薑湯解毒再論治或用皂

角細辛吹○詳觀洗冤錄

凡爲衆所知者不煩言而解已然有勢不

能靜待者亦有情不能漠視者將聽其因噎而廢食乎

抑任其飲酖以止渴乎欲籌畫乎萬全聊調停於兩可

夫藥熨本同乎飲汁而膏摩何減於燔鍼皆見內經○

椒乾薑桂心漬酒中浸以棉絮布巾用生桑炭炙巾熨

寒痺所刺處是也膏摩如風中血脉而用馬脂以摩其

急以潤其痺以通其血脉更用白酒和桂以塗其緩以

和其營衛以通其經絡是也此用膏之始也○燔針焮

鍼見素問仲景謂之燒針今之太乙雷火等鍼卽是○

按太乙針樊觀察所刻范氏者爲最著治風氣及一切

內外百病寒者正治熱者從治用艾絨三兩硫磺二錢

麝五分冰片七分乳香沒藥丁香松香桂枝杜仲枳殼

皂角細辛白芷川芎獨活雄黃山甲一錢火紙捲藥末

糊桑皮紙六七層如爆竹式長五寸徑圍一寸五分雞

蛋清刷之陰乾密收臨用燭火上燒紅放紅布上按穴

針之正人穴二十一會神庭上星臨泣客主人天突

肩髃期門上腕中腕下腕曲池手三里天樞氣海中極

關元風市內庭大敦行間也伏人穴十一翳風大顙肺

俞身柱膏肓脾俞命門腎俞環跳會陽足三里也如

不知穴卽針患處○內府雷火針只用艾三錢丁香五

分麝二分捲紙點燒吹滅乘熱墊紙捺于患處此法較
便○內府陽燄錠治風氣并腫毒硫磺一兩五錢銅勺
化開照次序入川烏草烏蟾蜍硃砂一錢僵蠶一條水
片麝香二分攪勻傾鎔磁盆內盪轉成片收藏臨用取
瓜子式一片先以紅棗擦患處粘藥於上燈草蘸油燒
三五壯畢飲醋半盞候起小泡挑破出黃水貼萬應膏
愈原云用鐵烙駭人故變而爲此然則今之火針亦可
變也○觀音救苦丹治小癰等即陽燄錠硫黃硃砂麝
香三味等分盪片燒後連灰捲于肉上不痛亦不潰膿
亦治風寒濕氣流注作痛手足蹇攣小兒偏搖口眼喎
邪婦人心腹痞塊攻疼之症○百發神針治偏正風漏
肩鶴膝寒濕氣半身不遂手足癱瘓痞塊腰疼小腸疝
氣癰疽發背對口痰核初起不破爛者並妙用生附子
川烏草烏大貝母乳香沒藥血結檀香梛香麝香三錢
母丁香四十九粒艾綿作針○治癰神火針蜈蚣一條
木鼈仁靈脂雄黃乳香沒藥阿魏三棱蓬朮甘草皮硝
三錢開楊花硫磺山甲牙皂二錢甘遂五錢麝三錢艾
絨二兩作針○陰症散毒針用羌活獨活川烏草烏白
芷細辛牙皂靈脂肉桂山甲雄黃大貝乳香沒藥硫磺
蟾酥麝等分艾絨作針○熏藥法治風氣痛用川烏草

烏千年健梛香開楊花鑽地風陳艾麝捲紙筒糊紫烏
金紙包燃熏病處痛則病出○藥紙熏法硫黃五兩化
開入銀硃砂明雄三錢川烏草烏二錢半生大黃黃
柏一錢麝一分攪勻傾紙上再蓋一紙壓匾每紙一寸
裁取十塊點着放粗草紙上移熨治風氣閃挫熱透自
愈○有用桑枝扎把燒熏者名桑枝針補陽氣虛弱散
腫潰堅妙或川桃枝削針全○神火照法硃砂雄黃沒
藥血結三錢麝五分捲紙撚蘸麻油點燒自外而內周
圍照之可以散毒氣治痘并一切腫毒亦針法之變○
凡寒痺陰疽痞塊閃挫用針甚效如嫌製針費事或點
穴難準可貼膏藥隨意捲針矧印金丹而佩癰蒸雞醴
藥爲筒或捲紙撚熏於膏上矧印金丹而佩癰蒸雞醴
而敷鼓思神聖之所傳識今古之異製古方時行疫癘
佩紫金錠洗冤
錄以蘇合丸印成香佩今蘇州同仁堂刊送辟瘟散佩
方皆岐伯咽金丹解毒法也蓋改咽而爲佩矣集驗良
方治一切癰疽水腫氣腫四肢腫用大麥拌硃砂喂雄
雞取其矢澄清熬膏貼乃岐伯及裴眉僧飲雞矢醴法
也蓋改飲而爲敷矣此變膏又若金匱之鹽附堪摩礬
之證古今人固有不同治者

漿可浸則未嘗不外治也金匱方頭風以炮附子為散加鹽摩疾上脚氣冲心礬石

二兩以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良後有加琉黃

三錢煎浸者又有再加杉木片二兩煎浸者二方皆

仲景所製亦外治方之祖也寶鑑之茶調且貼葱豉還敷則何必其

內服也寶鑑方治傷風頭風川芎茶調散用川芎白芷羌活防風荆芥薄荷細辛生甘草研茶調服濟

衆新編云以葱涎調貼太陽穴甚妙或照方加菊花蟬

蛻僵蠶或照方加生地白芍歸身或照方去細辛易香

附痰加半夏熱加石膏又方肺熱鼻塞加黃芩梔子巔

頂痛加藜本蔓荊子俱可按此方亦可油熬黃丹收

貼○寶鑑鬚葱白生薑淡豆豉白鹽作餅烘熱掩臍上

散風寒理積滯兼治二便不通氣通即愈此即葱豉湯

加味又本草附方為推十法之相傳李士材傷寒篇摘

小兒便秘葱豉敷陶氏十法外治居

七其餘亦只是薑韭雞子清食物之特采千方而備覽

類此篇即本陶氏之法而推廣之耳

間之風首六淫而寒兼四時初客於皮毛肺首受於膀

膀胱太陽六經未傳三日以內邪方在表散固爲先傷寒傳經

由表入裏初起在太陽膀胱經則頭痛惡寒發熱腰脊
強繼傳陽明胃經則目痛鼻乾唇焦不臥皆爲在表宜
汗再傳少陽胆經則目眩耳聾胸滿脇痛口苦寒熱往
來屬半表半裏宜和解失治則傳入三陰矣傳太陰脾
經則腹滿痛咽乾自利傳少陰腎經則口燥舌乾痛利
清水目不明傳厥陰肝經則小腹滿舌卷囊縮厥逆皆
屬裏宜下亦有傳三陰而傳入太陽膀胱腑者則
口渴溺赤宜利小便傳入陽明胃腑者則譫語狂亂燥
渴便閉轉失氣自汗不眠宜下凡三陽三陰之脉皆
環繞乎胃府處處可入一入胃府則無復傳故陽明爲
裏中裏以上爲傳經傷寒因寒化火也熱症也其有
初起直中三陰者寒症也其症腹冷痛吐清沫利清穀
踈臥支冷囊縮吐蚘舌黑而潤宜溫○又寒之傷人必
先皮毛外則寒慄鼻塞內則咳嗽短氣是傳肺也舌胎
昏亂是傳胞絡也洩瀉便閉是傳大腸也癰閉是傳小
腸也痞滿上下不通是傳三焦也經云藏腑俱病而傳
變不及手經者省文也○傷寒傳經前三日在陽分後
三日在陰分一日一經七日傳徧病自轉此常序也壯

實人不藥亦自愈故古有不藥爲中醫之說其有越經傳表裏傳首尾傳巡經得度傳併病合病兩感等名乃屬變症俱詳傷寒書○治病必先辨症外內雖殊醫理無二必知內治之法然後可用外治之法古書充棟欲知醫者自能尋究茲篇只於註試觀頭痛者與神芎傷中略爲提要閱者幸勿嗤其陋

頭痛爲邪在經三陽皆頭痛三陰惟厥陰有頭痛少陰間有頭痛傷風頭疼發熱鼻塞惡風有汗傷寒發熱惡寒頭項痛腰脊強身足痠疼晝夜不歇而無汗○傷風感寒頭目不清川芎藿香胡索丹皮二錢雄黃白芷皂角四錢硃砂一錢研吹鼻凡感從鼻入者多是宜吹鼻不獨頭病爲然也頭病吹鼻取其近也外治見患治患捷於服藥均如此○重傷風鵠不食草研吹鼻涕淚出卽清爽冬月可代少藥如塞鼻塞耳貼目可治眼翳并星卽移星草也一加川芎青黛冰片亦治頭風再加辛夷細辛兼治鼻中諸病○按治病須分陰陽表裏虛實寒熱之異古方外治亦然今卽頭痛一症以明內外合一之理他症皆可例推矣

古法治風寒頭痛川芎爲君太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳萸頭頂藥本爲引經藥若雜症頭痛血虛

四物氣虛四君濕痰二陳宿食平胃其法不一眞頭痛
爲腦空不治而外治則亦有外感內傷諸法如風寒頭
痛有麻黃去節研同杏仁搗泥貼太陽法或加白附子
川烏南星乾薑全蝎硃砂麝香入酒調貼全又有川芎
南星葱白搗貼太陽法加辰砂酒調并治夾腦風小兒
貼額門三陽頭痛不敢見日光有置水頂上宜汗吐下
法受暑頭痛有嗅皂角取嚏法并治卒頭痛有蒜泥塞
鼻出淚法風熱頭痛有薄荷鬱金白芷石膏芒硝塞鼻
法或加川芎細辛青黛曼荆子全如太陽症加羌活防
風赤豆外寒內熱者有草烏梔子葱汁調貼太陽法此
方并治疝諺云頭疼當疝醫非無因也大熱者有大黃
芒硝并泥調貼太陽法有朴硝塗頂法有葶藶子煎湯
沐頭法腦痛有硝石搐鼻法大寒犯腦者有蒸吳萸作
枕法煎吳萸浴頭法寒濕頭痛有紫蘇川芎花椒葱白
細茶煎熏法亦治風寒痛寒濕逢陰雨卽發者有桂心
酒調塗額角及頂上法久不除者有皂角麝香紙包放
頂上炒鹽熨法濕氣頭痛有瓜蒂末松蘿茶嚙鼻取黃
水法有川芎半夏白朮甘草末搐鼻法并治挾痰者亦
有用羌活勝濕湯藥料研末搐鼻法宿食不消飽則濁
氣熏蒸致頭脹痛者有平胃散搐鼻法熱痰痛有牛蒡

子搗汁加鹽酒熬膏頻擦太陽使透法血虛頭痛有當
歸川芎連翹熟地煎湯置壺中吸其氣法氣虛頭痛有
川烏南星加氣藥貼太陽法有煎補中益氣加羌活防
風熏法肝風有霜桑葉煎熏法有石決明草決明塗太
陽法并預防壞眼亦有作枕法腎厥頭痛有附子艾葉
揉嗅法頭痛目眩者川芎芩藎薄荷雄黃蒼耳子黎蘆
陳胆星瓦楞子研搗鼻清熱化痰頭痛兼眉棱骨痛壯
熱不止大黃木香解毒子地漿水調貼太陽時病初愈
後毒氣攻注頭腦脹痛紫金錠葱汁酒磨塗太陽頭痛
連眼者穀精草末調糊塗腦頂頭痛連眼珠者韭菜子
薑汁調塗太陽或用麻黃灰盆硝冰片麝吹鼻頭痛有
用醬薑貼太陽燒艾一炷法有用川芎枳殼和艾火酒
噴曬乾加麝爲條燒嗅法或用乾蚓糞乳香麝捲筒燒
吸烟法此卽火治也有冷水熨法此卽水治也有草麻
仁同大棗搗泥塞鼻貼太陽法有斑蝥去頭足翅裏蜆
殼內罨酸痛處過夜起泡挑破法此拔毒法也草仁或
用麻油熬炒黃丹收加麝貼斑毛或用猪油熬松香黃
蜡收貼均可并拔一切毒西醫斑毛硬膏卽此貼患處
能引病外出貼腿足能引病下行也然是峻藥須量用
○頭痛膏用青黛黃連決明子黃芩桑葉歸身紅花生

地防風蘇葉貝母各等分小磨麻油熬黃丹十分之七
硃砂十分之一同青黛收臨用糝黃菊花末左痛貼右
太陽右痛貼左太陽雙痛雙貼效○鹽附等方已見餘
不盡載○頭痛年久為頭風方見後治全可參用頭痛
必兼暈治亦同頭痛○暈觀諸方可悟隨症用藥之道
如有兼症或寒熱虛實互見者可分用亦可並用雖為
頭痛說法而諸症要亦不外乎是擴而充之足應萬項
變外治無用藥凡例即此可以為例幸無厭其煩也項
强者枕荊芥二項強太陽受風項強木瓜生地酒蒸加乳香沒

藥桂枝浸搗

即桂枝湯法○又煎湯搗風喘并熨陰痺

杏仁搗塗

傷寒頭痛

又方同麻黃用見前

麻黃甘草眼點

抄傷寒無汗麻黃去節同甘草研末

○風熱面腫并塗面○加冰片點兩眼角暖蓋靜臥避風自汗不汗熱湯催之

此即仲景麻黃湯之意暖蓋熱催即服麻黃湯欲溫覆

之意加冰片者即外治加藥引法也○傷寒時疫感冒

通治點眼取汗麻黃去節二錢零四釐甘草三錢五分
琥珀一錢零五釐牛黃一錢冰片六分又方雄黃四分
辰砂二錢牙硝四分麝一分金箔五分頭疼發熱口渴

身痛男左女右點大眼角名發汗散二方併用亦妙○
傷寒時疫感冒通治麻黃膏黃連膏兩膏各用一錢和
勻入胆礬牛黃冰片五分青魚胆一錢拌蘸點眼內此
方內外通治合麻黃發表黃連清裏而爲一乃雙解法
也會試點過麻辣流淚渾身毛骨悚然是卽膜理開之
驗也○又呂真人治瘟疫用麻黃犀角山茨姑朴硝血
結一兩薑汁拌濕烏金紙包十八分紅棗肉搗泥和丸
砂盆煨成黑炭去紙取藥加冰片十分之一銀簪蘸香
油點兩眼男左女右取汗如瘟疫日久不汗先吹鼻後
點眼汗後食米湯稀粥此方兼解毒法○眼主五藏流
通甚捷莫謂點蒼朮羌活掌攤風寒發汗蒼朮羌活明
之爲無驗也

腿間側臥暖蓋取汗不汗熱湯催之按古有熱湯澡
浴法有熱水浸腳擁被安睡法有熱水抹身法皆汗○
又方并治頭瘟蒼朮枯礬良薑葱白炒熱塗手心掩臍
靜臥手須窩起勿使藥着臍一手兜住外腎前陰文子
亦如之服菉豆湯催汗○此卽神術散羌活湯意○揉
心主汗掌屬心故發汗○一手掩臍一兜腎丹訣也揉
以香附傷寒無汗醋炒香附擦背如治熏以紫蘇傷寒

風襲經絡疼痛卽擦患處均效

紫蘇煎濃湯熏頭面及腿灣前頭痛註
有方可參用○二方卽香蘇飲之意
薑葱之用維多

七寶特擅其勝

湯傷寒感冒生薑葱白核桃細茶黑豆煎

搗爛棉裹擦天庭并治中風痰厥
又令兩人各持薑渣一團擦兩手足心兩臂灣前胸後背得汗解并治夏
月霍亂寒中三陰麻腳步等俱效○腹痛葱白炒覆臍
上砂壺盛熱湯熨之○或切葱白如碗粗一束高寸許
放臍上熨斗熨之葱爛再易先放胡椒末或麝香丁香
末於臍內再熨更妙并治陰症○傷寒結胸中氣虛弱
者薑葱蘿蔔子炒熨自然滯行邪散胸卽開豁冷加酒
烹○風寒結痛薑葱橘皮炒熨○食結生薑勿炒和蚓泥
陳酒糟鹽炒熨或作餅貼胸○熱結生薑勿炒和蚓泥
薄荷汁蜜水井水調揉心口或加冰片○痰結生薑茶
葉煎湯調銀硃明礬塗胸口或搗薑渣和竹瀝擦胸口
○風痛薑葱紫蘇陳皮搗爛加飛麩川菜油煎餅貼或
薑葱糯米飯加鹽搗敷若雨足痛如刀割不紅腫者生
薑蔥香油擦隨用生薑燒熱搗爛敷之○風襲經絡筋
攣骨痛或虛怯人肢體生腫塊或痛或不痛用炒葱白
布包熨腫痛自止爲散血消腫定痛之良法卽刀械殺

傷氣悶絕者炒葱徧敷白醒又腫毒用菜油煎葱敷自
消乳癰炒葱白敷炭火盛瓦罐偏之汗愈皆良法也○
生薑葱白各一斤麻油熬黃丹收貼風寒瘧痢皆妙亦
可隨症調藥末用如古湯頭之用薑葱爲引也○七寶
膏用生薑蒜頭槐枝各一斤葱白入兩花椒二兩麻油
熬黃丹收可貼百病癰疽發背消腫定痛潰膿生肌皆
効又方加韭白八兩白鳳仙一株花莖子葉全用亦名
七寶膏或再加柳枝桑枝各一斤桃枝半斤名十寶膏
亦可椒芥之力甚大五子亦同其功傷寒不汗胡椒天
調藥
掌心或胡椒丁香葱白搗塗兩掌心夾腿內側取汗治
陰寒症皆宜○凡聞病人汗氣入鼻透腦卽散布經絡
初覺頭疼卽用芥菜子末溫水調稠填臍內隔衣以壺
盛熱湯熨之汗解傷寒時疫俱妙亦治急肚痛及小腹
痛
西醫有白芥敷法用麪粉滾水攪和貼腹可隨症
參○風濕腫痛生芥子末調熱酒或熱醋包患處有濕
翳拔出卽愈○五子白芥子同蘇子香附子蘿蔔子山
查子也風寒發散并痰食結胸氣膈噎塞鼓脹俱治共
炒研細末調入覆蕎餅於額上風寒頭痛醋炒蕎麥爲
七寶膏用甚妙

以收風毒或用黃蠟為納草霜於臍中胡椒葱白百草霜搗丸納臍中

取汗草霜和中或圍爐塗丹以坐向傷寒日久不汗

溫散并治寒腹痛或圍爐塗丹以坐向

身或硃砂亦可向火坐自汗或炭盆置床下烘之夏日

勿用○按瘧疾發汗有黃丹拿法用生黃丹五錢生礬

三錢研胡椒一分五釐麝五釐臨發對日坐定醋調藥

男左女右敷手心藥行汗出無日用火烘腳年老身弱

怕服藥者或煨坑一名鋪砂以臥蒸傷寒中風癰瘰發

最妙可參或煨坑燒地鋪砂以臥蒸汗沈金鰲云寒厥

暴亡尤宜鋪地坑如人長以桑柴火燒透掃灰噴酒

酌鋪鐵砂或桃葉松柏枝菊花稻草之類布席蓋臥取

汗再以溫粉撲之自愈溫粉即川芎白芷藜本一兩米

粉三兩棉包撲于身上煨坑法最古漢蘇武用之南

史徐文伯治范雲傷寒宋史王克明治安道風禁用之

然是却法○又按頭項強硬燒坑布桃葉臥以頂着坑

上蒸汗愈天行餘毒手足腫痛煨坑着履居坑上以

衣塞之勿洩氣治痔瘻煨坑沃酒納吳萸坐治附

骨疽煨坑沃小便坐坑中熏使腠理開氣血通暢而愈

治刑傷煨坑醉飲麻油熱酒臥一夜如故昔有被毆

者醫用此法遂不成訟

此數法可參酌用又癰瘰酒

炒蠶砂鋪床上臥間日一作或醋蒸黑大豆鋪床上臥

取微汗豆冷令人于被皆能解肌而發汗可以宣正而

內挽引攀急處俱可參

逐邪第勿爲火逆致慮於表虛以上汗以下若夫胸中有

食則以物探喉

凡痰壅上膈火氣上衝食停上腕並當用吐如胸中室塞悶亂以手或筋探舌

本得吐卽止壯實人停食此法最妙其效甚速老人產

婦及吐血家忌○按吐法今人不講久矣子和云余著

汗下吐三法常兼衆法有按有躡有導有導有減增有

續止如引涎澀澀取嚏追淚凡上行者皆吐法也薰蒸

潔洗熨烙針刺硬射導引按摩凡解表者皆汗法也催

生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆下法也據此

則邪在上焦宜吐者膈上多痰則以藥噤鼻如瓜蒂吸

可用取嚏追淚之法

子之類○如自欲吐者可使湧凡病人自欲而不當下

擦法見前

者無妄攻

傷寒表證罷方可下不爾邪乘虛入不爲結胸卽爲熱病○傷寒忌汗下證詳見傷寒書

似瘧往來

少陽寒熱往來如瘧

擦柴胡以和之

搗柴胡擦背及周身取微汗所以治

也如痞滿悶

凡邪傳裏必先胸以至心腹入胃胸在半表裏間邪將入裏而未入裏故胸滿而腹

未滿是氣而非物也○已下者為痞氣未下者為少陽

○腹痛者結胸鞭而不痛痞氣○此熱邪宜苦瀉若難

症則

薄黃連而豁之

煎黃連水搗胸所以治裏也○少

然可參

在表裏之交可從中而治

和太陽要有經有

腑陽明亦有經有腑

陽明經病傳腑蒸熱自汗口渴

諸語腹滿便秘宜

祕熨枳實麥皮

便祕枳實麥皮鹽服

熏蘿蔔竹葉

大便實結不下將烈火煮竹葉一鍋乘熱

或用青菜全

○前有薑蔥蘿蔔熨法治諸結可參用

臍硬痛

此燥屎症必轉

則桔梗蘸油潤其燥屎

塞肛門

油或麻仁
油灌肛內
少腹滿急
此蓄血症必嗽
則蘇葉煎湯摩其

蓄血
布浸湯鋪腹上手盤旋摩
之○或麻根搗貼連陰際
內果已堅下何可緩然

寒熱須辨而陰陽貴分傳者熱而中者寒陽宜下而陰

宜溫勿執是傳是中只決為下為溫
傷寒傳經在表者
為寒在裏者為熱

又有陰陽二症傳經者為熱直中者為寒詳見
前六經未傳註○直中者或從鼻入或從足人
何以涼

膈硝浸布揉
傷寒熱邪傳裏皮硝化水新青布浸搗胸
口或用雞子清白蜜調敷熱甚加大黃○

按大陷胸大承氣調胃承氣皆用硝涼膈散即調胃承
氣加味防風通聖散即涼膈散加味如以浸硝揉法推

之俱可酌用又小柴胡加硝湯及六一順氣湯並用
硝當參○翹梔芩薄荷黃草涼膈散也或同四物用何

以暖臍黃蒸絹熨
傷寒直中三陰經初無頭疼發熱面
青肢冷小腹絞痛者亦治男女由房

事後飲食生冷致成陰症腹痛者并霍亂吐瀉腹痛者
吳萸入三陰脾腎肝用一升即二兩五錢也酒拌蒸絹

包熨臍下足心一加葱白麥麩食鹽炒熨全○又冷極
唇青厥逆無脉陰囊縮者亦用此熨并灸臍中及氣
海關元各三五十壯而手足不溫者死又囊縮者吳
黃同硫黃大蒜調塗臍下蛇床子炒布包熨之○按寒
中于表宜汗用麻黃桂枝柴胡葛根溫散寒中於裏宜
溫用乾薑附子肉桂吳黃之辛熱人參白朮甘草之甘
溫以復其元陽此藥例也諸傷寒濕者皆視此○又按
吳黃湯三味參黃湯四逆加吳黃湯皆治陰症如以蒸
黃熨法推之亦可酌用○又按回陽救急湯治中寒并
傷寒陰症陰毒等用黨參白朮茯苓甘草附子肉桂陳
皮半夏五味子乾薑生薑各一兩此方麻油熬黃丹收
備貼甚妙又方只用附子白朮甘草末生薑汁調蘇合
丸和用者其用蘇合丸法可加入貼受寒腹痛立愈○
大凡膏藥用溫暖及香料者其奏效甚捷若貼膏後加
以熱熨尤效如或不對症上手卽亢甚則鏡按胸前或
拒可以速於更換便作試法亦妙

以凝雪逐其水

治天行煩亂熱極者并傷寒水結胸飲

前熱除爲度名凝雪湯芫花逐裏水二甘一味浸水拍胸

棗湯法也○水漬法乃治陽毒大熱用并水或棗豆湯

青新布浸冷極則丹合膝上黃丹胡椒薑葱敷或以健

陽回其春健陽丹亦名回春丹治傷寒陰症用胡椒枯

被蓋取汗忌吃茶水一方無火硝用四味填臍蓋理中

膏并治房勞○中寒附子川椒薑汁飛麩和鹽填臍或

用乾薑附子川烏良薑吳萸官桂醋丸納臍此方并可

用麻油熬黃丹收臨用參川椒末貼○按治落頭疽背

槽風耳後銳毒陰對口陰發背乳岩惡核石疽失榮鶴

膝風魚口便毒瘰癧流注諸陰疽即前健陽丹去丁香

易麝香用胡椒一兩明礬火硝黃丹各三錢麝一錢蜜

調作兩丸病在左握左手在右握右手在中分男左女

右若病在腰以下縛腳心亦分左右中布扎不鬆不緊

不可移動六時一換不論如何腫痛潰爛數丸總能收

口生肌用過九埋土中忌口并房事一年此蒙古名

醫祕方貴重無價其實亦即陰症之方而推之耳乃知

治病能通陰陽之理則諸方無不可移借者不必薑薄

拘於某症某方某經絡某部位也善悟者其參之薑薄

蚶泥以寬胸見薑自夏麝香以通竅自角半夏麝香填

臍內上蓋薑片以

熱物熨之名溫臍法○按三味填臍外用山螺葱白搗餅蓋之可治小便不通一方而涼熱療治隨用可推

潑醋炭而制狂熨鹹息譫狂胃大熱也非下不除○炭盆潑醋使間或薑汁雞清調

硃砂元明粉塗胸烙葱餅而定絞燒艾伸踞陽躁者先

而後躁者屬陽不臙中即兩乳有塊冰之置寒厥者

由熱而漸厥者屬熱所謂熱深厥委中即腿灣有益湯

亦深也不由熱而驟厥者屬寒委中即腿灣有盆湯

之拍熱湯拍後如見紫黑泡乃毒也刺蟻收熱毒傷寒

癰團破腹覆胸凡熱雞解陰邪傷寒陰毒剖雞覆胸口

毒可通用并可護心先將燒酒噴雞○陰症

腹痛甚刺且夫寒熱有虛有實陰陽有假有真假陽症

火也不可誤作陽症治假陰症清虛熱則胆導殊妙即

火極似水也不可誤作陰症治

也凡邪熱盛而氣血虛難堪攻下者猪胆汁和蜜熬成

錢藻皂角末塞肛門名胆導法○按導法有虛實寒熱

之別如津液枯者蜜加鹽熬名蜜導濕熱痰飲固結者
薑汁麻油浸瓜蔓根導陰結便閉者蜜煎中加薑汁生
附子末或陳醬薑或草烏導餘與大便不通註參看○
此分別用藥法也他症亦可例推○凡下部之病用導
法最捷或做雄黃兌法或做猪
脬擠汁法熏法西醫水節亦是
退真陰則蛋熨至神傷
不能分陰陽目定口呆身熱無汗便秘不省人事煮雞
蛋砌臍四旁或用老油松節七兩胡椒照病人年紀每
歲七粒煮蛋乘熱切頂殼三分覆臍眼麪作圈護住冷
易視蛋墨為驗收盡陰氣自愈一用煮雞蛋去殼乘熱
滾擦亦能變陰為陽名蛋熨法○發斑用銅錢於胸
背四肢刮透仰於傷處用蛋滾擦此苗人秘法也
熱俱實者白散用巴豆等陷胸大陷胸用硝黃等易為麪調
而葱搗寒結巴豆飛麪研調餅敷○熱結大黃芒硝葱
藏寒者用巴豆大黃唾和餅貼臍艾燒數炷熱氣入肚
卽住拭去藥毒如畏艾灸用熨斗盛炭火熨結胸本有
熨法○按食停腸胃冷熱不調腹脹氣急痛滿欲死及
中惡客忤卒暴諸病用大黃巴豆乾薑名備急丸可參

又方巴豆同黃連如前法先滴薑汁於臍內再炙關格
霍亂皆宜○陰陽二毒結胸症古方陽用地龍陰用破
結丹辰砂附子黑丑醋熬膏入礞石葶藶肉蔻陰陽或
巴豆桂心木香麝等分丸輕粉金箔衣可參數
假者假陰症脈冷昏迷然口渴便閉身不欲衣指甲紅
甲青黑三黃石八味代以水撲而莢敷凡內真熱外假
足冷
黃石膏湯以井水撲其胸除熱如覺心快則內火息而
外之戰慄頓失矣若下真寒上假熱症不敢用八味丸
先用力擦其足心令熱以吳黃附子飛麝麝香調敷湧
泉穴引熱下行則下一身熱而上部之火自息矣○凡
虛火上炎症及偏陽于上之假其本病自有從化之殊
症與一切疑症皆當倣此推用
其變症多由失誤而致失汗失下聊舉其要以識其凡
衄血傷寒衄血須辨表裏○汗為心液熱則變紅越出
上竅傷寒失汗成鼻衄為衄汗不可止衄久宜止
磨芩芩而塗非水磨黃芩白芩塗山根或白芩磨本人
鼻血塗或紙浸白芩木貼眉心或切白芩

片或茶調決明貼於胸清肺熱延胡塞耳左塞右右貼

青苔搭頤或井泥或濕紙搭頤門三棱敷五醋和黃

囊或黃酒浸足○鰂久吐血傷寒失汗熱煎芷梔而熨

牛膠盪軟貼山根髮際

白芷黑山梔煎熨胸口或醋調大黃掩其臍金底鬱金

清胃熱○治鰂吹鼻內

擦背韭汁童便凉水噴面治吐鰂并九竅血○少陰誤

竭蒜泥裹足引熱下行散之以紫蘇香附鰂血并水磨

燕塞鼻血見陳墨白散非獨黑能止紅也驗過吐血用

藕汁或用雞蛋清磨墨塗胸口韭菜汁亦可磨肝血尤

宜數方清之以地黃犀角一切失血眩暈者生地塞耳

皆穩效嗽血便血蓄血如狂嗽水不欲嚥及陽毒發斑等用大

生地二兩白芍黃芩黃柏黑山梔生甘草一兩丹皮犀

角五錢麻油一斤熬黃丹七兩石膏四兩收即涼血地

黃湯法也鰂血貼眉心吐血貼胸口蓄血貼臍下隨症

酌用便祕可加桃仁大黃○西醫法衄血將頭高枕冷水灑面或冷鐵熨背脊吐血將頭平枕冷水灑面或冰塊按胃上大小腸子宮出血用水節射冷水入肛門陰道或冰塊塞之又吐血失血太多病危者用無病人之血以竹筩灌入有病人迴血管中
名借血法此法中國不能用存參
以井水傷寒初起邪在表無胎半表半裏白滑胎入裏則粗白厚膩不滑而澁熱傷津液也若熱聚于胃則黃或生芒刺或黑色則熱甚也多凶○陽症舌黑乾燥無津液宜硝黃下之陰症舌黑而潤宜附桂溫之又冷滑如淡黑者無根虛火宜化痰降火或淡黑一二點補腎降火○舌胎黃赤乾澀井水浸青布拭之生薑擦一切舌胎用薄荷水浸青布拭之生薑擦自退如生芒刺刮不去熱毒深也危塗以竹瀝紅粟竹瀝調紫須觀芒刺之形退而舌底紅色者火灼雪丹塗之効
水虧也生地切片貼○無舌胎而紅絳者磨犀角塗胸○舌瘡硃砂雄黃黃柏薄荷硼砂水片○舌爛黃連塗○舌出珍珠冰片敷○舌身有斑而紫赤者傷寒汗脹出口外雄雞冠血浸自縮

耳聾足冷煩悶欬嘔卽是發斑之候 又失下或下早

熱邪傳裏熱甚傷血裏實表虛則發斑輕如疹子重如

錦紋紫黑者熱極胃爛多 掃以猪胆 熱極胃爛猪胆汁

死不可發汗重令開洩 見寶鑑輕者先噴淡薑 敷以燕巢 又方用紋銀一塊放

汁再用青黛水掃之 敷以燕巢 臍上以燕巢泥搗融

同雞蛋煎成一餅敷數次可愈 莫誤蚊蚤之迹 陰症發

○附方天行發斑升麻水掃之 胸背手足稀少如蚊蚤迹乃無 日黃而明薑茵擦之亦

根虛火上熏於肺非斑宜溫腎 明爲陽用生薑汁和茵陳汁點眼偏身黃者并擦胸前

割烏雞覆之 傷寒表未解寒邪挾濕身目發黃濕盛於 四肢周身汗解或用蝦薑絞汁和香油點眼全 又方

濕熱發黃昏沉不省雄雞破背帶毛血合胸○附方發 黃赤小豆瓜蒂黃米研吹鼻或棉裹塞鼻各竅出黃水

愈但勿深入○太陰肺爲標脾爲本發黃掘新鮮百步 根洗淨搗爛覆臍上以糯米飯一升拌水酒各半合揉

軟蓋藥上包扎一二日口內作酒氣水從小咽乾而渴 便出腫自消○陰黃丁香和茵陳擦如上法

便出腫自消○陰黃丁香和茵陳擦如上法

便出腫自消○陰黃丁香和茵陳擦如上法

便出腫自消○陰黃丁香和茵陳擦如上法

便出腫自消○陰黃丁香和茵陳擦如上法

便出腫自消○陰黃丁香和茵陳擦如上法

蜜連潤之亦搗蝸牛圍之

熱邪傳少陰經腎汁傷咽乾而渴宜急下若寒中於下焦

偏其無根失守之火發揚於上而痛者則乾燥不渴必

有下利清穀四肢厥冷等症可辨

○黃連水和蜜敷頸

蝸牛飛心煩不眠少陰當安其眠黃連煎湯入廣膠化開

雞子黃攪即黃連雞子黃法也

氣衝不食陰

勿強與食

田螺硝石合

麝香以敷閉癰

傷寒熱鬱小便不通田螺朴硝麝香搗敷臍下無麝亦可○與後小便不通註

參看海蛤川烏加山甲以湔搗搗

傷寒汗出不均腹背手足

山甲各一兩酒丸彈大置足心別劈葱白蓋藥帛纏熱

水浸胸至膝取汗并治中風手足不隨及風濕脚氣等

症○須避風腫發腮頤南星黎洞

紅腫頭重體倦名發頤在腮曰穿腮在地閣曰穿喉皆

痰熱之毒也南星熬膏敷○又方治疔腮發頤黎洞膏

用紫花地丁蒲公英豨薟草加苦參三兩象貝赤芩川

草薛生甘草一兩五錢陳橋核五錢山甲片炮用二兩

五錢麻油熬黃丹收并治一切風毒及癰癤痰核○按
腮內酸痛者曰疳腮不酸痛者曰發頤輕者散花磨鹿
角搽赤豆側柏葉雞清搗塗或絲瓜燒存雞清敷重者
皂角南星糯米末薑汁敷或大黃五倍白芨雞清塗醋
調壁毒攻手足黃柏沖和遺毒黃柏蜜塗或山螺同鹽
土敷
羊屎馬屎煮汁漬之○按傷寒表未盡遺毒於四肢爲
熱流注醅濕紙貼炒鹽熨之自消若表散太過遺毒於
腠理或疎或密爲冷流注宜沖和膏敷卽紫荆皮五兩
獨活三兩石菖蒲赤芍炒二兩白芷一兩也葱酒熱敷
凡病在緊要處此能驅其寒濕提移他處出毒如流注
以沖和膏厚敷却單用獨活酒調熱塗一路其盡處以
玉龍膏燒酒敷誘之卽移法也此方并治偏正頭風及
半陽半陰冷熱不明症皆效陽症加洪寶膏陰症加玉
龍膏敷痛加乳香沒藥筋不伸加乳香若救過用冷藥
者加肉桂當歸可喚死血退黑暈○玉龍膏治陰症皮
色不變不痛者白芷晒赤芍炒一兩草烏炒三兩南星
炒軍薑煨肉桂各五錢也一無芍
腫熱痛者卽花粉三兩赤芍二兩薑黃白芷各一兩少
林截血丹定痛消瘀卽洪寶膏也頭面傷塗頸手傷塗

腎脚傷塗腿截住其血不來潮作傷口肉硬風襲加獨
活酒敷又不消加紫荆皮末敷立愈舌欲斷者雞白皮
代之塗洪寶膏止其血數日舌接去雞皮再塗數次愈
○冲和性平玉龍性熱洪寶性涼臨症加減用之最妙
此爲陽爲熱爲實也 柿蒂丁香點呃逆 卽呃試與亦

有乳硫

傷寒失下胃火上冲而逆者爲陽呃便不閉者

而呃者爲陰呃宜理中合丁香柿蒂散溫之扁鵲有丁

香柿蒂點眼法又寒呃不止乳香硫黃或乳香雄黃酒

煎嗅見後麻黃牡蠣撲亡陽并加朮藁

傷寒下後衛虛

病呃見後麻黃牡蠣撲亡陽并加朮藁

黨參白朮炮薑炙甘草加當歸酒芍黃耆熟地茯苓陳

皮附子肉桂生薑大棗麻油熬黃丹收備用并治傷寒

大汗後頭眩振振如倒地或肉瞤筋惕及下後利不止

凡諸大虛宜溫補者亦可加藥○撲汗法麻黃根牡蠣

龍骨糯米粉白朮藁本研撲如治亡陽症亦漏底下利
可調入前膏內貼按汗多傷血則肉瞤筋惕
傷寒下利腸垢是熱下利清穀是寒若下利清水亦是
熱水從結糞中走出也又熱迫血而下行便膿血者是

熱若下焦虛寒腸胃不固奔豚上冲腎積曰奔豚氣從少腹上冲心而痛

乃下焦陰如痢如疝或桂或黃痢有桂末填臍吳黃熨小

冷之氣也附桂末糝貼臍法可通用○古治奔豚用薑此為陰為

寒為虛也虬上於膈揉之以椒梅此多屬寒而鮮屬

熱也傷寒吐虬屬胃虛寒者多花椒烏梅肉搗餅擦胸口虬開酸辣自安蟲悞其心或作

其虬之以雄艾此或在陽而或在陰也傷寒蟲蝕肛曰

乾蟲蝕肺曰或上唇有瘡聲啞亦名疳在陽在陰故有

卧起不安等此症由於失汗痘後產後內熱生蟲亦有

之○雄黃艾葉熏下部或用雄黃苦參桃仁青箱子黃

連汁丸納下部名雄黃兌或桃葉梅葉煎熏或蝦蟆

雞骨燒存裏塞○有傷寒而不必治者邪正相爭戰而

汗者解膀胱熱結血自下者愈俱詳見傷寒書惡風者避於室

見風則惡者密室中則無
所惡也 此慎起居法
食復者損其穀 新瘥恣食而

其穀自愈 此節飲食法
有傷寒而難為治者百不

合者若神崇治以其名
行住坐卧如有鬼神名百合病

和合百脈此病
兩相易者如女勞治從其本 房男移病

於女女移病於男名陰陽易病危症也古用燒視法或

用爪甲灰皆從男女互治○桑木灰牡蠣胡椒良薑草

烏白芍藥香男以女唾調塗腎上女以男唾調塗乳上

汗解○按女勞症二便不通牡蠣陳粉炮薑一兩如土

法掌上先擦熱再塗此男女之有均為傷寒而各治者

根蒂坎離之分屬也二方一理
大頭傷寒名瘰也冬寒反熱人受其毒至春發之因成
腦結則止不散則成膿矣 此皆風火鬱結所致頭
上漫腫無頭名曰時毒頭面盡腫是大頭瘰亦名抱頭
火丹俗呼狸頭瘰從耳前後腫起名蝦蟆瘰從頤頰腫
起名鸕鷀瘰又捻頭瘰喉痺失音項大腹脹如蝦蟆亦

名蝦蟆瘰癧○大頭瘰癧初起男左女右刺少商穴大頭蝦蟆皆刺十宣穴宜夜刺但得醒鬆即可亦不必盡刺

則蚓泥白糖或井燕泥醋調搽○崩裂胡索噫膿時毒

喉痛者延胡錢半川芎一錢藜蘆五分躑躅花二分半紙撚蘸藥推入鼻內嚏出膿血痰涎爲度白鬆卽在上

用吐三黃解其毒治頭面耳目鼻腫痛大黃黃連黃柏

黃白芷白芨白斂白蜜調塗此方通治熱毒○又方生地黃蒲黃牛黃朱片研側柏葉和蜜敷若氣凝血滯挾

陰症者生薑蔥汁敷夾色傷寒名卽男女陰症於則鴿

尿鴿糞一升熏被蓋睡鼠尿雄鼠尿兩頭尖者醋露房

起痿按訓俗遺規云真陰症小便舉硬者是軟縮者非

二烏通其陽使祕者川烏草烏末葱蘸塞穀道內喉管

傷寒名喉中作癢有薄荷之吹研末黃耳傷寒名寒熱者切忌茶酒不救

策不有苦參之滴水磨苦參滴耳或用猴薑按耳鳴通

安者氣散用猴薑生地汁生薑汁可參

棧針以刺赤膈赤膈傷寒胸膈赤腫疼痛頭疼身痛發

刑防敗毒散加元參升麻坑砂以敷脫脚

瓜蒌紫荊連芎芍芷可參

陳小粉醋調敷熱伏氣咽痛腎傷寒也夏桂主之

痛處有奪命功中暴寒

伏於少陰經旬日始發為咽痛者俗名腎傷寒用牛夏

桂枝甘草薑汁調塗頸上及臍內再用附子片貼足心

症詳前咽串氣背痛腎中寒也附椒主之

乾而渴註

椒白鹽飛麩酒涼熱雜投關格身僵者熨乾塊

和餅貼背心凡人或

心腹疼痛醫家辨症不清涼熱雜投致成關格甚或僵

硬不省人事者以陳乾土磚炒熱布包輪熨氣通即愈

洗冤錄治跌壓遂寒溫不節吐利腹冷者坐深湯

生編治虛寒疹全四時

痢四肢胎腹冷坐深湯中浸至膝上生陽之道極速然

輕症自妙若大吐瀉元氣不接者與脫陽同宜炮薑附

里命許文

子敷臍腹炒葱鹽熨煎酒椒而散襲膚暴寒襲入肌膚
之參看後霍亂註煎酒椒而散襲膚暴寒襲入肌膚
用川椒燒酒滴米醋而舒入骨風寒入骨滴醋濕青布
煎布薰熨之鋪患上再用砂壺裏砲
子酒燉熱久病有攤紙而溫病冷症寒邪久伏藏腑或
熨布上經絡不解者是○癰症臍
腹冷痛附子馬蘭子蛇床子吳萸木香肉桂末加飛麩
薑汁調成膏攤紙上圍三寸許貼臍下關元氣海穴自
晚至曉可代灸百壯○虛人或用暴亾有燒薪而熱有
人參附子肉桂炮薑末納臍膏蓋積寒復觸新寒故
積寒復觸新寒故時痧抽吊非石硫之升頂不可起生
暴亾煨坑見前時痧抽吊非石硫之升頂不可起生
傷寒陰毒鑑云卽痧○治陰症時痧手足抽吊者卽今
之麻腳痧等是也用硫黃肉桂丁香川附麝香炒暖臍
膏貼卽張氏所傳雷公救疫散也如症輕者用燒酒薑
汁擦手足或調川椒末官桂末再塗臍足若氣漸敗當
鋪艾於臍上熨斗熨之如回陽後當救陰一法用硫
黃肉桂二錢半炮薑硃砂二錢黑附子五錢艾絨二兩
和勻布包放臍上熨斗熨之今有合麻脚痧膏施送
者亦卽硫黃桂麝等味也極驗暖臍膏方俱見下

鬼症

一為寒症

纏綿非巴豆之斬關焉能救絕

傷寒陰毒七八日不愈者

與鬼症

卒暴惡忤諸症同治雄黃硃砂二兩川椒桂心

光花醋炒

五錢巴仁藜蘆二錢半附子野葛七錢半共

研末

頭痛噤鼻取嚏或汗或衄即解

數胸腹

痛塗臍取吐利功同太乙紫金錠有雖為傷

寒而異

治者外感常挾內傷為風寒暑濕燥火感於外者

於內者

為內傷外感宜汗宜吐宜下內傷宜溫宜補宜

和外感

重者發散為先內傷重者補養為急此其大略

也東垣

有內傷外感辨詳見醫書今人煎說燈油餅貼

凡內傷

飲食發熱胸膈脹悶或便閉或泄瀉用亂髮酒

麵老薑

胡椒雞蛋攪勻以隔夜燈油煎成一餅貼胸口

胃脘鬆

即去之○治老人傷冷及難化之物生薑或紫

蘇煎湯

揉擦心胃肚腹氣通即食化矣或煎湯傾浴盆

中坐揉

或艾灸胃脘并肚臍氣從口鼻出立愈此繆仲

氏方

二方治飽滯者若傷飢失飽胃氣空虛宜補○

凡食傷

白朮二兩枳實一兩油熬丹收備用胸滿加麴

麥痰加

橘夏火加黃連氣加木香虛加參芍甘薑若酒

傷平胃 勞感調榮養胃 凡內傷氣血外感風寒頭痛身

感冒不可發汗宜用陶氏法黨參生地黃蒼朮當歸川芎

柴胡陳皮羌活白朮防風各等分細辛甘草減十之三

加生薑葱白大棗元氣不足下陷加升麻一無生地細

辛川芎有黃柏熱甚加黃芩乃服方也然外感投補甚

難誤補之患亦同於誤表嘗用此方藥料油熬丹收貼

于胸口亦頗有驗雖見笑於名醫却不致有輕投之悔

○按古方如補中益氣六味地黃皆可熬膏貼會經試

過大約陽虛者貼補中益氣往能食陰虛者貼六味

往往能睡此其驗也膏藥力薄固不能如湯丸之補益

然眠食安而精神自生病便減退古云先寢食而後針

藥卽是此理且與湯丸亦並不 情感要貴於達權以情

用碍也如臨症加減用之尤妙 情感要貴於達權相治

見前註○此症婦人爲多一婦悲夫成病其兄畫其夫

與所私照鏡狀示之婦悲而訴悲遂減病旋愈又一婦

思慮過傷三年不寐醫云此膽虛不能制脾之思慮而

不寐與其夫議以怒激之婦汗出困睡蓋怒則膽旺而

制脾故能寐也又一婦善怒而不食醫令伶人塗朱粉

與爲角觚之戲誘其笑又令健婦啖食美味以誘其嘗

數日怒減食進蓋肝木平而脾氣自復矣又一婦遇盜而驚自後聞聲卽倒醫作心病治不效戴人曰驚者爲陽從外入恐者爲陰從內出驚則胆傷矣乃執兩手按于交倚上當前置一几謂之曰娘子當視此几猛擊之婦大驚連擊而心定矣戴人曰驚者平之平者常也常見必無驚矣夫驚者神上越從下擊几使之下視所以收神也 按此中醫理甚微且確有據非只如看花解悶聽曲消愁之常談也精於醫者應推之 陰經反形表證 三陰表法與三陽異○傷寒傳入三陰尚有屬陰發熱屬表仲景用附子溫經麻黃發表細辛爲導邪出而眞陽不出是少陰不可汗之表法一云此卽表裏傳也心悟謂此直中兼外感非傳經仲景是表裏兩解又太陰用桂枝芍藥厥陰用當歸四逆可議陰經用表藥例 前有麻黃附子等方後有細辛土蒸熬黍薑法宜參合用之 又冬不藏精溫症宜照此推熬黍薑汁膏敷 厥陰冷結膀胱小腹滿痛者吳萸以生薑汁陳酒熬膏敷痛處此卽治厥陰寒厥用當歸四逆加吳萸生薑酒之意可推 越經導赤瀉心 傷寒邪入心經心火上偏肺經神昏如醉目赤唇焦

者用黨參生地麥冬知母黃連黃芩黑山梔茯苓甘草
犀角滑石生薑竹葉麻油熬炒黃芩丹收加硃砂貼心口
凡心病宜用膏黃丹能鎮心也○按邪入心經俱屬險
症醫家習用犀角地黃而挽回者少且往往有引邪之
患膏藥大涼者與大熱者同貼於心口並能速效兩經
若當生者亦儘足以起如難下藥時此法却甚穩兩經
且存乎增變雨感症一日傳兩經仲景無**無陽者宜蒸**
無陽謂陽虛不能作汗也○按節庵治傷寒陽虛不能
作汗者用人參黃耆桂枝甘草附子細辛羌活防風川
芎煨薑大棗加炒白芍蓋補陽發表兼滋調營衛與東
垣丹溪治虛人感冒用補中益氣加表藥同意然非有
實據卓見不可輕投景岳又有麻桂大溫中等方竊謂
當遵古語無陽者宜蒸為穩如虛中風之用黃耆防風
蒸是也又陰虛人不能**臟結者宜灸**下後邪氣入裏
作汗者用柴胡當歸亦全**與陽相結為結**胸與陰相結為
胸結狀如結胸飲食如故時時下利舌
上白胎脇肋臍腹引入陰筋俱痛者丹田有熱胸中有
寒難治宜灸關元**刺大椎以除併病**仲景法太陽少陽
同陽解陰結危哉

太陽少陽刺肺俞以瀉太陽刺肝鍼三里而杜再經

俞以瀉少陽膏藥亦可做此貼鍼三里而杜再經

法傷寒七日熱甚不衰恐再傳陽明鍼足三里穴○柴

二症皆不可汗下故出此治法餘詳傷寒鍼灸門

胡當歸以調血室婦人傷寒與男子同治惟熱入血室

室無犯胃氣及上二焦用柴胡生地丹皮紅花等可參

亦有謂熱入血室不宜用涼如男人陰症而用涼藥者

須臾酌○熱入血室月水到來用柴胡四物搗餅

貼臍亦可加藥若寒氣客於血室血凝不行作痛者宜

桂枝桃仁又血結胸血為邪迫上人肝經聚於膈中

非湯劑可及當刺期門或蛤粉滑石敷取利痛用延胡

歸芍并泥竈土以護胎元○保胎法用井底泥和入灶

乳沒井泥竈土以護胎元○保胎法用井底泥和入灶

心上敷於臍下或加青黛又方用大黃寒之一症變

茵硝藍根浮萍蛤粉敷臍宜用前方為穩

有萬端莫測其名孰窺其奧窮之以百問而猶未析其

疑凜之以十勸而尙恐糾其謬李子建撰十若乃陰陽

勸不可不察

合邪營衛同病寒傷營風傷衛當衡緩急更量重輕傷中文會

通用古文傷中通用仲景所謂中風卽是傷風風寒種亦渾言實鑑謂傷寒有五種傷寒

中風濕溫及第傷寒見風其病猶恒而中風兼寒其患

斯劇既識傷寒須知中風風自內生亦由外致中風有內生外

中二因內生則因胃濁生痰志極動火外中則因形氣

不固感召風邪所以內生者病必痰迷不語火發神昏

外中者病必筋骨不用口眼始兆於指旋見於身中風

啗邪單發易治雙發難治之來

必有先兆如大指次指麻木不仁或手足無力或肌肉

微掣此營衛受邪外中之先兆也如上盛下虛頭眩脚

軟神短忽忽言語失常此痰火將發內生之先兆也預

防外中有羌活愈風湯卽十全大補加羌獨防芷麻細

柴前芫蔓菊薄荷蒼朴枳夏芩地知杞杜壽地骨防己也

預防內生有清熱化痰湯卽六君加星香芩連麥枳菖

舊竹茹也會治如前兆者二人因其人不耐服藥令

其以二方藥料熬膏常貼皆得無恙夫人非甚病誰甘

肝苦水況奔走勞役亦無暇計及於此及一發而不
收悔之晚矣貧者姑無論焉有力者豈不惜乎膏藥
而無損以之防蓋嘗察其經絡藏府之所屬邪肌膚
微杜漸誠善術也蓋嘗察其經絡藏府之所屬邪肌膚
不仁絡也左右不遂筋骨不用經也昏不識人便溺阻
隔府也神昏不語唇緩涎出藏也經絡淺腑藏深腑
必歸胃藏要不外乎表裏虛實之所宜凡中風牙關緊
必歸心是閉症若口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕聲
如舂肺絕更有吐沫肉脫髮直搖頭上竄面赤如妝汗
出如珠者皆是脫症多不救治法有解表攻裏先行中
道三法內外證俱有者先解表而後攻裏外感重先祛
外邪內傷重先補中氣風症皆痰為患首宜開關化
痰急則祛風緩則順氣久則活血氣順則痰消宜烏藥
血行風自滅宜歸芍諸香散真氣羌獨烏附防涸營
耗衛牛黃冰麝恐引邪入內○凡中風中痰中寒中惡
將兩手中指對合縛定艾丸灸兩指中間五壯重
者并灸頭頂百會穴中腕臍下氣海穴三處神驗先通
其關中風閉症先通關川南星薄荷皂角半夏細辛
鼻有嚏可治無嚏肺絕不治小兒驚風亦用此試

次開其噤

口噤用薑蘇南星冰片擦牙其噤自開此即鑑本

治小兒口噤神方也言乎汗寒傷蒸細辛傷寒誤服補

虛不可表者用大藥店整包細辛而風熏者防口噤不

能下藥者用黃耆防風煎盆湯置床下取氣如烟亦有

檀香之水也

棗精中風口開涎出後如有偏枯等症用

參桂枝牛膝二兩紅花五錢葱白六兩切炒預備言乎

吐寒傷措瓜蒂

傷寒吐實邪瓜蒂措牙出涎○吐風痰

汗表虛瓜蒂赤豆加全蝎吐之或搐鼻或擦而風搐參

牙風症之吐與傷寒不同風痰非吐不可而風搐參

吹鼻取嚏人參藜蘆細辛川芎生甘草一錢石膏五錢

亦小豆胆礬全亦有礞石之丸也同生丹真青礞石一

此吐之重劑

蘆汁中數次加猪膽汁熬冰片收臨用可
取一塊水磨滴鼻或浸紙塞鼻抵痰九
涎治一切風痰喉痺巴豆肉燒烟熏鼻妙○又巴豆壓
油於紙上捲皂角末燒熏鼻或用熱烟刺入喉內名
聖烟筒吐惡涎及血卽醒或巴豆仁搗爛綿裹兼有宣
塞鼻或巴豆明礬熬去豆取礬吹鼻并點喉蛾
滯之效卽下也○中風閉症使祕屬寒者巴豆納臍○
樸枳實者有用巴豆白芷半夏南星葶藶
者中藏不可輕下中經絡宜宣散尤忌下
正口眼喎邪草麻仁同乳香加麝搗塗左喎塗右右喎
或塗紙上捲塞鼻如拔疔出竹木刺取瘰癧惡核皆塗
患處又口喎用草仁和冰片搗塗冬加乾薑附子如
用時先皂角煎以逐外風再乳香熏以順血脈或炒香
附擦亦可○牽正散治中風口眼喎邪酒調用以療內
生之風虛熱之痰者卽白附子蝎梢五錢僵蠶一兩也
此方加薄荷三兩荆芥穗防風天麻炙甘草一兩羌活
川芎烏頭藿香五錢煉密九茶酒調塗喎處退風散熱
甚妙風而挾寒痰氣窒閉者可擦胸背與後控涎丸

用並有拔毒之能風毒攻注骨節痛用草仁乳香川烏

用草仁桃柳桑槐椿枝加茄根煎洗效如發熱逆冷大戟

苦參醉洗南星烏頭蠟裏中風發熱大戟苦參三兩白

心煩者用防風通聖加羌活獨活天麻細辛白附黃連

黃柏蠶蝎之屬藥異而理同亦可參用逆冷南星川

烏同黃蜡融化攤手足心并治驚悸此方加附偏枯暴

子木香末即治中藏四肢厥冷三生飲法也

瘡宗氣不周於經絡則偏枯不周於五藏則瘡又偏

肺絡也麻黃白芥酒敷偏枯表邪固結者麻黃或白芥子

得汗即去之按閉症發表用麻黃杏仁甘草肉桂又

治偏枯者左癱用四物右換用六君俱加薑汁竹瀝白

芥子如以麻黃白芥敷法推之亦可酌用○中風手足

不仁有濕痰死血者用川烏草烏六兩膽南星四兩乳

香沒藥末三兩乾地龍一兩陳酒調敷痛處或用薑葱

菲一斤白芥子蘿蔔子二兩汕熬黃丹石灰收調前藥

薄荷硼砂蜜搽

舌不能言心經蘊熱薄荷硼砂青黛二錢牛黃冰片三分先用生薑蘸蜜擦舌

再以前藥塗舌本并薑汁調塗胸

附方舌本強難轉

語不正屬痰涎壅塞者茯苓一兩蝎梢十四個研酒調

捷舌本縮者醋煮白芥子數頸一周利氣豁痰最

涼膈散加味心加菖蒲遠志黃連犀角硃砂之屬肝加

青黛之類可塗胸又舌瘡不能言足廢不能行屬腎

虛氣厥不至名風痺當溫之用熟地巴戟黃肉苁蓉附

子官桂石斛茯苓蒲遠志麥冬五味等分加薄荷如

熬膏貼風而雜合寒濕者為痺痺亦中風之一痺者閉

丹田妙三氣雜合而成病風勝為行痺古稱走注今名流火寒

勝為痛痺即痛風白虎歷節風濕勝為着痺即麻木亦

有在皮在脉與肉筋骨之殊忌收斂宜辛散行氣痿

者筋脉緩縱足不任地也由血虛火盛肺焦傳之五藏

又陽明虛宗筋弛縱帶脉不引故痿忌風藥及香燥溫

補痺外感痿內傷痺多痛病久入深或不痛痿輒而

不痛痺多寒痿多熱痺實痿虛程子痺異痿躄統言

曰醫家以手足痿痺為不仁蓋統言也痺異痿躄統言

理瀹駢文

三

不仁烏華三奈回本膏法擬三痺痛風除濕固本膏

歸續斷牛膝五加皮附子肉桂三錢杏仁白芷去梢一

金半麻油熬黃丹收貼此武本驗方○按痛風有寒有

濕有熱有血有痰之不同丹溪製上中下通用方蒼朮

黃柏龍胆草防己治濕熱南星桃仁紅花川芎治痰血

羌活桂枝白芷靈仙治風兼治寒加神麵以消中州陳

積之氣凡膏藥多通用此方可以取法三痺湯治氣

血凝滯手足拘攣者即人參黃耆茯苓甘草當歸白芍

生地杜仲牛膝桂心細辛秦艽獨活防風薑棗也原云

凡三氣襲虛而成痺患者準此固本膏即擬此方又五

痺湯用八珍去熟地加五味細辛隨五藏加藥亦可以

固本加之以藥酒之擦風痛用廣東馮了性藥酒擦或

法蒸木瓜酒擦或木瓜麻黃海風藤

稀莢草白茄根當歸防風秦艽酒煎擦或木瓜麻黃仙紫蘇

陳皮薑葱香油煎擦或用蒼朮蒼耳海風藤黃魚骨團

魚煎湯去魚洗或用金毛狗脊川牛膝海風藤木瓜熟

地歸身杜仲續斷秦艽桂枝桑枝松節酒煎擦通治

氣血兩虛疼痛麻木加牛膠并可塗○附方前胡白芷

細辛官桂白術川芎三兩炮附子泡吳萸當歸川椒二

兩茶酒拌勻以煉猪油熬膏摩治諸風痛癢癰瘡瘰癧
折傷○白虎風水牛肉脯一兩炙伏龍肝燕窠土飛麩
各二兩硫黃一麥麩之熨走注痛芫花桑皮川椒桂心
錢水九摩痛處一柳蛙肩麥麩醋炒熨或薑蔥
鹽麩酒醋炒熨并攤席上卧能和榮衛通經絡或芫花
黑豆生薑醋拌炒熨或炭灰炒糞紅花和醋炒熨養血
安息海犀之塗生附子川椒芸臺子等分研末熱則鈴

升熱痺用升麻為君同羌活防風痰洗鳳槐白鳳仙槐
桂枝羚羊角犀角薑汁竹瀝調敷

花銀花水紅花蘿蔔英蒼木甘草船石灰煎洗痰塊
銀硃雄黃宮粉麝香以槐白皮刺孔盛藥覆核上火焙

二炷香或銀花酒糟濃熱敷又寒痰草烏南星白果薑
敷熱痰大黃五倍牡蠣醋敷流注大薑黃身上小釘

子研末裝紅棗內塞瘰癧壁東垣養陰為東垣治諸瘰黃柏
鼻醉汗末潰者內消瘰癧壁東垣養陰為東垣治諸瘰黃柏

丹溪治痰補陰丸白朮二兩生地兩半酒芍免絲子瑱
陽龜板當歸陳皮牛膝各一兩乾薑黃柏炒虎骨炙茯苓

苓各五錢五味甘草炙各二錢猪骨髓腦全具又濕
熱甚者健步丸方已一兩羌活柴胡滑石瓜蒌根甘草

名五錢酒糊和丸葱白荆芥湯調用如前方用油丹熬貼後
方外敷極妙。又泰山石刻治風疾方羌活枳殼各三
兩北細辛香附吉梗麻黃去節防風白芍知母半夏當
歸甘草薄荷香石膏各二兩天麻黨參木香兔絲子
白朮稿本獨活各一兩全蝎僵蠶菊花川芎杜仲白茯苓
柴胡黃芩陳皮熟地蔓荊子地骨皮官
桂生地黃連各一兩如油丹熬貼并治痿
一粒凡風痰走注腰膝痛手足癱瘓麻木不仁白虎風
一粒草烏靈脂當歸芸香地龍木鱉仁麝名一粒金丹
加陳墨炭乳香沒藥糯米粉丸酒調敷名捉虎丸脚氣
貼脚心亦治流注乳岩瘰癧失榮惡核一切陰疽陸本
加熊膽一錢敷一切陽毒。治風寒濕痺疼痛麻木偏
頭漏肩鶴膝歷節并跌打傷陰症諸毒惟破爛者勿貼
小兒孕婦勿貼名見睨膏川烏草烏大黃靈仙寄奴
各八錢南星半夏羌活獨活紅花當歸桃仁蒼朮白芥
子蛇床子甘松三奈花椒皂角炮甲蕁荻乳香沒藥白
芷各五錢雄鼠屎各一兩短髮二兩焙俱研末先
將生薑葱白蒜白烟葉商陸開楊花白鳳仙艾葉每搗
汁半斤各用松香三兩收大蒜汁二兩用松香二兩收

另用麻油二斤四兩先熬髮再熬藥勿枯去渣下松香
再下陀僧硫黃各四兩收或少加黃丹臨用慘肉桂細
辛末

風而重感寒濕者爲痙痙症類癱瘓症通稱破傷

布離風痙身熱足寒項強頭搖口噤背反張者太陽無汗宜

汗有汗宜止通治羌活湯料分治神木白木湯料若頭

低視下手足牽引肘膝相搏者陽明宜下若一目或左

右視并一手一足搐搦者少陽宜和如傳入三陰腹滿

白利口燥咽乾舌卷卵縮難治內因傷寒雜症汗吐

後及濕家過汗或產後失血多所致宜八珍陳皮等加

減或用芎歸地黃防風之屬若痰火症宜枳實瓜蒌外

因潰瘍跌損狗咬貫風有之名破傷風鑑云痙與瘧通

稱破**保安力勝蠲痙**蠲痙羌活獨活防風地榆各一錢

傷風

腫杏仁泥飛麩水調塗即退保七粒塗瘡初起發熱紅

提發汗及破傷角弓反張并數蛇犬金刃傷出血川烏

草烏蒼朮羌活各四兩釵斛川芎當歸白芷麻黃防風

細辛荊芥首烏全蝎天麻稿本生甘草薄荷各一兩雄

黃硃砂兩頭尖各五錢末葱搗敷破傷口噤蜈蚣炙

全蝎炒加草烏天麻白芷末熱用茶調寒用酒調塞鼻

理論駢文

參之以椒氣之射

破傷風川椒麴裏煨俟熱透刺孔覆

中出水愈內因用此法覆取汗并治腹痛又破傷

燒酒熱瓶按黑水又狗咬傷核桃殼裏人糞槐皮

上炙葱餅之罨破傷為餅揭起瘡甲罨之汗愈左龍江鰓

之納破傷風入裏發指目直視日汗二便視用此下之

一錢蜈蚣二條天麻二錢末加巴霜半錢防風湯丸納

下陰則附防子肢厥汗冷者陰瘕風寒中藏也宜用附水

數蠮草破傷濕甘草水調牡蠣散○瘰癧河間通聖熱

風搏用此微獨重玉真九分破傷初腫起白痂南星防

表裏兩解又白附子十二兩南星防風天麻羌活白芷各二兩皆

生肌俱名黃連水洗酒調敷湯火麻油敷立刻止痛止血

加黃丹石膏甚者加龍骨兒茶各二錢敷○三黃寶蜡
 丸治跌打損傷破傷風並傷力成癆女人產後惡露不
 淨致生怪症瘀血奔心痰迷心竅危在旦夕并治烏龍
 打傷鉛子在內以香油燉熱化開雞毛掃患處忌生冷
 涼水燒酒三日否則無効亦可內服藤黃四兩糞窖浸
 四十九日用陳胆星劉寄奴紅芽大戟真血結各三兩
 雄黃二兩歸尾一兩五錢朴硝兒茶瓦楞子煨一兩琥
 珀鉛粉三錢水銀三錢同鉛粉研製乳香沒藥麝香三
 錢共末川好黃蜡二十四兩煉淨滾湯坐定人藥攪勻
 爲丸每重五分金箔衣○九分散麻黃木鱉仁乳香沒
 藥各二兩末敷治跌打損傷可配玉真用在上分偏正雷頭入腦則烈偏風
 透猪頭風之類○雷頭在下辨乾濕酒脚冲心則危脚
 風頭上起塊者卽時毒在乾濕酒脚冲心則危脚
 名緩風初起類傷寒表症乾脚氣不腫筋縮枯痛宜潤
 血清燥行氣濕脚氣腫痛筋脉弛長宜除濕祛風酒脚
 風因酒而得者脚氣冲心乃風三聖六聖喘首風三聖
 之自下而上挾腎水剋心火也
 頭風久不愈防風黎蘆瓜蒂喘鼻六聖散治頭風雄
 黃盆硝川芎白芷乳香沒藥喘鼻亦治腫毒蟲傷按雄

黃盆硝加米麝點眼大皆治白蛇纏及蜈蚣瘋犬等傷
痛一茶時即消腫定疼三日愈名劈毒丹此方加米麝

亦可天麻硫磺作餅頭風餅子治頭風天麻川烏草烏細

松防風白芷甘草各五錢寒食麪打糊為小餅名天麻

餅葱涎調貼太陽如火熱痰痛茶調并治婦人頭風眉

棱骨痛牙齒腫痛痰迷惡心○川椒硫華發薄荷為丸

頭風熱痛猪胆汁拌華發肉末晒研吹鼻或加川芎白

芷延胡青黛丸水化滴鼻咬錢出涎或用地龍人中白

羊胆汁丸全○又方冬桑葉一兩黃菊花五錢黑山梔

三錢獨活天麻二錢秦艽一錢半薄荷湯丸熱水化洗

並宜白附白附子二兩川烏防風川芎荆芥殭蠶石膏

錢草烏乳香沒藥雄黃三錢麻油熬松香黃蜡收雷頭
加黃丹少許治偏正頭風肝風血風破傷風
菜豆醋塗又沖和膏葱二妙三妙敷緩風脚氣紅腫者
者寒濕通用薑葱白芥子等敷蠶砂等熨又蒼朮黃柏
鹽酒炒為二妙加牛膝為三妙同何首烏黑小豆蒸熱

敷佳并樟烏蘇合爲團寒濕烏頭樟腦醋丸貼足心微

治痿症言煮入瓊甘石金黃作散甘草滑石研以馬蘭頭汁調

片收乾貼敷去濕熱非治流火○如意

金黃散酒敷治濕熱脚氣并鶴膝風等○兼用木瓜乾

人參敗毒散加蒼術大黃薑汁調敷亦全

瓜四兩蒼術二兩天麻南星羌活防風黃耆肉桂杜仲

牛膝附子續斷當歸薏仁草薺石楠葉檳榔欬石斛各

一兩加熟地川芎赤芍陳皮烏藥杏仁等分酒脚風松

油熬黃丹收治腎虛腰膝痛并乾濕脚氣等

毛糟熨松毛酒糟入腦者敷鴟鳥而吹遠志鴟鳥腦一

白附烏貼或遠志研末吹鼻凡治沖心者罨田螺而

頭風連腦者用禽獸腦同藥熬貼良候溺出或敷股上

踏川椒覺冷氣趨足而安亦引熱下行也礬石方見前

○川椒盛囊踏足下或附子貼肝風掉眩獨活定其搖

足心○脚氣從足心入宜按摩

醫書有顛振門○暈者痰因火動也亦有七情四氣心

等因獨活爲定風草○失血眩暈龍骨或髮灰嚙心

理淪駢文

風癡迷菖蒲開其慧

癡者癡呆之狀此志願太高而欲

致癩猪羊顛風也小兒為多○丹參麥冬薄荷二兩茯

神天麻貝母半夏陳胆星橘紅一兩鬱金兩半明礬八

錢遠志七錢全蝎僵蠶甘草牙皂五錢硃砂三錢琥珀

犀角雄黃二錢石菖蒲三兩研末薑汁竹瀝為丸如彈

大臨用薑汁化開擦胸治癩十指風若雞爪風類從即

亦治癲狂與後控涎丸參

用雞屎而洗

線雞屎花椒枯礬煎冷

雨股風如鶴膝下

達應加牛膝而敷

鶴膝風症膝頭大腿細痛而無膿者

獨活元參生地熟地草薢天麻當歸杜仲防風肉桂牛

膝之類可參入後敷藥麻油熬黃丹收貼○治鶴膝白

芷酒熬膏塗良或用甘遂大戟蜜敷或用地骨皮無名

異車前子乳香沒藥敷或首烏側柏葉敷或鱉魚酒糟

同麝搗敷六七日作熱効或用靈仙一雨生薑

汁葱汁熬入牛膠化開黃丹收貼并治諸風

打箭風俗名鬼箭癩風天刑

打益中暗風也惡風也此症初起必有一

處麻木針之不痛漸而白屑雲頭紫黑疙瘩破流膿水
甚則眉落毛脫鼻崩肉陷唇翻眼錠全身潰爛此五藏
皆壞危矣初起宜節欲斷鹽以大黃黑丑磨擦以亂髮
金苦參皂刺檳榔輕粉甘遂生薑麻黃熬擦
桃葉痛拍青色卽平 治鬼箭風忌針以桃葉亂髮爲團
熨斗熨痛蘸燒洗以芑硝桑皮 治麻風大黃芑硝桑皮
酒拍得青色愈
用琥珀或爛摩黑膏可斂 白膏治麻木不知白芷白朮
靈脂搽 爛摩黑膏可斂 前胡吳萸一升芎藭二升蜀
椒細辛三兩當歸桂心二兩醋浸藥猪油十斤熬膏塗
若偏體生瘡膿血潰壞用黑膏烏頭川芎雄黃胡粉木
防己升麻黃連雌黃黎蘆明礬五錢杏仁去皮尖巴豆
仁各四十枚黃柏錢八分松脂亂髮各一團爲末猪油
熬膏鹽湯洗塗○附方槐柳桃桑楮蒼耳子地膚子煎
坐沒頸湯如油効或坐麻油中或露仙甘草或地骨皮
苦參荆芥細辛防風蒼耳子等俱可煎浴○眉毛脫落
作痒者雄黃硫黃雞殼內白皮燒存五錢炮甲十片滑
石末一兩油核桃半斤搗猪胆汁調絹包擦○面生紫
塊疙瘡山甲燒存性川椒炒二兩末搗生薑大黃汁調

擦○頭禿羊屎燒灰油塗○大鰐偏身者杜仲蛇床子
明礬寒水石硫黃二兩朴硝五錢猪油塗○眼努白丁
香貝母點○癩風赤游鶯掌風當歸生地一兩麻黃大
楓子仁元參防風木鼈仁五錢黃蠟熬塗○清熱解毒
用黃連
五倍塗其動也無端其走也不定攻於頭面則虛而浮

客於腸胃則祕而洩行於肢節為腫為攣發於皮膚為

熱為癢要和血而養血庶消風而散風篇中皆有方可治臨症可酌用

○治風熱蘊結氣血凝滯頭目昏眩或痛鼻塞聲重牙
疼口乾咽喉不利胸膈痞悶咳嗽痰涎腸胃燥滿小便
赤黃或腎水陰虧心火熾甚瘡瘍腫毒丹疰癰疹並治
用羌活獨活防風荆穗川芎薄荷連翹細辛天麻吉更
當歸黃連梔子黃芩白芷全蝎甘草芒硝大黃元參生
地白芍知母黃柏花粉各一兩槐柳桑枝各三斤麻油
熬黃丹鉛粉收消石石膏各四兩硃砂五錢和勻或加
雄黃青黛各一兩全此靈砂丹加味治一切風熱並効
統觀風不一風亦猶寒非一寒顯俱易明微盡難析矧

有真有正

真中風正傷寒

亦有類有同

類中風者初起皆卒倒不語也類傷寒者初起

皆有太陽表症也同傷寒者與傷寒同也類中風入中

虛中氣中食中寒中火中濕中暑中惡也類傷寒五停

痰傷食虛煩脚氣內癰也同傷寒十二冬疽寒疫瘧疫

溫病熱病風溫濕溫溫毒中暈溫瘧風濕瘧病也詳見

鑑本茲合兩症與決所疑虛補其虛

景岳云凡老人跌倒多陰陽脫離宜補

煩解其煩食塞吐食

食出脉現

痰停出痰暴如惡忤

中惡蘇合丸擦

紫金錠塗

令兒尿其面

鬼擊雄雞血塗

痛若內癰

面并胸再以血滴鼻并破雞搗胸雞冷棄之

酒痺須瀉

酒濕作痺須瀉濕毒

脚氣喜通各有治法俱見本門風

於氣厥最近而痰火其著

見前

寒以時行為多

世人傷寒病少時氣

病而溫熱其變

冬寒不即發至春變為溫病至夏變為熱病又有風溫濕溫等治法詳見醫書

篇中均有方

牛黃蘇合分涼熱之阻擦胸口以醒迷

凡

可增減易借

藏閉症熱阻關竅牛黃丸擦胸寒五仙萬靈合表裏之

阻關竅蘇合丸擦胸并治氣厥者

消貼背心以達靜冬疫多寒春疫多熱○治春疫五仙

膏乾葛二兩大黃四兩麻黃白芷細辛甘草三兩麻油

熬黃丹收滑石六兩攪勻貼○治冬疫五仙

萬靈膏元參苦參生地黃連黃芩山梔大黃當歸川芎

白芷赤芍羌活獨活防風連翹花粉吉更五倍皂角白

芩仁髮團各一兩槐柳桃枝馬齒莧各八兩麻油熬黃

丹鉛粉等分松香黃蜡二兩收百草霜兩半輕粉兒茶

乳香沒藥五錢麝一錢攪勻治四時傷寒及溫熱症貼

背心胸口可代羌活湯通聖散敗毒散用凡一切內外

熱病皆可貼一方無百草霜有兩頭尖五錢○又方照

此加黨參熟地草烏白芍沈香丁香木香去羌獨防翹

芩梔粉吉倍芩嫩慈戟槐柳桃枝馬齒莧輕粉等治四

時傷寒貼背心并治外症亦名萬靈膏較前方為溫

元虛則風走其空竅

而陽衰則寒泛於水藏

言論而陽衰則寒泛於水藏

沈金

必明其素有而識其本來自仲景肇論諸家相承

劉李朱家

此為大症不惜臚陳傷寒中風為大症故此篇首特詳

其他諸症則略焉篇中不亦足見治風寒之兩門而非

僅守感冒之三法三法一避風二靜臥三耐餓感冒輕

惟泄其氣而虛變生他症故夏至陰生金為火燥內寒

外熱心旺腎衰其氣多虛其毒彌烈詳見醫書。夏月

火行令也寒傷形故無汗暑傷氣故有汗外症頭痛口

乾面垢自汗嘔逆泄瀉少氣倦怠其大較也有餘症者

後有傳變也元氣虛人每有一時不救者與傷寒陰毒

害人實同不可不慎。暑邪傷在分肉為傷暑傷及藏

府為中暑尋常嘔吐泄瀉為冒暑夏月受暑為風寒所

固至秋冬始發為癰痢霍亂者或由曝衣曝書未盡之

食至秋冬觸發者為伏暑又夏月四肢倦怠不思飲

食為熱傷元氣卒倒搐搦者為暑風暑風中臟多不救

口噤者為暑閉用傷暑者因寒而中無汗即是傷寒暑

藥不開者亦難救高堂陰寒所偏暑不得越反中入內致頭痛惡寒中喝

發熱無汗者為傷暑陰症也與傷寒同治宜溫散中喝者由熱而傷大渴斯為中熱

熱大渴為中喝陽症也審其暑先嗽齒凡暑皆白口齒

虛實或清或補忌溫散洩氣暑先嗽齒而入直傷心包

絡經故受暑急嗽口凡中暑發昏非水滴兩乳喝且澆臍中熱倒者忌飲涼水

草紙卷筒燒烟熏鼻或嗅皂角末通竅或大蒜搗泥裏

塞鼻再取途中熱塵土或田中泥漿積心口及臍上作

一窩使人尿昏暈絕則熏熱白檀中暑挾虛暈絕者沈

其中白醒昏暈絕則熏熱白檀香檀香燒熏令香氣

滿室以達其竅即醒暑風手足搖擗者煩悶甚則塗

以蘇合丸擦之并用香薷黃連煎水搨胸煩悶甚則塗

調黃土中熱口渴面赤煩躁欲死掘地深尺餘取淨黃

土以新汲水調化敷胸口及臍上又中熱煩

渴者用天水散滑石甘草煎水熨并敷臍腹麪可涼敷黃龍之

湯知母石膏甘草煎水熨并敷臍腹麪可涼敷黃龍之

九盞試

暑症身熱頭疼狀如傷寒煩渴嘔吐昏悶不食

井水調敷腹即黃龍丸也。田螺三枚搗爛入青鹽水

三分攤膏貼臍下一寸三分治受暑二便不通者

能溫熨

中喝熱湯熨氣海固元氣

白虎之湯宜行

見上虛加黨參煎熨

症以蒜

擦脊骨三關悉開

凡人遇春末夏初頭痛脚弱食少身熱為疰夏病屬陰虛元氣不足宜於

午日午時用漂硃砂明雄黃舶硫黃各一錢研末燒酒

和勻用大蒜去蒂蘸藥從尾間脊骨起徐徐逐節擦上

此藥能開背後三重關竅令人神清氣爽經絡流通大

有益處癆症不論新久皆能除根擦時有腫痛乃蟲所

在切勿

放鬆 痧以油刮背心五藏咸解

陰痧腹痛手足冷燈火爆身上紅點陽痧

腹痛手足暖以針刺十指尖臂上腿灣紫筋出血或用

鹽擦手足心莫妙以磁調羹蘸香油刮背蓋五藏之系

咸在於背刮之則邪

霍亂浸陰陽之水

霍亂胃虛病內傷飲食外感風

氣隨降病自鬆解

寒陽不升陰不降乘隔而成濕土為風木所克心火上

炎則吐吐者喝也脾濕下注則瀉風急甚則轉筋轉筋

入腹則斃 又身熱口渴氣粗暑也體重骨痛濕也唇

青肢冷氣少寒也無此數症是傷食 又煩渴者熱或

初起不渴損傷津液則渴。此症寒熱倉卒莫辨不可

偏重粥湯薑湯熱湯下喉卽斃古有大盆陰陽水浸足

法或入胡椒菜豆黃 半夏兼填 填臍內吐瀉點日月之

連乾薑皆寒熱並用 半夏兼填 通陰陽 吐瀉點日月之

丹 邪在上焦吐下焦瀉中焦吐瀉交作 吐瀉者爲霍

氣痛絞腸痧霍亂吐瀉轉筋點眼并淹跌益尙未絕者

麻辣淚流過腮卽愈立秋前一日晒用雄黃礪砂朴硝

冰片麝元明粉各等分研此方去元明粉加枯礬乳香

沒藥硃砂卽人馬平安散。按乾霍亂宜薑擦燒鹽湯

探 藿香并塞 鼻。治霍亂吐瀉腹痛蒼朮藿香陳皮半

晚蠶砂二兩生薑葱白各三錢炒熱布包熨妙。按陳

脩園論藿香正氣散云凡四時不正之氣都從口鼻入

與邪傷經絡者不同故只用芳香利竅之品使邪從口

鼻入者仍從口鼻出也若夏月吐瀉多屬伏陰在內宜

理中法此雖外 絞腸芥子填臍炒鹽頓其胸 凡腹痛多

治亦不可不知

絞腸芥子填臍炒鹽頓其胸

凡腹痛多

治亦不可不知

絞腸芥子填臍炒鹽頓其胸

凡腹痛多

治亦不可不知

絞腸芥子填臍炒鹽頓其胸

便祕者熱腹痛腸縮則絞。先用白芥子或鬱金烏藥
細辛木香降香沉香砂仁九納臍炒鹽包頓胸或電臍
以碗覆之如身冷汗汗出者加吳萸炒髮胸背兼治轉筋
○脾元虛損霍亂不吐瀉腹脹如鼓心胸痰塞用丁香
七粒苜蒲根五錢炙草一兩生薑三大片鹽一合炒髮
○附西醫治霍亂法云此症服藥緩不濟急用熱手搓
擦周身外皮令熱濃芥末略用麪粉滾水攪和貼肚臍
或布包裹熱磚足踏之以傳溫熱蓋熱則血通行可救
或令二少男前後抱住病轉筋大蒜塗足煮醋抹其腹
者轉接溫暖最有功力

轉筋因津液傷宗筋不潤所致古用轉筋飲卽木瓜吳
萸食鹽也。按寒則筋攣轉筋者繫其腿脛勿令入腹
或用熱醋煮青布抹胸腹或蒜鹽敷臍或蒜泥或加黃
蜡塗足心南星醋塗足心或木瓜或香櫟煎湯揉或蘇
合丸擦如轉筋已死心下尚溫者用硃砂二錢和黃蜡
三兩燒烟熏口鼻并臍更貼手足取汗。夏月霍亂最
多傷人甚速服藥殊不易外治穩而效故錄前賢辨症
并附列各方以備擇用焉下如痢瘡等症詳註亦以此
鑽心雷火之方是挑砂症麻木發慌目閉喉腫心痛者
是挑胸背紅點再用半夏製木香三

錢細辛牙皂三錢五分明礬二錢五分藿香吉更薄荷
貫仲白芷防風甘草二錢枯礬五分研搗鼻并治諸痧

○挑法詳吊脚糝雷公之散見前時痧生瘴吹靈寶亦

痧症指微熱病即暑濕所蒸山嵐之氣也靈寶如意丹吹鼻用茅

山木六兩真藿梗三兩真蟾酥沈香檀香丁香木香麝

香明雄硃砂各六錢治一切感冒風寒暑瘴九種氣疼

痰迷心竅各種痧氣小兒急驚并一切疑難雜症俱効

此方種福堂去藿梗沈檀加山茨姑一兩石菖蒲炒五

錢又一方只去藿梗檀香卧龍丹寶花散黑痧藥白

痧藥等茲穢塗玉樞暑穢之氣也夏月出門清泄利瀉

不備載脾濕不能滲泄致傷關門元氣不能分別水穀併入大
腸而成瀉雖風寒暑火痰食不同未有不由於濕者也
治以滲濕利小便為主凡水瀉腹響不痛者濕也痛
甚而瀉瀉而痛減者食積也瀉時小腹痛腸鳴痛一陣
瀉一陣者火或瀉或不瀉或多或少者痰完穀不化者
氣虛也又痛而便帶清血者風也悠悠腹痛瀉無休止
面色青者寒也煩渴赤赤自汗暴注無度暑也○痢由
暑濕痰食積滯而止肚腹疼痛大便裏急後重小

便短赤不長治法先治暑六一散至妙初起踈通積滯
久則清熱解毒兼理脾胃忌升瀉赤屬血分根心白
屬氣分根肺或帶黃色則病因酒食痰涎而根於胃
腹痛者肺氣鬱在大腸實者下之虛者吉梗發之忌參
耆裏急後重者火熱清之氣滯調之積滯去之氣虛
升之噤口者胃氣下陷而不食不洽熱毒上冲不食
宜解毒若寒氣逆上作吐者宜溫如白蔻之類膿血
痢與赤痢不同前是濕此是火五色痢屬五藏熱多
寒少宜通利休息痢屢止屢發或補瀉太早滯未清
或失調養氣血不斂瀉病在中焦痢病在下焦由肝
腎而遞于大腸宜調理真陰助理氣化為主痢久傷
腎宜峻補元陽瘥後痢痢後瘥均以虛論瘥痢並
作先治瘥下痢身涼能食小便通易愈身熱多汗渴
甚小便不利手足冷兼氣微喘不食者危○小兒痢腸
痢及滑腸痢皆惡候○而髮平胃散於腹通治瀉痢用
痢症繆倪二家論最精○而髮平胃散於腹蒼朮厚朴陳
皮甘草炙各一兩布包放臍上熱髮斗髮之偏藥氣入
腹更放枕邊嗅其氣即開胃思食良法也如治瀉加猪
苓茯苓白朮澤瀉官桂如治痢加羌活草烏黃連吳萸
大黃枳殼當歸白芍黃芩木香檳榔尤妙○又平胃散

去甘草加山查炭車前子末治水瀉。平胃散加減治
血痢用白朮厚朴陳皮甘草一兩木香檳榔三錢桃仁
黃連茯苓黨參當歸生薑髮團各五錢煎以牛膠入黃
丹收貼如實者加大黃。平胃散治甚多如加黃芩烏
梅卽分以車苓水瀉車前子水調敷臍寒瀉車前子肉
治瘧分以車苓
官桂厚朴末或丁香枯礬末或胡椒大蒜葉吳萸灶
心土均納臍熱瀉車前子搗汁調甘草滑石末敷臍或
猪苓地龍針砂末葱汁調敷臍針砂消積平肝或滑石
一兩丹皮汁浸煮收乾加酒芍五錢炙草二錢炮薑五
分水調敷臍。氣虛暴瀉硫黃枯礬砂通以巴黃
先納臍瀉不止艾一斤坐身下火烘脚
巴霜胡椒靈脂乳香沒藥麝糯米飯丸硃衣納臍或巴
霜黃蠟九納臍瀉中有瀉也上用暖臍膏蓋再加木香
丁香百草霜杏霜肉蔻霜九卽治冷積瀉痢方雖用巴
豆不瀉可悟用藥之法。熱痢大黃末水丸納臍一
方大黃蒼朮生香附熟香附生靈脂熟靈脂各四兩羌
活二兩川烏黃柏延胡黃芩枳殼檳榔青皮陳皮當歸
酒白芍皂角菖蒲車前子各一兩黑丑煨黃連吳萸木香
薑黃僵蠶蟬蛻各五錢滑石四兩生薑蘿蔔子各二兩巴仁

七錢麻油熬丹收貼此方行氣而不泄或加水龍山甲
○附方痢紫黑者熱茜草梧葉煎湯浸足痢後裏急
後重黃耆防風枳殼煎黑并洗氣虛者最宜又西醫治
裏急痛苦者鴉片水及麥漿溫水裝水節射入肛門或
用鴉片丸塞坐熱水中熏洗虛寒痢胡椒鱖魚搗敷
臍或官桂針砂枯礬研涼水調敷臍白痢吳萸六一
散敷或黃瓜藤燒存香油調貼臍清熱或用炭盆噴醋開胃
或黃瓜藤燒存香油調貼臍清熱或用炭盆噴醋開胃
或黃瓜藤燒存香油調貼臍清熱或用炭盆噴醋開胃
貼小腹并臍如熱不可當放下口中不辣再敷取效止
或用癩國一個破腹加麝搗敷臍或田螺薑葱豆豉搗
敷或田螺同細辛肥皂三錢葱三根酒藥半個搗敷俟
乾揭去熱毒既解自思飲食○滑腸痢葱椒搗塞肛門
○大孔痛者麻油炙枳實熨或用黃蜡艾葉詞子肉燒
烟瀉毒以木龍水瀉木龍仁丁香口水調納臍洩氣愈
熏瀉毒以木龍水瀉木龍仁丁香口水調納臍洩氣愈
痢木龍仁一兩山甲五錢香油熬黃丹收或加大黃牙
皂僵蠶一用木龍仁杏仁桃柳枝麻油熬黃丹收乳
香沒藥調槐枝攪麝香和一用薑葱蒜熬膏入猪毛
灰松香樟腦雄黃硃砂并治跌打

髓仁乳香沒藥薑蔥麻油熬丹收松香久以烏梅漬之

黃蜡攪數方可併用或加黃連阿膠烏梅一斤煎

盆湯坐熏清熱解毒亦可同蠟牛敷臍寒宜附子○按

痢有似痢非痢者裏急後重或胃氣下陷或腎虛大瘕

泄或下多血所致宜升提補瀉者須辨後重有二

邪氣墜下圖後不減虛膏用回春回春瀉痢膏詞子肉

坐努責圖後即減為異膏用回春回春瀉痢膏詞子肉

蝦龍骨二兩乳香沒藥五錢熬膏貼初起勿用冬加肉

造仁末○按瀉痢聖餅子用黃丹定粉陀僧硫黃輕粉

麝和搗貼臍甚妙如加和瘕瘕暑夏傷於暑秋必瘕瘕夏

入瀉痢膏中作收亦良和瘕瘕暑夏傷於暑秋必瘕瘕夏

由中氣不足脾胃虛弱暑邪與風寒乘虛客之而作無

痰不成瘕無食亦不成瘕治宜清暑祛風化痰兼理脾

胃為主初當汗解無汗要有汗祛邪為要有汗要無汗

輔正為先○瘕者少陽也出與陽爭陰勝則寒入與陰

爭陽勝則熱雖純熱無寒為痺瘕純寒無熱為牝瘕要

皆自少陽而造其極偏補偏救弊亦必還反少陽之界

陰陽和而瘕自己矣○三陽氣分受病傷輕三陰血分

受病自臟達腑傷重○三發後可截截早邪閉截遲人

虛。勞瘧寒熱微寒中有熱熱中有寒最難愈。而久瘧腹有痞塊名瘧母。瘧變痢為重痢變瘧為輕。

東常以飲於臍。老年患瘧畏服藥者常山草果陳皮甘

方加蒼朮檳榔半夏川芎當歸荊芥防風知母杜仲一錢烏梅五錢先一二時炒熱捆縛臍上并以三分填臍

眼其發必輕再發再掘愈良法也。一用草果常山丁香全則截法也。此與治痢平胃製法皆名醫所傳以代

內服者用古湯頭而外治實疏以柴青。治瘧發汗法柴

開無限法門諸症可倣此用。疏以柴青。胡一握搗爛絹

包擦周身得睡有微汗解或用柴胡當歸知母山甲煎

湯新棉花或布蘸熨背。脇痛青皮炒熨。瘧者肝積

柴青調以貝夏。薑汁貝母半夏為滋陰以鼈甲。首烏全

疏肝。臺治時氣瘴氣黃病痰瘧赤白痢用鼈甲茵陳梔子苾

硝各二兩大黃五兩常山杏仁炒各三兩巴豆一兩豆豉一兩二錢人嫌其峻不用油熬丹收貼佳。勞瘧表裏俱虛少勞復來鼈甲醋炙四兩川芎當歸青皮陳皮白芍半夏茯苓烏梅生薑一兩油丹熬寒多加草果熱多加柴胡。瘧母鼈全個青皮蓬朮皆醋炒當歸三兩

山甲土炒一兩油熬久以白椒截之久瘡用白胡椒末

丹收或加莧并治癰效或加草果巴豆末貼背後第三

第三骨節或加靈仙吳萸丁香官桂貼并貼臍兼治感寒水

泄○附截瘡方一薑汁化牛膠攤細布一長條從衣領

起至尻骨止先將皂角水洗過再貼并敷兩膝蓋效一

用川椒雄黃桂心麝納臍膏蓋之一用巴霜飛麪貼額

上一用胡椒硫黃糝膏貼命門穴一用蜘蛛人言黑豆

丸塞耳先一夜獻於北斗下次早面東塞一用大蒜搗

敷臂上內關穴或用桃仁十四粒全一用大蒜胡椒百

草霜丸縛於曲澤穴內關穴在腕上積三個中指長卽

是曲澤穴在臂膊灣上三寸是一馬齒莧或旱蓮草

頭搗數寸口古錢壓定起泡挑破愈名天灸○陰瘡用

春雷丸巴豆東桂枝南明礬西青黛北雄黃中各五錢

麝香東硃砂南白芷西黑附子北硫黃中各一錢配五

方之神午日取五家粽子爲丸男左女右棉裹面東塞

鼻發過除出如法塞三次永不發醋洗收藏可治三

人○久瘡經年寒熱連綿體壯實者生薑汁燒酒麥麪

搗勻作餅七枚塗天柱頸骨及背心胸坎臂灣腿灣七

處再用斑毛巴豆霜蟾蜍硃砂雄黃麝棗肉丸漿豆衣

貼眉心神庭穴名眉心膏周時揭去投河中。久瘧人
虛嗅甜肉桂或塞鼻則寒自退熱自輕神爽氣清思食
而愈。脾寒虛瘧附子末溫酒調塗背上或塞鼻塞後
勿食湯水過時即愈一加雄黃樟腦。黃丹拿法見前
○按截瘧只用白胡椒一味已効茲備錄多方者以
見貼穴之不同而用法之無窮所以啟人之悟也 膏

資林屋

林屋山人陽和膏新鮮大力子根葉梗三斤白

草烏附子肉桂官桂枝末當歸地龍蠶蠶赤芍白芷

白芨白欽二兩川芎四兩續斷防風荆芥靈脂木香香

櫟陳皮一兩入油熬要老下乳香沒藥末二兩蘇合油

四兩攪臨用加麝香貼此方治三陰瘧効并治一切陰

疽惡毒

濕由弱積而為水則濡其脾內因生冷酒麪

凍瘡

宜實中淡味滲泄利小便外因陰雨濕地宜汗散久則

疎通滲泄之。凡濕皆脾病在經發熱在關節痛在藏

府脹。凡濕以尿赤口渴為濕熱尿清不渴身體冷痛

為寒濕。古方燥濕蒼朮黃柏參濕車前滑石又上用

平胃下用五 燥屈金寒復而為火則梏其肺外因燥令

苓皆藥例 久晴皮膚

里膏并之

乾燥令人狂或內因七情或吐利亡津或金石炙燔酒漿耗液或房勞竭精皆宜清熱潤燥此症雖有風燥火燥熱燥氣虛燥之殊要皆由血少火多所致按丹溪曰病皆由外感內傷生濕生火濕而生熱火而生痰四者而已少壯新病則燥其濕清其熱瀉其火豁其痰無餘蘊矣老衰久病攻半補半焉又曰肥人氣虛生寒寒生濕濕生痰瘦人血虛生熱熱生火火生燥是濕與燥相爲對待也故合論之又龔氏曰寒濕屬陰燥熱屬陽人病不過二者而已燥熱以通聖散泄其陽寒一則收濕以五積散散其陰膏亦可合○又燥屬金寒一則收

之以瀝青赤豆

瀝青膏治濕第一生薑葱白韭白大蒜白鳳仙開楊花商陸根取汁各一碗加

燒酒米醋童便各一碗按次第製松香一過再用水熬川烏草烏蒼朮白芥子草麻仁官桂乾薑髮團各一兩廣膠四兩樟腦一兩和勻以前製松香收布攤貼○此製松香法甚佳可多製備用○通治濕熱除濕膏羌活草烏蒼朮防風黃柏靈仙甘遂大戟葶藶半夏川芎厚朴檳榔澤瀉白芥子赤苓各二兩黑丑煨白木萆麻仁赤芍乳香沒藥黃芩陳皮皂角梔子生薑各一兩油熬黃丹收滑石四兩松香六兩攪內症貼臍外症貼患處

或加黃連大黃。各種濕熱羌活獨活大黃當歸赤芍
白芨白朮商陸馬前子葶麻仁男髮麻油熬黃丹收亦
治腫毒未成消已成愈。濕熱凝結川烏草烏五加皮
官桂文蛤白斂花粉一兩陳小粉炒黑一斤醋熬膏貼
并治跌打腫毒。頭面帶重者赤豆噓鼻出水一則滋
肚腹腫脹者赤豆敷臍行水。寒濕見風痺門一則滋
之以地黃元參精血內燥熟地當歸山藥杞子黃柏知母
莢肉白芍生地元參從蓉麥冬花粉
大冬黃芩一兩五味紅花生甘草五錢麻油熬黃丹鉛
粉各半收石膏四兩攪勻攤貼胸口可以止渴生津貼
丹田亦潤腎燥。老人頸燥血虛也地黃汁塗。鼻燥
肺火也元參浸塞或用生地黃連黃柏薑黃當歸尾香
油熬首蒙肢倦欲升陽濕在上則首如物蒙脾胃有濕
則肢倦。陰濕挾痰頭重麻黃
膏塗
根苦丁香羌活連翹赤口渴洩多思減水渴而多飲為
上消肺熱消
豆末噓鼻。脾用平胃
穀善飢為中消胃熱渴而尿數有膏油為下消腎熱。
黨參苦參黃耆生地熟地天冬麥冬五味枳殼花粉黃
連知母茯苓澤瀉山藥牡蠣烏梅乾葛浮萍各一兩雄
猪肚擦淨裝藥油熬丹收益元散攪。消病傳為脹滿

發為癰疽遂丑之餅只可掩臍治濕氣腫脹并脚氣等

同蕎麥水和餅飯歸硝之湯亦宜摩腹大腸燥結當歸

上蒸熟掩臍上二兩大黃一兩

因硝甘草五錢煎湯摩腹或面色浮澤

熬膏貼此類方宜於外治如其身體重着及身體重

著皆中糟納其脚中濕以糟坊中酒糟蒸熨若使皮膚

濕之病即納脚於酒糟中汗愈

皴揭也蠟潤其肌當歸紫草奶酥油麻油熬黃蠟收塗

香升麻香油或麻黃羌活防風當歸白芨白檀

熬黃蜡收塗火生於氣火陽氣也與水對待陰陽和平

。陽氣有餘即是火。又火主動醉飽胃火動恚有君
怒肝火動悲哀肺火動房勞腎火動心火能自焚
火心為君火。五志過極皆為火凡見喜怒哀思恐之
者證皆以平心火為主至於勞者傷於動動便屬陽驚
亦皆以平心火為主相火起少陽胆游行三焦督署於
亦為元氣之賊煎龍雷之火水中之火五藏起相為煽
熬真陰陰虛則病即陰火也

五藏皆有火相火盛者如頭目赤腫口渴引火湧泉心

火動五火隨之凡火盛不能驟用寒涼又不可純用寒涼附子

津塗末津調塗足心引熱下行至妙虛火假火亦可

用○通治實火大黃當歸生地各二兩黃柏黃芩黃連

川芎柴胡乾葛薄荷連翹赤芍梔子知母黑丑各一兩

犀角片羚羊角片各三錢麻油熬黃丹兼滋其腎風火熾

收石膏滑石各四兩攪一有生甘草盛當用

元參生地滋水陰火上火衰者凡命門火衰真陽補火

沖宜用黃柏末塗臍下火衰者上浮者宜用附桂補火

求龍馬湧泉膏用海龍或海馬一對附子一兩零陵香

石冬蟲夏草末高麗參川椒丁香攪勻貼足心少年勿

用徒起泡無益也一用海馬鹿茸人參大茴菴蓉熟

地地龍麻油熬黃丹熱因於火半表裏氣血虛實之分

收沈香肉桂糝貼全熱因於火半表裏氣血虛實之分

○凡輕按熱者在皮毛血脈主心肺日中日西尤甚重

按熱者在筋骨主肝腎寅卯時亥子時尤甚不輕不重

中按熱者在肌肉主脾夜尤重○五藏陰也陰足而熱

反勝之為實熱陰不足而有熱為虛熱○能食口渴便

秘爲實不能食自汗短氣爲虛。發熱惡寒者發於陽。無熱惡寒者發於陰。惡寒非寒明是熱症惡熱非熱明是虛症。○久病非寒暴病非熱。○均宜詳辨。○表熱宜柴胡裏熱宜黃芩氣實熱石膏知母甘草血實熱大黃當歸白芍甘草氣虛熱當升陽以散之。著朮升柴之類。血虛熱當滋陰以降之。二地二冬知柏之類。外治方少故略引藥例以備用。○治心肺胃肝胆腎熱及上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩等症。薄荷八兩生地六兩麥冬四兩當歸柴胡蒲黃木通各二兩黃耆黨參黃連生甘草酒白芍各一兩麻油熬黃丹收阿膠一兩。有晝熱夜熱子午之熱。晝及夜屬陽在氣分日夜攪貼。發熱日重夜輕口中無味屬胃虛。午後發熱夜半則止。口中有味屬腎虛。潮熱無時爲外感爲實潮熱有時爲內傷。四肢鬱常不伸。○火鬱症屬內熱外寒四肢主脾爲虛。○火鬱症屬內熱外寒四肢主脾。肌膚筋骨熱如燎者由血虛而熱。伏脾土或過食生冷抑遏陽氣於脾土中也。○火鬱發之柴胡防風升麻葛根白芍甘草。虛熱者退熱膏育露點。五蒸皆嗜欲勞傷水草葱炒熨。虛熱者退熱膏育露點。枯火炎從腎起故曰。

骨蒸八月一日收取百草頭上露水點膏盲穴名天灸
以愈爲度膏藥亦可貼○婦人骨蒸勞用黨參生地熟
地二兩酒芍柴胡炒防風秦艽赤苓地骨皮丹皮麥冬
當歸貝母知母胡黃連一兩薄荷甘草五錢加鹽肉四
兩猪胆一個猪脊筋一大條麻油熬黃丹收貼前後心
或加烏梅三個○治骨蒸雄黃一兩入童便一碗研汁
用炭火燒過方圓一尺黃理石一塊將汁淋上墊薄毡
片病人脫衣圍被坐勿洩氣此類方雖古傳有效却
不如膏藥爲便然因是而知外治之并清其心熱出於
法焉則亦變化之所由生也故存之
熱只在清心用燈草麥冬煎湯入蜜調黃連末敷胸
口若心火亢極宜敷硝黃折之相火熾甚則用歸地實
熱者瀉熱取犀羚犀角屑羚羊角屑黃芩蒲黃牛黃雄黃
硃砂水麝爲丸金箔衣臨用慘膏貼或以一丸維四時
研雞子清和密調塗心口亦治諸外症熱毒佳
有感而六淫以名六淫謂風寒暑濕燥火也自前風首
人身也本寶鑑內景外形雜症而小變之○五行之氣
合於四時若有淫迫能爲臟腑之病淫有餘也迫不足

也又運氣司天在泉六淫夫人身一小天地人身之氣通於天地

為病均詳內經茲不備載如經言天氣通肺地氣通噎風氣通肝雷氣通心谷氣

通脾兩氣通腎六經為川腸胃為海九竅為水注之氣

皆是○又人之呼吸即天地闔闢之機也故曰小天地

○脩養家有小周天法閉目靜坐鼻吸清氣降至丹田轉過尾間隨即提起如忍大便狀自夾脊雙關透上

直至泥丸轉下鵲橋汨然嚥下仍歸丹田患在何處收

氣即存想其處放氣則歸於丹田患在偏身當分經絡

屬上屬下運法亦如之可以却百病按此可與下接

導引法合用吾心乃大君主心者君主之官神明出胞絡代

行其事 膻中特重其官心君無為胞絡代行其事

膻中即心胞絡臣使對君主言又胞絡者命門之系經

云七節之旁中有小心代心行事故曰小心吾人一日

動作云為皆此命門之相火也心堅不受邪凡心病皆

胞絡病若邪中於心立死○少陰經神門穴在掌後銳

骨端又治手少陰者即治心胞絡經大陵 嚥 清淨

係心胞經穴在掌後兩筋間橫紋陷中

之理

此以道治心為治病第一義。仙經云病人能放

恬澹虛無真氣從之精神內守病安從來定觀經云無

所至凝迴脫塵病訓俗篇云病人但寫一死字着心頭

即易愈皆是清淨之理。按人在病中百念灰冷雖有

富貴欲享不能反美貧賤而健者此即悟境也及病小

愈旋復忘之此所岐伯傳摩浴之文即按摩浴即蒸浴

以終無清淨時也。經又曰上取下取內取外取以球其過能勝毒

者厚藥不能勝毒者薄藥上取頭面胸喉也下取少腹

脛足也內取切脉虛實也外取形色也一日按摩針灸

也一日漬形為汗也又病上取下通也病下取上升

也病中傍取謂病在中而經絡行於左右針灸熨藥旁

取之如病腰取膕也。經又云風寒客於人毫毛畢直

皮膚閉而為熱當是時可汗而發也或痺不仁腫痛當

是時可湯熨及火灸刺而去之弗治病入舍於肺名曰

肺痺發欬上氣弗治肺傳之肝名曰肝痺一日厥脇痛

出食可按若刺耳弗治肝傳之脾名曰脾風發瘕腹中

熱煩心出黃可按可藥可浴弗治脾傳之腎名曰疝瘕

少腹冤熱而痛出白一日蠱可按可藥弗治腎傳之心

病筋脉相引而急名曰瘈可灸可藥弗治滿十日決當
死腎因傳之心心卽復反傳而行之肺發寒熱法當三
歲死其卒發者不必治於傳或其傳化有不以次者
憂恐悲喜怒令不得以其次故有大病因而喜大虛則
腎氣乘矣怒則肝氣乘悲則肺氣乘恐則脾氣乘憂則
心氣乘矣按風寒爲外感故傳之緩曰三歲者亦大
略言之也憂恐悲喜怒爲內傷此五志之火觸發無常
故病加重喜爲心志腎氣乘虛克之水克火也餘倣此
又急傳者是大氣入臟如心病先心痛傳肺咳傳肝
脇肢滿傳脾閉塞不通身痛體重傳不已不滿十日死
肺病先咳肝病先脇滿脾病先閉塞皆倣此推。經又
云病始可刺其盛可待衰而已其有邪者漬形以爲汗
其在皮者汗而發之其慄悍者按而收之其實者散而
瀉之血實宜決之氣虛宜掣引之漬形如布桃枝煎
湯液以蒸浴也按收按摩收引也決當是決刺掣引疑
亦卽導引之謂。此經言外治也曰上取下取內取外
取曰按摩曰蒸浴曰湯熨曰火灸曰針刺統外感內傷
之症汗下補瀉先後緩急虛實寒熱之治無不畢備其
中是誠萬古不易之常道與湯藥相輔而行者也引而
伸之足盡醫學之變今人專主湯藥實爲闕典茲特詳

錄經文於註內以俟後之能闡發者。又按史記扁鵲對桓侯問云疾居腠理湯熨之所及也在血脉鍼石之所及也其治號太子死令弟子子陽厲鍼砭石以取外三陽五會有間太子蘇乃使子豹爲五分之熨以入滅之劑和煮之以更熨兩脇下太子起坐是熨法不獨治腠理也扁鵲非虛試史公非妄載也今人用鍼而不用熨何也至太子起坐後更適陰陽服湯二旬而如故則病後調攝之法也外治之足以起病亦明矣至云越人非能生死人當生者能使之起耳此直扶醫之真諦見醫無可矜之功卽諺藥醫不死病之說也然則人果當生外治亦能取效人不當生雖日服藥何濟乎毋自我而死可矣。按摩補五臟法熱摩手心熨兩眼每二七徧使人眼目自然無障翳明目去風頻拭額上謂之脩天庭連髮際二七徧面上自然光澤又以中指於鼻樑兩邊指二三十徧令表裏俱熱所謂灌溉中州以潤於肺以手摩耳輪不拘徧數所謂脩其城郭以補腎氣以防聾聵亦治不睡。按氣血流通卽是補非必以參苓爲補也。導引去五臟風邪積聚法。肺臟正坐兩手據地縮身曲脊向上五舉亦去心肝邪或反拳挺脊伸肺部也。心臟正坐握拳用力左右互相等或一手

脾臟大坐伸一脚屈一脚以兩手放後反掣或跪坐兩
手拒地回顧用力虎視。肝藏兩手抱項左右宛轉或
兩手相重按左膝左振身按右膝右振身又膽腑平坐
合兩脚掌以兩手挽脚腕起搖動爲之。腎藏握拳挂
兩肋擺撼兩肩或以足前後踰。又導引諸法一以
兩手掩耳將第二指壓中指彈腦後骨去頭腦疾一
兩手握拳以鼻收氣運至泥丸卽向天託起隨按頂上
或左右膝上一閉一口氣將左手伸直右手作攀弓
式以兩眼看右手左右各三次去臂腋疾并瀉三焦火
一平坐伸足以兩手低頭攀足却鉤所伸足屈在膝
上按摩之一以一手託腎囊一手摩臍下煖腎固精
并擦背後腎堂及命門穴一摩來脊穴此穴在背脊
下大便之下統會一身氣血并療痔一兩肩扭轉運
動膏肓穴除一身疾一合掌並兩足蹲身虛坐起三
躍。凡肩臂病兩手交撻或左足前踏左手擺向前右
手擺向後右亦如之。凡腿膝疾一足立定一足灑之
或兩足相紐而行前進後退各十數步或高坐伸足兩
足紐向內復紐向外。又方如風寒發汗盤脚而坐又
手攀腦後風門向前叩首幾至於地或縛軟竹片爲弓

平身正立作開弓式口中徐徐念一二三四五至汗出止。氣逆呃忒兩手據地伸頸張口作虎形卽止或據案亦可驗過。吞酸於肝經肺經二穴掐之九九擦亦九凡病皆可擦。痞塊左手向前上伸右手向後下伸閉氣一口扭身轉項各十七回俟後內微覺响聲身熱乃止。霍亂轉筋用腳踏實地或男挽其陰女牽其乳近兩旁。腰痛曲腰合掌左右搖擺或起立據床拔身左右視背或病人正東坐收手抱心一人於前據躡其膝一人後捧其頭牽令偃卧到地三起三卧愈。轉肘蒲黃一斤縛腰間以頭數向地取通數方皆是導引之法可參。按莊子呼吸吐納熊經鳥伸八字卽導法也此外有老子四十二勢婆羅門十二勢赤松子十入勢鍾離八勢胡見素五藏十二勢大概不出前諸法中又唐六典有按摩生以消息導引除人入病曰風寒暑濕飢飽勞逸凡支節藏府積而疾生導而宣之使內疾不留外邪不入是導引按摩實爲醫之一科古方中如發汗呃逆痞塊轉筋等法皆從此出用之實能有效倘識其臟腑部位補瀉之用隨處皆有神解今人不講摩浴故不知耳。易筋經有舉何知內景內景經實鑑提推拉按抱抓墜八法亦可參

借言在握靈樞即靈樞經樞在必明陰陽內經陰陽者天地之

道也治病必求其本註云必先明於陰陽凡人之臟腑

氣血氣之風寒暑濕病之表裏上下脉之遲數浮沈藥

之温平寒熱皆不外陰陽二義汪云醫理以陰陽為雲

為本全經皆闡陰陽之奧外治亦當先明陰陽為雨

為雨經云清陽為天濁陰為地天氣註云天地相交雲行雨施

而後能化生萬物人當識臟腑句本有父有母經曰鬲

之上下相輪應亦然寶鑑有父有母育之上

中有父母又云三陽為父三陰為母按醫當識五臟

六腑外治不由臟腑却直達臟腑尤貴能識臟腑茲於

醫書中摘其要者以便初學觀覽如入學者先認字出

門者先問路耳至於自得之後則此固所棄也五臟

肝心脾肺腎皆屬陰六腑膽胃大腸小腸膀胱三焦皆

屬陽五臟藏精神氣血魂魄六腑化水穀而行津液

。形臟四者頭角耳目口齒胸中也奇恒之腑六者腦

髓骨脉膽女子胞也肺氣通鼻肺和則鼻能知香臭

心氣通舌心和則舌能知五味肝氣通目肝和則目能

辨五色脾氣通口脾和則口能知五穀腎氣通耳腎和

則耳能聞五音五臟不和則九竅不通六腑不和則留
結爲癰。五臟不平六腑閉塞之所生也。頭痛耳鳴九
竅不利腸胃之所生也。肺合大腸心合小腸肝合膽
脾合胃腎合膀胱少陰屬腎腎上連肺故將兩臟三焦
者屬膀胱是孤之腑也是六腑之所與合者也。心與
膽通肝與大腸通脾與小腸通肺與膀胱通腎與三焦
通如心病怔忡宜溫膽膽病戰慄癲狂宜補心肝病宜
疎通大腸大腸病宜平肝脾病宜瀉小腸火小腸病宜
潤脾肺病宜清利膀胱水膀胱病宜清肺腎病宜調和
三焦三焦病宜補腎。百病之始生也必先於皮毛邪
中之則腠理開開則入客於絡脉絡脉滿則注於經脉
經脉滿則入舍於臟腑也。善治者治皮毛次肌膚次
筋脉次六腑次五臟治五臟者半死半生也。臟病者
止而不移其病不離其處腑病者彷彿賁響上下行流
居處無常。欲得寒而欲得見人者腑病欲得溫而不
欲得見人者臟病。臟病難治逆傳其所勝也如肺傳
肝肝傳脾脾傳腎腎傳心一臟不再傳故言次傳者死
腑病易治順傳其所生也如心傳脾脾傳肺肺傳腎腎
傳肝肝傳心子母相傳周而復始故言生也。問臟者
如肝病取土當傳脾乃不傳脾而傳心則問其所勝之
里禽辨文

臟而傳於所生之臟矣。反四時及不間臟者，難已間。
臟者，生緩傳急傳見前。勞症男自腎傳心，而肺而
肝而脾，女自心傳肺，而肝而脾，而腎傳盡則死。凡病男
自下而上，女自上而下，皆逆反，是可治。病有相移者，
如肝移邪於肺，則右脇痛，肺位在右也。病有五臟相
移者，腎移寒於脾，脾移寒於肺，乘其所勝也。肺移寒於腎，
心傳於所生也。心移寒於肺，乘其所勝也。肺移熱於腎，
亦傳於所生也。脾移熱於肝，肝移熱於心，心移熱於脾，
肺移熱於腎，腎移熱於脾，脾移熱於肝，肝移熱於心，心移
熱於肺，肺移熱於腎，腎移熱於脾，脾移熱於肝，肝移熱於
熱於胃，胃移熱於膽，膽移熱於小腸，小腸移熱於大腸，大
熱於胃，胃移熱於膽，膽移熱於小腸，小腸移熱於大腸，大
凡人之病，真臟不病，則五行相生相制，以適於平，雖不
服藥，亦愈。如火極傷金，則五行相生相制，以適於平，雖不
也。臟病分虛邪實邪。賊邪微邪正邪，飲食勞倦得之，為實邪，傷
之為虛邪，傷暑得之，為正邪，飲食勞倦得之，為實邪，傷
寒得之，為微邪，中濕得之，為正邪，飲食勞倦得之，為實邪，傷
○犯賊風虛邪者，陽受之，食飲不節，起居不時者，陰受
之。陽受之則入六腑，陰受之則入五臟。入六腑則身熱，
不時臥上為喘呼，入五臟則腹滿閉塞下為飧泄，久為
腸澼。陽外感陰內傷。五藏正經自病，憂愁思慮則

傷心形寒飲冷則傷肺悲怒氣逆上而不下則傷肝飲食勞倦則傷脾久坐濕地強力入房則傷腎。水火分治。歌肝膽由來從火治。三焦胞絡都無異。脾胃相將濕處求。肺與大腸同濕類。腎與膀胱心小腸。寒熱臨時旋商議。詳張子和書。損其肺者益其氣。損其心者調其榮。損其脾者調其飲食。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。五臟有陰陽之性。可因其類而取之。如心實生熱者當益其腎。腎水滋則熱將自除矣。腎虛生寒者當補其心。心火降則寒將自除矣。又如肺實而瀉腎實則瀉子也。肺虛而補脾虛則補母也。又母病必及其子也。又子虛必盜母氣也。又如肝實而肺虛者瀉其火并補其水。令火勢衰微。金得不平其木也。又如見肝之病將傳於脾者。當先實其脾。補肝用酸。助心用焦。苦益脾以甘。俾土旺則水弱。水弱則火盛。火盛則金不行。肝木自愈。此治肝補脾之要妙也。又如膀胱病而治肺是隔二胱是正治也。因金不能生水而膀胱病而治肺是隔二也。更因土不能生金而肺病而膀胱病而治脾是隔三也。又入虛候五藏者。肺心有邪其氣留於兩肘。肝有邪其氣流於兩脇。脾留於兩髀。股腎留於兩腠。又五藏各有合病。久而不已則內舍於其合。如肝合筋筋。

痺不已內舍於肝也餘臟倣此。頭病取足陽病取陰也足病取上陰病取陽也中病旁取中者脾胃旁者甲膽如胃中濕勝而成泄瀉宜助甲膽風勝以克之也。凡五臟皆類推。夫胸腹者臟腑之郭也膻中者心主之宮城也胃者太倉也腎者胃之關也脾為胃行其津液於四肢者也腰脊者身之大關節也。肝惡風心惡熱肺惡寒脾惡濕腎惡燥。肝欲散心欲熅脾欲緩肺欲收腎欲堅。五臟要穴肺太淵心太陵肝太衝脾太白腎太谿六腑要穴胃三里大腸巨虛上廉小腸巨虛下廉膀胱委中三焦委陽膽陽陵泉詳寶鑑針灸門。右臟腑之要也用膏藥者先識其何臟何腑或通或合或傳或移孰為分治先治隔治孰為上治下治旁治胸腹脇腋腰脊髀股四肢兩脇各有界畔而貼法始當其位矣至於所惡所欲乃臟腑天地萬物之所以屬。以下四句申性情膏中加藥本此。天地萬物之所以屬。言臟腑即為外治醫說之總義須合四句看。肝心脾肺腎在天為風熱燥濕寒在地為木火土金水在體為筋脉肉皮毛骨在色為蒼赤黃白黑在音為角徵宮商羽在聲為呼笑歌哭呻在變動為握憂噉咳慄在竅為目舌口鼻耳

在味爲酸苦甘辛鹹在志爲怒喜思憂恐在液爲淚汗
涎涕唾在榮爲爪面唇毛髮在臭爲臊焦香腥腐在卦
爲震離坤兌坎在脉肝爲足厥陰心爲手少陰脾爲足
太陰肺爲手太陰腎爲足少陰。諸風掉眩皆屬肝木
諸痛痒瘡瘍皆屬心火諸濕腫滿皆屬脾土諸氣臍變
病痿皆屬肺金諸寒收引皆屬腎水。諸暴強直支痛
綆戾裏急筋縮皆屬於風厥陰風木乃肝膽之氣也
綆縮也戾乖戾也謂筋縮裏急乖戾失常而病也。諸
病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之如
鼓癰疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂脅鬱腫脹鼻塞欬衄
血溢血淋洩閉身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄衄鱗血
汗皆屬於熱少陰君火乃真心小腸之氣也 暴注率
暴注洩也脅昏也鬱拂鬱也欬鼻出清涕也衄鼻血也
血溢血上出也洩大小便血也閉大便澀滯也衄鱗血
汗血出也汗者濁也。諸瘕強直積飲痞隔中滿霍亂
吐下體重胛腫肉如泥按之不起皆屬於濕太陽濕土
乃脾胃之氣也 諸瘕強直者濕過極則反兼風化制
之然兼化者虛象而實非風也。諸熱脅瘕暴瘖冒昧
躁擾狂越罵詈驚駭胛腫疼酸氣逆衝上禁慄如喪神
守噎嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明

畢注。睛。癰。暴。病。暴。死。皆。屬。於。火。少。陽。相。火。之。熱。乃。心。包。絡。三。焦。之。氣。也。癰。動。也。惕。跳。動。也。火。之。體。也。噫。與。噦。同。○。諸。澀。枯。涸。乾。勁。斂。揭。皆。屬。於。燥。陽。明。燥。金。乃。肺。與。大。腸。之。氣。也。○。諸。病。上。下。所。出。水。液。澄。澈。清。冷。癰。瘕。癰。疔。堅。痞。腹。痛。急。痛。下。利。清。白。食。已。不。饑。吐。利。腥。穢。屈。伸。不。便。厥。逆。禁。固。皆。屬。於。寒。足。太。陽。寒。水。乃。腎。與。膀。胱。之。氣。也。按。經。文。病。機。十。九。條。河。間。本。之。著。爲。原。病。式。分。五。運。六。氣。剖。析。精。微。宜。研。究。之。○。五。志。所。傷。喜。傷。心。者。不。可。疾。行。不。可。久。立。怒。傷。肝。者。上。氣。不。可。忍。熱。氣。蕩。胸。短。氣。欲。絕。不。可。息。憂。傷。肺。者。心。系。急。上。焦。閉。榮。衛。不。通。夜。臥。不。安。思。傷。脾。者。氣。留。不。行。精。聚。中。脘。不。得。飲。食。腹。脹。滿。四。肢。怠。惰。恐。傷。腎。者。上。焦。氣。閉。不。行。下。焦。回。還。不。散。猶。豫。不。決。嘔。逆。惡。心。也。○。又。心。爲。喜。喜。發。於。心。而。成。於。肺。脾。爲。思。思。發。於。脾。而。成。於。心。過。節。則。兩。臟。俱。傷。肺。爲。憂。又。爲。悲。又。心。虛。則。悲。又。肝。虛。而。肺。氣。併。之。則。悲。腎。爲。恐。又。肝。虛。則。恐。又。心。虛。而。腎。氣。併。之。則。恐。又。胃。熱。則。腎。氣。微。弱。故。恐。肝。爲。怒。怒。則。肝。木。克。脾。脾。傷。而。四。臟。俱。傷。矣。○。又。悲。傷。心。胞。者。喜。忘。不。識。人。置。物。在。處。還。取。不。得。筋。變。四。肢。浮。腫。驚。傷。膽。者。神。無。所。歸。慮。無。所。定。說。物。不。意。而。迫。○。按。五。臟。不。可。見。然。有。諸。內。者。皆。五。諸。外。

不獨筋肉皮骨也凡色聲味脉之類實望聞問切之原也至於風熱燥濕寒爲外感喜怒憂思恐爲內傷莫不各有所形之症症既見於外矣又奚不可由外治者但病情萬變而不知其要流散無窮經文總論乃握要之法膏藥通治之四時月日之所以主如肝主春足厥陰所本故詳載之

乙心主夏手少陰太陽主治其日丙丁足厥陰少陽肝膽也手少陰太陽心小腸也餘倣此推脾主長夏四季長夏六月也四季中土各旺十八日。足太陽少陽陽明應正月九月五月足太陰少陰厥陰應十一月十月三月也。五藏積各以月日得者如肺病傳肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受則留結爲積故肝積得以季夏。癰作於午未申月。邪之客身以勝相加至其所生而愈至其所不勝而甚至其所生而持白得其位而起如肝病愈於夏甚於秋持於冬起於春餘倣此。人一日分爲四時朝爲春日中爲夏日入爲秋夜半爲冬朝則人氣生病氣衰故旦慧日中人氣長則勝邪故安夕則人氣始衰邪氣始生故加夜半人氣入臟邪氣獨居於身故甚有相反者一臟獨主其病必以臟氣所不勝時甚如脾病不能

能勝旦之木肺病不能勝晝之火也以所勝時起如肺氣
時之氣者也。肝病平朝慧下晡甚夜半靜心病日中
晡慧日中甚夜半靜腎病夜半慧四季甚下晡靜按日
晡慧日中甚夜半靜腎病夜半慧四季甚下晡靜按日
可辨症。五臟受氣於其所生傳之於其所勝氣舍於
其所生死於其所不勝如肝受病氣於心傳於脾舍於
腎至肺而死此言氣之逆行也一日一夜五分之所以
占死生之早暮也五分謂朝甲乙寅卯晝丙丁巳午
晡庚辛申酉夜壬癸亥子四季戊己壬戌丑未。凡人
身之氣流行每子時自左腳心湧泉穴起陽循左足腹
脇手而上至頭頂顙門而止午時自頂門循右手腹脇
足而下至右腳心而止是坎離為陰陽消息也。又腎
至靜惟子時濁氣一動而已。按治遺精者多在子時
及五更腎氣開時可推。手太陰肺本藏經絡每朝寅
時從華蓋旁胸乳上中府穴起循臂下行至手大指外
側少商穴止傳手陽明大腸手陽明大腸卯時自少
商穴起循臂上行至鼻孔旁迎香穴止。足陽明胃辰
時自迎香穴交與眼下承泣穴上行至額角頭維穴對

人迎循胸腹下至足大次指厲兌穴止足太陰脾已
時在足附上衝陽過交與足大指隱白穴循腿腹上行
至腋下一大包穴止手少陰心午時大包交與腋下行
泉穴循臂下行至手小指內側少衝穴止手太陽小
腸未時自少衝交與手小指外側少澤穴循肘上行至
耳前聽宮穴止足太陽膀胱經申時自聽宮交與目
內眥外一分睛明穴循頭頸下背腰臀腿至足小指至
陰穴止足少陰腎酉時自至陰與足心湧泉穴循膝
上行至胸膺府穴止手厥陰心包戌時自膺府交與
腋下乳後一寸天池穴循臂下行至手中指端中衝穴
止手少陽三焦經亥時自中衝交與小次指外側關
衝穴循臂上行至耳門穴止足少陽膽子時自耳門
交與目銳眥瞳子髎循頭耳側脇下行至足少指次指
端外側竅陰穴止足厥陰肝丑時自竅陰交與足大
指外側大敦穴循膝股上行至乳旁一寸半直下一寸
半期門穴止此每日氣血所注詳靈樞經。傷寒胃
熱潮熱多在日晡陽明旺於未也若寅卯時者少陽已
午時者太陽。陰虛元氣不足春夏劇秋冬瘥又陰虛
火動多在午後交陰分起至夜半而止肺熱日西甚脾
熱夜間甚腎熱亥子時甚。瘧分三陽三陰又子至巳

爲陽午至亥爲陰亂者爲陰陽不分又卯至午爲邪在
外午至酉爲邪在內酉至子爲邪在血分。脇痛在午
後發者知其爲肝家瘀血也。黃家日晡當發熱反惡
寒知其爲陰黃女勞也。木生於亥旺於卯絕於申至
酉戌衰甚及寅卯乃復旺故患肝疳雀目者暮暗而曉
復明也。又木絕在申水土卽長生於申故雀目多變黃
脹也。五藏類推。肺病早問咯血者寅卯爲木旺生
火時也。又內經有四氣調神法又鍼灸合藥須檢時
日又殺肺蟲者須在初四初五蟲頭向上日。按傷寒
有六經欲解時。又按史記日者傳孝武帝時聚諸家
占娶婦日五行家曰可堪輿家曰不可建除家曰不吉
叢辰家曰大凶天人家曰小吉太一家曰大吉辨訟不
決今之醫家亦然又按王充論衡云沐書謂子日沐令
人愛使醜如娼母能得愛乎卯日沐令人白頭若十五
女子能白髮乎今之醫家不信時日亦然然四時晝夜
之道病人實潛與爲感通綱目云凡病以五臟時日占
病愈甚極準錢仲陽深得其理學者宜究心焉是時日
固有不可不講者愚謂外治者尤必於氣血所注及諸
病所加甚之候深加詳審則先時而制易於取效不獨
貼截瘡膏者須定陰陽且要瘡未發時也此臟腑四時

晝夜之說亦外上下左右前後之各其位五藏皆通於心而心亦通

治者之一要也

五藏心系上系於肺其別者自肺葉中曲折向後貫脊

髓通於腎與膀胱並行而之洩尿處乃下極部分也

肺有二系一系上通喉嚨一系曲折向後脾為中州

上心下腎脾與胃以膜相連肝之系者自膈下着左

脇肋上貫膈入肺中與膈膜相連也兩腎二系相通

下行其上則與心相通而為一所謂坎北離南水火相

感者也命門之系即心胞絡見前按腎應兩腰介

其間者命門與膀胱相對象坎中一畫所謂水中之火也

胃中蒸化穀食全賴此火火衰則胃氣衰膽主兩

腋缺盆皆膽之絡胃號太倉咽門至胃長一尺六寸

胃居心蔽骨與膀胱之中小腸當膀胱右大腸當膀胱左

膀胱在小腹之內按心肺居胸背故心熱則胸熱

肺熱則背熱肝膽居脇膽附於肝腎居腰胃居臍上腸

居臍下其熱亦然他症即此可推凡膏藥均分此上中

下貼心在肺下肝上巨闕心募也又期門肝穴在兩

乳旁各開一寸半直下一寸半期門下五分即臍穴中

府肺穴也在乳直上三肋間脾居中脘中脘一穴胃募

也季脇章門脾募也在臍上二寸旁各六寸帶脉所定

也命門即腎穴也關元小腸穴在臍下三寸天樞大腸
二穴在臍旁各開三寸中極膀胱穴在臍下四寸。臍
中為上焦中脘為中焦臍下一寸陰交穴為下焦。背
後自大椎起至尾骶骨止共二十一節平肩為大椎即
百勞穴也二風門三椎肺俞四即膏肓也五心俞九肝
俞十胆俞十一脾俞十二胃俞十三三焦俞十四腎俞
十六大腸俞十八小腸俞十九膀胱俞皆在椎下兩旁
各開一寸五分 腹陰背陽募在陰俞在陽陰病行陽
治俞陽病行陰 內外虛實生絕之殊其證 肝病難經曰外證
行陰治募 善潔面青善怒內
證臍左有動氣按之牢若痛其病胸脇滿悶淋漓便難
轉筋有是者肝也無是者非也素問兩脇下痛引小腹
令人善怒虛則目瞋瞋無所見耳無所聞善恐如人將
捕之氣逆則頭痛耳聾不聰煩腫又肝病皆青肝熱者
色蒼而爪枯靈樞足厥陰肝絕則筋急筋者聚陰器而
絡舌本筋急則引舌與咽故唇青舌捲卵縮庚日薦辛
日死。按面青者肝色臍左者肝位巔頂耳目煩舌胸
脇小腹陰器均肝胆脈所至筋爪肝所主恐與怒肝之
志也此不特可以辨症而一切敷貼之法皆具於中亦
外治者之一要也下微此推心病外證面赤口乾善

笑內證臍下有動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中
熱而腕又胸中痛脇肢滿脇下痛膺背肩甲間痛兩臂
內痛虛則悲胸腹大脇下腰背相引而痛又心病舌捲
短額赤心熱者色赤而脉絡溢又手少陰心絕則脉不
通血不流色不澤仲景形體如烟煤直視搖頭者為心
絕。脾病外證面黃善噫善思善味內證當臍有動氣按
之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠惰嗜卧四
肢不收又身重肌肉痿足不收行善憊脚下痛溼洩不
利虛則腹滿腸鳴飧泄又脾病唇黃脾熱者色黃而肉
蠕動又足太陰脾絕則肌肉軟舌痿人中滿脉經口冷
足腫腹熱臙脹泄利不覺出時無度。肺病外證面白
善噫悲愁不樂欲哭內證臍右有動氣按之牢若痛其
病咳喘洒淅寒熱又喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝
髀臑臑足皆痛虛則少氣不能報息耳聾聾乾又肺病
鼻張肺熱者色白而毛敗又手太陰肺絕則皮毛焦爪
枯毛折又汗出髮潤喘不休。按肺主皮毛氣逆於上
則痛連肩背而汗出肺為腎母母病則子亦受邪氣逆
於下故下部皆痛肺絡會耳中腎脉入肺中循喉嚨虛
則腎氣不能上潤故耳聾聾乾喘音啞足肚也見註。

腎病外證面黑善恐數欠內證臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣小腹急痛泄如下重足脛寒而逆又腹大脛腫喘咳身重寢汗出憎風虛則胸中痛大腹小腹痛清厥意不樂又腎病顙與頰黑耳焦枯腎熱者色黑而齒枯又足少陰腎絕則骨枯齒長而垢髮無澤仲景洩便遺失狂言曰反直視者腎絕脉浮而洪身汗如油喘不休水漿不下形體不仁乍靜乍亂者命門絕也。膽病者善太息口苦嘔有苦沫心中澹澹恐如人將捕之噓中吟吟然善唾又膽虛不勇敢亦不睡實則勇敢而多睡。胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩脇脇噎不通飲食不下又胃實則能食不傷過時不飢或脹虛則泄。小腸病者小腹疼痛腰脊控舉而痛當耳前熱若寒若獨肩熱。大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬月重感於寒則泄當臍而痛不能久立。膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小便而不得肩背熱若脉陷及足小指外廉脛腓後皆熱又熱結下焦小腹苦滿胞轉小便不利令人發狂冷則濕痰上溢而為多唾小便淋瀝或遺尿。三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留為脹又上焦不利則腫滿。按臟腑各有井榮留飲久為中滿下焦不利則腫滿。按臟腑各有井榮

肺經合主病井水主心下滿榮火主身熱肺土主體重
節痛經金主喘咳寒熱合水主逆氣而泄其穴與治法
詳見難經。病證各有本門茲但錄其臟腑之總綱亦
外治提要法也。青藥多治外症鮮治內症此篇之治
內症亦憑臆造耳然亦實有下手之處

素問九篇

腑奚為而言器

六腑者倉廩之本營之居也
名曰器能化糟粕轉味而入

出者

象則可觀器則可量

不假漢筴

王莽令太醫與
巧屠剗剗罪人

以竹筴導其脉云可治病而其時醫
無傳書者亦以此非仁者之所為也

自懸秦鏡

能見
臟腑即

如觀水影之浮沉而知肺肝之吐分於其部也

吐血者
吐於水

中看浮者肺沈者肝半沈半
浮者心此以部位推測法

察鹽色之紫黑而知氣血

之鼓徵於其化也

鼓脹者炒鹽布包放臍上水鼓鹽化
水食鼓鹽紅色血鼓鹽紫色氣鼓鹽

黑色氣虛中滿
鹽本色不變

一火二火而判內癰肖形也

肺腸癰皆
吐臭痰棉

花捲竹葉燈上薰油燒之令病人看兩個火頭者左肩
肺癰一個火頭者腸癰以肺有兩葉腸只一條也左肩
右顧而別胎孕就勢也遺孕婦南行急呼之左顧男右
顧女蓋男左女右勢有偏重迴
顧時就其所偏重也此法試過頗驗又摸腹如覆盆
者男如肘頸參差者女又左乳有核男右乳有核女○
以上數法皆是測內景者不由診脈而得乃外治以物
之內取法也如能推廣可不必憂脈理之幽渺矣以物
熨之寒熱以辨喜涼者熱喜溫者寒諸症皆以此辨○
按古有大暑時以石熨腹以瓜鎮心者
又齊書載一僧父冷病積年重茵累褥牀下設爐火猶
不差徐嗣於盛冬月令其裸身坐石上以百瓶水從頭
自灌須臾體出氣如雲蒸嗣曰此以手按之虛實以明
乃大熱病也此事參觀並識真假
喜按者虛拒按者實○內經言風雨之傷人也實實者
外堅充滿不可按按之則痛寒濕之中人也虛虛則氣
不足按之則氣足以溫之故快然誰其窺臟卽此見癥
而不痛此是測法亦卽是治法
古云窺見五臟未必真有是事
也能測內景卽可洞見癥結
復參東醫之鑒
卽東醫寶鑑

更采西醫之略

西國有西醫論略等書其腦氣筋之說甚新余所論醫理亦與中國有異

見本書

觀其大同著其行得

謂相師而不相襲也

心藏神

藏者藏也經曰血

氣精神奉生而周性命是四者人之本臟腑之主也痰者氣之所結汗者血之所變也經所謂津液與精氣血脈並行者也凡百病皆不外此六者而膏藥通治百病須要扼此六者寶鑑精氣神乃道家言非醫理也。心藏神統攝七情酬酢萬變又五臟藏七神心藏神肺藏魄魄者肺之神也肝藏魂脾藏意腎藏志又脾藏意與智腎藏精與志是為七神又神者精氣之化成也。心有所憶謂之意意之所存謂之志因慮而處物謂之智也。心怵惕思慮則傷神恐懼自失又恐懼流淫而不止。脾憂愁不解則傷意恍惚四肢不舉又氣閉塞而不行。肝悲哀動中則傷魂狂忘不精不精則不。正當人陰縮而筋攣兩脇骨不舉又竭絕而失生。肺喜樂無極則傷魄傷魄則狂狂者意不存人又神蕩散而不藏。腎盛怒而不止則傷志喜忘其前言腰脊不可俛仰屈伸又迷惑而不治恐懼而不解則傷精骨痠痿厥精時自下又神蕩散而不收。驚悸大概屬血虛

與痰有 心跳亦是血虛時作時止者痰 火動蓋心

胆經病 忡者心中躁動惕惕如人將捕一日悸即怔

忡心虛而停水則胸中滲漉虛氣動流水既上升心火

惡之故不安也怔忡久則健忘由心脾血少亦有痰者

○癰癰屬痰火驚丹溪曰五志之火鬱而成痰為癰狂

癰屬陰狂屬陽一日癰宜吐狂宜下癰則宜乎養血安

神兼降痰火。先貴後賤曰脫營先富後貧曰失精雖

不中邪病從內生血為憂煎氣隨悲滅令人飲食不

神倦肌瘦。按神病最難治古云惟賢者能之神兼七

情病亦匪一如挽亂四肢不舉氣閉塞不行及筋攣骨

痠等症往往與雜病相類苟不求其致此之故 百藥

不效拙者或誤下藥遂致危殆姑存此膏以待賢者之

正◎養神膏牛心原個麻油先熬去渣入黨參熟地茯

苓黃耆白朮當歸遠志棗仁柏子仁益智仁麥冬木鼈

仁半夏各一兩酒芍五味子陳皮甘草各五錢黃連四

錢肉桂二錢陳胆星八錢麻油熬黃丹收硃砂七錢生

龍齒鬱金菖蒲各五錢攪此方治一切神病古云七情

總隸於一心七氣統歸於一氣故可以一膏治之如老

人心虛不眠者用之甚妙無牛心用龜板石蓮肉龍眼

肉三味代之。又方心虛而有痰火者用參朮苓甘地

芍歸芎加黃連爪萸牛夏沈香硃砂梔子油丹熬。按
寶鑑治脫營失精症內用香附茯神甘草外用香附川
椒故紙各二錢華發一錢研末入炒鹽二錢擦牙此方
補火可以進食雖未悟其何以外治之故然卽此見七
情亦有外治之肺藏氣者精神之根蒂也元氣與血循
法當推而廣之肺藏氣者精神之根蒂也元氣與血循
環按精神氣血四者之中又以氣爲貫通之主。天
地之道氣化則生變則易盛則旺弱則衰正則和亂卽
病絕則死也肺主氣又肺藏氣膻中爲氣海宗氣之
所積也膻中肺室也又腎生氣一曰腎納氣膻中下丹田
實爲生氣之原五臟六腑之本十二經脉之根呼吸之
門三焦之原謂腎間動氣也凡人病劇候臍下動氣未
絕者猶可生按治氣須肺與腎兼治貼膏在膻中臍
下二處。諸病諸痛皆因於氣。五氣風傷氣爲疼痛
寒傷氣爲戰慄暑傷氣爲熱悶濕傷氣爲腫滿燥傷氣
爲祕結。七氣喜怒憂思悲恐驚也喜恐驚屬心腎膽
過則耗散眞氣怔忡健忘失志不足之症作怒憂思屬
肝脾脾過則鬱遏邪氣顛狂膈噎腫脹疼痛有餘之症
作。又九氣者怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣
下寒則氣收笑則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結

○氣鬱者多因名利失志公私失情。○氣滯上焦心胸痛氣滯中焦腹脇刺痛氣滯下焦腰痛痼疾氣滯於外周身走痛。○上氣者肺有餘則喘欬上氣。○逆氣者氣自腹中時時上衝也病人自覺冷氣自下而上者非冷也上升之氣無寒乃火極似水也。○氣逆而亂者清氣在陰濁氣在陽榮氣順脉衛氣逆行清濁相干亂於胸中是為太惋故氣亂於心則煩心密默俛首靜伏亂於肺則俛仰喘喝按手以呼亂於腸胃則為霍亂亂於臂脛則為四厥亂於頭則為厥逆頭重眩仆。○少氣者氣不足則息微也又腎虛則少氣力言呼吸骨痠懈惰不能動。○短氣者氣急而短促也有結胸停水風濕氣虛之分大抵心腹脹滿者為實為邪在裏心腹濡滿者為虛為邪在表。○下氣者心脉不及下為氣泄也又腸胃鬱結穀氣內發而不能宣通於腸胃之外故善噫而或下氣也但傷食下氣臭穢清氣下陷不臭穢。○大凡邪之所在皆為不足上氣不足腦為之不滿耳為之鳴頭為之傾中氣不足洩便為之變腸鳴下氣不足痿厥心悶。○凡五虛之症在上則吐痰不止在下則泄瀉不止皆死以氣脫無所管攝也氣脫者目盲。○東垣云凡治雜病先調其氣若血受病亦先調氣 入門云散火

之法必先破氣氣降則火降矣 丹溪曰氣無補法世
俗之言也氣怯不補氣何由行 又曰肺受火邪氣得

炎上之化有升無降熏蒸清道則生諸疾若用辛香燥
烈是以火濟火也 直指曰氣結則生痰痰盛則氣愈

結故調氣必先豁痰 凡噎氣惡心等症皆胃病而總

由肝氣沖逆阻胃之降而然古人胃病治肝以此 六

字氣訣肝虛心呵脾呼肺咽腎吹三焦噎其法以口吐

鼻取能去疾延壽又肝若噎時目爭睛肺知咽氣手雙

擎心呵頂上能叉手腎吹抱取膝頭平脾病呼時須憬

口三焦客熱卧噎行 分四時行切忌出聲 治氣藥

虛宜四君實宜小烏沈火多合黃連解毒痰合二陳積

合平胃之類 又氣病用氣藥不效者宜故紙茴香乳

香納氣歸腎 餘不備錄 理氣膏通治氣鬱氣逆氣

脹氣痛等症黨參黃耆蒼朮白朮蓬朮香附柴胡青皮

陳皮枳實南星半夏厚樸檳榔山查草果羌活防風前

胡蘇子杏仁烏藥鬱金川芎當歸白芍黃芩黃連黃柏

梔子葶藶吉梗桑皮吳黃瓜蒌白芷麥芽木通澤瀉赤

苓延胡靈脂大黃黑丑官桂草烏紅花菖蒲皂角木鼈

仁僵蠶全蝎山甲白芥子蘿葡子川棟子川椒細辛木

香薷香荷香靈仙乳香沒藥巴仁甘草各一兩油熬丹

收牛膠二兩蘇合丸三錢攪另用薑葱菲蒜槐柳桃
桑枝各半斤鳳仙全株油丹熬薄荷油二錢和兩膏合
併攤貼。專益元氣膏牛肚一個麻油先熬去渣入黃
耆八兩黨參生白朮當歸各六兩熟地半夏香附麥冬
四兩茯苓五味白芍益智仁破故紙胡桃肉陳皮官桂
甘草各二兩砂仁廣木香各七錢乾薑五錢大棗十個
麻油熬丹收加黃柏知母及龜鹿膠各二兩神氣運於
尤妙。氣虛有痰滯者香砂六君熬膏貼無形也動也天之象也
無形也動也天之象也腎藏精精者身之本體者骨之
則神旺內則五藏敷榮外則肌膚潤澤容顏光悅耳目
精明若真精耗散疾病即生如肝精不足目眩無光腎
精不足腰痛脛痠是也精傷則陰虛精脫者耳聾
六極一曰精極五臟皆有精並無停泊於其所腎
主水受五臟六腑之精而藏之凡人未交感精涵於血
中慾火動甚而周身流行之血至命門變精以泄也宜
祕密。保精膏鼈甲一個先熬去渣入熟地八兩兔絲
子酒製肉苁蓉酒洗各四兩天冬麥冬生地山藥續斷
杜仲炒巴戟車子杞子黃肉茯苓五味子黨參栢子仁
各二兩黃連當歸白芍遠志棗仁覆盆子金櫻子地骨

皮益智仁茴香菖蒲川椒甘草澤瀉黃柏知母龍骨牡
蠣蝦骨碎補各一兩麻油熬成膏黃丹收加赤石脂四
兩攪勻貼如精寒及精如肝藏血凡入動則血運於
水者陽衰也糝附桂末貼肝藏血諸經靜則歸於肝
臟以肝爲血海主藏血故也。人身經絡氣响之而不
閉血濡之而不枯故得周流不息邪由外入先氣而後
血血隨氣爲升降氣病傳血血亦因之病焉。血生於
心統於脾藏於肝宣布於肺踈泄於腎灌漑於一身以
入於脉人非節欲以謹養之必至陽火盛熾眞陰內損
吐衄妄行於上便溺滲洩於下而百病生矣凡目能
視耳能聽掌能握足能步臟能液貯能傳皆賴於血血
盛則形盛血衰則形衰凡熱皆出於心熱甚則傷血
諸見血皆熱症又血見熱則行其色鮮見寒則凝其
色瘀凡口鼻出血皆係陽盛陰虛有升無降血隨氣
上法當補陰抑陽氣降則血歸於經也七情皆能動
血暴喜傷心不能生血暴怒傷肝不能藏血積憂傷肺
過思傷脾失志傷腎亦然內傷亦能失血卒然多飲
食則脹滿起居不節用力過度則陽絡受傷血外溢而
衄陰絡脉傷血內溢而下。衄血者火乘金位肺絡受傷
動氣歸於肺或陽明熱鬱咳血者火乘金位肺絡受傷

也先血後痰陰虛火動痰不下降宜滋陰降火先痰後
血是積痰生熱宜急降痰火痰涎帶血者是脾家蓄熱
有紅點尤甚唾血者鮮血隨唾而出屬腎有帶紅絲者
是肺痿不嗽而咯血者出於心或血疔瘡或咯不出
或帶紅絲此精血枯竭。嘔血出肝大怒及傷力為多
重者從夾脊而下如潮之湧此皆瘀血雖止之亦不歸
經須聽其出。吐血分三因風寒暑濕燥火外因也過食生
冷好啖炙燂醉飽無度外之內也喜怒憂思悲恐驚內
因也勞心好色亦內也跌撲閃肭傷重蓄血者不內外
因也凡吐血宜降氣不宜降火氣降火自降矣宜行
血不宜止血行則自循經絡止則凝而作痛矣宜養肝
不宜伐肝肝生血氣亦主藏血也。凡吐血色紫黑者
皆瘀也。以出為妙未盡以大黃桃仁紅花生地丹皮行
之轉逆為順若過用涼藥氣血傷而脾敗矣。按吐血
有氣虛挾寒陰陽不相為守血亦妄行蓋陽虛陰必走
也然必有虛冷之狀方是勿誤。胞移熱膀胱痛者為
淋血出尿竅心移熱小腸不痛者為溺血出精竅一曰
溺血不痛下元虛冷也。腸風由腸胃濕熱鬱積甚至
脹滿而下血也使血者陰氣內結不得外行血無所稟

滲入腸間也與腸風不同。又便血內因濕熱酒色七情外感六淫氣血逆亂。又腸風由邪氣外得色鮮在糞前近血屬大腸氣臟毒由熱毒內積色黯在糞後遠血屬小腸血腸澼由長夏濕熱血與水穀齊出沈金鰲云腸風藏毒便血腸澼四者相似而各有辨。下血紫黑不痛者濕毒宜黃連鮮紅痛者熱毒宜白芍。下血不痛者寒宜乾薑桂枝。蓄血有上中下三部喜忘發狂身黃尿黑爲重但小腹滿小便不利爲輕治以去瘀爲先。通治諸血症脾肺之血係氣虛以補氣益脾爲主肝血係勞傷以滋陰降火爲主。吐血首宜清瘀然後止之以歸其經補之以還其元此正治也。凡血逆行難治順行易治吐嘔變而下行爲惡痢順也邪欲去也。陽盛則身熱多渴陰盛則身涼不渴然血陰也身涼易愈諸見血潮熱脉大者難治邪勝也。理血膏通治衄吐溺便一切血變血積諸症黨參丹參黃蓍生地熟地當歸川芎白芍赤苓白木天冬麥冬栢子仁棗仁遠志五味丹皮地骨皮龜板鼈甲柏葉知母貝母半夏橘紅膽星羌活防風連翹荆穗炒白芷吉梗柴胡蒼术香附鬱金延胡靈脂蒲黃蘇木桃仁紅花艾葉茜根官桂大黃元明粉厚朴枳實花粉續斷梔子炒黃栢黃芩黃連

木通車前子地榆炭薑炭降香乳香沒藥蘇子甘草髮
灰百草霜各一兩油熬丹收牛膠二兩攪勻 又方另
用薑蔥菲蒜槐柳桃桑枝鳳仙全株約各半斤油熬丹
收薄荷油二錢攪兩膏合併攤貼。虛勞咳血補肺膏
。事行瘀膏大黃四兩苳硝二兩柴胡瓜蔓根桃仁當
歸生地紅花山甲蓬朮三棱川芎各一兩乳香沒藥官
桂各七錢川烏三錢油熬丹收花蕊石一兩血結五錢
另研墮。涼血膏見前。按血爲氣配古言男調氣以
養血女調血以耗氣又補血以養榮非順氣則血凝補
氣以助衛非活血則氣滯可悟陰陽補瀉之道理氣理
血二膏本此川藥。又繆仲醢治吐血白灸草制肝麥
冬薄荷橘紅貝母枇杷葉清肺苡仁山藥養脾菲菜降
香蘇子下氣青蒿鼈甲丹皮地骨皮銀柴胡補陰清熱
棗仁茯神養心山萸杞子牛膝補腎可以爲法又曰陰
無驟補之法病家欲速其功醫士張皇**精血凝而有質**
失主百藥雜試往往殞命此語亦可佩**精血凝而有質**
精血重濁在下陰也靜也地之象也**魂隨神而知覺生**
合上神氣運於無形是亦小天地也**魂隨神而知覺生**
隨神往來者謂之魂魂**魄並精而運動作**並精出入者
屬陽肝藏魂主知覺**魄並精而運動作**謂之魄魄屬

陰肺藏魄

神走斯臟氣絕

耽讀忘食則夢穀神出矣溺色則夢二女沒於腰矣二女

主運動

腎神也又眼欲瞎

精亾斯白血出

勞損所生吐如雞者亦見童子走也

有戴砂以安

神。心神不安絳囊盛靈砂戴於頂上又產婦譫語砂點四焰燈照之又小兒夜

啼殊砂水磨塗心口手足心或殊砂寫于午二字貼臍

上皆法也

心血可酌加又殊砂安

熨椒以舒

氣。凡氣病可用花

神九磁硃丸並可推用

椒包置患處湯壺熨

之或花椒末調餅貼燒艾一炷并治痞

氣或花椒橘皮青鹽烏梅炒布包熨之塗倍以祕精之

主宰在心藏制在腎夢而遺者相火盛而強迫之也不

夢而遺者心腎虛弱不固也又夢泄屬鬱屬經絡熱屬

濕痰滲者宜辨。通用瀉精五倍末津調塗臍。附方
夢遺屬相火盛者甘遂甘草末猪脊筋搗丸納臍膏
掩七日一換能清相火屬濕熱者川棟子肉加龍骨
牡蠣煑灸瘡膏貼臍下一寸三分灸瘡膏即川芎當歸
赤芍白芷各二兩細辛髮團各一兩麻油熬鉛粉收者
屬鬱者古用猪苓半頁以半頁有利性而猪苓能導

水即腎閉導氣使通之意前有猪苓方見瀉註可借用
○治陰虛火動夢遺者用生地白芍川芎當歸麥冬黃
柏酒炒知母密炒黃連薑汁炒梔子炮薑黃肉牡蠣煨
等分麻油熬黃丹收隨症酌加丸末貼○治陽虛精脫
不禁者用兔絲子白茯苓韭子龍骨等分熬貼如前加
末用○濁由敗精流注者多由濕熱滲入膀胱者少
葱白和鹽炒熏陰處或童便製牡蠣同大蒜搗敷臍
治赤白濁椿根白皮三兩乾薑白芍黃柏一兩油熬丹
收貼在浴室中出一小便母
令人知可愈淋濁亦一奇也
燒茅以清血○吐衄者
於上聞之免血暈○按神有邪擾硃砂鎮之氣欲降花
椒達之精苦洩五倍飲之血脫者益氣故用茅根此醫
理也亦治法也舉一味而
其餘用藥之道均可推矣
先天之本在腎滋陰者嚙津
探三一腎氣之源承上申言五臟即由氣血而遞及痰
九名
為潮熱咯血火動於下則為遺精泄瀉凡治陰虛火
炎咳嗽者二六時中常以舌抵上腭令華池之水充滿
以意目力送至丹田口復一口此真水補真陰法可代
腎氣丸如夜間不寐或口乾津液不上升用此亦妙○

滋腎膏生地熟地山藥黃肉四兩丹皮澤瀉白茯苓瑱
陽龜板各三兩牛膝杞子黨參麥冬各二兩天冬知母
黃柏鹽水炒五味官桂各一兩麻油熬黃丹收貼心口
丹田卽二一腎氣丸方也原云古方如腎氣丸固本
丸補陰丸俱是滋陰補血之劑然固本丸胸滿有痰者
忌之補陰丸脾虛有濕者忌之惟腎氣丸專於補腎滋
陰而兼理痰濕最爲切當但只數味不足以盡其變今
以三方合而爲一補瀉兼施庶乎可也此法實爲集古
方成膏之所本故附錄之又小兒腎疳有用此方加川
楝子使君子者亦可爲加藥之法又此膏加猪腎一對
猪骨髓一兩熬卽丹溪治痿補益法也並可參。又按
腎屬水水不足則陰虛宜六味滋陰命門屬火火不足
則陽虛宜六味加附桂或再加五味子補水兼補火老
年水火俱虧腎氣虛乏下元冷憊腰痛脚軟夜多旋尿
面黑口乾耳焦枯者宜兼補此膏參附桂末貼或鹿茸貼後天之本在脾調中者摩

腹寓大和健脾之理脾腎合論。脾在胃下主消磨五

熱中善飢陰氣有餘陽氣不足則寒中腸鳴腹痛飲
食自倍脾胃乃傷薄滋味所以養血氣也。內傷調補

理論駢文
卷
五

之法。麥芽香附當歸枳實半夏各二兩。陳皮黃連吳萸。山查白蔻仁益智黃芪山藥甘草七錢。黨參廣木香五錢。麻油熬黃丹收貼心口。臍上即太和丸法也。加蒼朮大黃各二兩。黃芩厚樸檳榔各一兩。以雄猪肚石上擦淨。裏藥熬尤良。脾腎雙補膏。蒼朮熟地各一斤。五味茯苓各半斤。乾薑一兩。川椒五錢。或用砂仁。末亦可。麻油熬黃丹收。糯米炒。炙腹助脾運。航酒好色。以傷肺氣漫憶山人之雲母。

宜戒酒色。雲母能補肺。用雲母四兩。油熬丹收可。

通治內外症。凡熱在上焦咳而有渴。唾涎沫為肺痿。若口中辟辟燥咳。咳則胸中隱隱痛為肺癰。雲母膏治肺癰。用雲母煇硝甘草各四兩。槐枝柳枝桑白皮側柏葉橘皮各二兩。川椒白芷沒藥赤芍官桂當歸黃蓍血結芎藭蒲白芩川芎白斂木香防風厚樸苦梗柴胡黨參蒼朮黃芩草龍膽合歡乳香茯苓各五錢。清油熬黃丹收。松香二兩。攪勻攤。另用水銀二兩。彈於膏上。臨用刮去水銀貼寶鑑方有附子良薑各五錢。同熬并治腸癰及癰毒瘰癧骨疽內疽乳癰五發發背折傷等以敗蒲煎水洗貼。凡酒色過度虛勞少血津液內耗心。

火自焚遂使燥熱乘肺咯唾膿血上氣涎潮須用六味
地黃藥料加橘紅貝母黃柏知母又肺虛氣促氣喘或
吐唾血將成肺痿證紫苑黃薷白芍甘草人參麥冬當
歸五味子二方可併熬○清肺膏治肺病并失音者黨
參陳皮貝母半夏夏吉梗茯苓桑白皮知母枳殼杏仁欬
冬麥冬地骨皮黃芩生地各一兩黃連炒木通五味蘇
子訶子肉菖蒲甘草生薑各五錢枇杷葉百合各四兩
油熬丹收阿膠入錢攪貼胸若腎虛失音者宜黨參
川芎當歸熟地白芍茯苓兔絲子五味子杜仲巴戟天
橘紅半夏麴各一兩牛膝白朮破故紙胡蘆巴豆智仁
甘草各五錢菖蒲三錢加薑棗油熬貼臍下蓋納氣歸
腎則咳嗽減而氣以增其聲自出矣按心爲聲音之
主肺爲聲音之門腎爲聲音之根凡治失音以清肺膏
貼胸口此膏貼臍下最妙卽貼法也凡諸病之宜兼治
者照此推○補肺膏治肺虛或痰或血或痿并一切滋
陰降火皆宜實虛癆通用方也鼈甲全個先熬去渣入
黨參元參黃薷紫苑天冬麥冬熟地生地地骨皮山藥
貝母知母百合各二兩柏子仁黃柏白芍橘紅丹皮吉
梗赤苓杏仁香附當歸五味秦艽花粉黃芩炒黑山梔
杞子各一兩柴胡炒鬱金白朮川芎蒲黃炒桑皮炙黃

連半夏膽星甘草各五錢蘇子三錢薄荷二錢牡蠣八錢烏梅七個油熬丹收牛膠白芨二兩調 清熱降氣
瀉正是補若 負重鬥力以傷肝血莫希王者之寄奴 宜
專補則助火 負重鬥力以傷肝血莫希王者之寄奴 戒
負重鬥力。寄奴能合金瘡。補肝膏治肝虛氣血爲
病者或有隱痛並宜亦虛損通用方也鼈甲全箇先熬
去渣入黨參生地熟地杞子五味子當歸萸肉各二兩
黃耆白朮白芍川芎醋香附山藥棗仁靈脂各一兩柴
胡丹皮黑山梔龍胆草瓜蒌黃芩茯苓木通羌活防風
澤瀉生甘草各七錢黃連續斷吳萸陳皮半夏紅花五
錢薄荷官桂各二錢烏梅五個油丹熬牛膠三兩攪。
按肝實火旺者有柴胡黃連香附青黛甘草方 肝虛
陰血耗竭面色黧黑耳聾目暗脚弱腰痛小便白濁有
當歸鹿茸烏梅肉萸肉麝香方 肝傷有瘀積有柴胡
大黃瓜蒌根當歸桃仁紅花炮 苟調以胎之呼吸 息即胎
山甲方 俱可臨症酌量加用 苟調以胎之呼吸 息也
○任脈通肺以繫臍帶故兒在胎中隨母臍爲呼吸也
學胎息者須想其氣出從臍出氣入從臍入調得極細
然後不用口鼻但以臍呼吸數至八十一或一百二十
乃以口吐氣出之能胎息可入水 又眼視鼻鼻對口

口對臍想其出入可降心火入而氣自納於臍氣歸臍

丹田亦名胎息此法甚簡而效入氣不必擦脚之餅也縮陽祕法水蛭預取九條陰乾

餅臨卧擦左脚心能導其脈之流行而血自歸於經矣降心火此回春方

庸塗項之膏也按治咳紅導引法坐定兀子上以雙手

放之放而又閉日行五次兼用運氣三七口如氣稍急微微

前推開次湧泉水洗心或封固臍凝守此方推胸

洗心固臍之法須以意會。血用前洪寶膏塗項能

截血路少林推之在手塗臂在足塗腿名截血膏能者

亦可或衝而攻減萬春以平其逆可代三和之散焉萬

更推膏治肝胃氣痞塊癥瘕鶴膝疝氣脾虛泄瀉一切內症

疼痛跌撲閃挫風氣桑槐柳枝各四斤麻油四斤熬新收桃枝攪另用生大黃兩半白芷當歸紅花防風羌活獨活生香附南星木瓜佛手乳香沒藥沈香丁香木香入錢白芥子二錢肉桂五錢麝一錢研末和入膏內

理淪駢文

李

原方有黃耆川烏牛膝麻黃茜草無香附木瓜佛手
此從張刻減本然原方力大。三和散治諸氣鬱滯脹
痛用羌活木瓜沈香木香紫蘇川芎厚樸甘草陳皮檳
榔白朮之屬。又熱結血閉有三和湯用生地白芍當
歸川芎連翹大黃芒硝薄荷黃芩梔子甘草乃合四物
調胃承氣涼膈爲一方者如治氣鬱血閉可併用熬貼
兼表裏寒熱升降補瀉之妙此又從前人集
方之法而更推之者也凡膏方皆可倣此推或溢而洩
增十灰以止其狂可抵七生之飲焉治嘔血吐血咯血
嗽血及虛勞大吐
血十灰散大薊小薊柏葉荷葉茅根茜根丹皮櫻皮大
黃梔子黃等分燒灰加藕汁萊菔汁金墨汁調用。治
血崩及一切失血十灰散黃絹馬尾藕節艾葉蒲黃蓮
蓬油頭髮陳棕赤松皮新棉皆燒灰以醋煮糯米取湯
爲丸用。竹林崩漏散用藕節柏葉艾葉陳棕大小薊
丹皮山梔胎髮瓜萸燒灰全。三方臨症酌量十灰亦
不必全皆以生地當歸川芎白芍蒲黃白芷荆穗地榆
甘草皆炒過煎湯入醋少許下廣膠化開加炒黃丹收
調十灰貼心口臍下。附治諸血方以備用。古斷心
火也木賊草煎水嗽立止一用黃連連翹竹心煎嗽或

烏賊骨蒲黃炒研塗舌或用黃柏槐花慘或用茅根車
前子髮灰吹擦舌出血如泉五倍牡蠣粉白膠香塗。
齒齬胃火也齬屬胃齒屬腎一經相併血出於縫用緣
袍散黃柏青黛薄荷苡硝冰片慘胃熱口臭者大黃生
地片貼腎虛者青鹽香附草烏皂角炒研擦或絲瓜藤
或絲瓜絡燒灰擦旱蓮草研末擦地骨皮杞子麥冬湯
嗽竹葉白鹽煎嗽有眼輕粉而齒齬者另治。耳血
生地汁滴或蛇蛻灰吹并治乾痛亦有加海螵蛸乾咽
脂燒灰吹者或陳皮炒黑加燈草灰吹或龍骨煨研加
枯礬吹并治膿耳一切。鼻血蒲黃炒或血結末或油
髮灰末或人中白末吹鼻或枯礬龍骨麝香以濕紙包
藥塞鼻餘見前傷寒。九竅出血小薊百草霜香附蒲
黃炒擦牙并慘出血處。肌衄硃砂寒水石麝香研撲
或煮酒填紙揉碎如楊花雕之立止此症血從毛孔出
亦名脉溢乃虛極有火也。指縫出血多年糞桶縫燒
灰吹。爛中出血虛也髮灰慘凡血皆可用。孔竅出
血山甲末慘此物最能補漏。金瘡出血麻黃細辛敷
。破傷經絡出血靈脂末慘。臟毒榆皮冷茶敷。腸
風馬兜鈴藤穀精草三棱烏頭煎洗。血崩燒漆器令
聞或舊毡條或棉花胎坐身下或黑驢糞燒熏危急者

黃丹鉛粉絹包塞以線帶住止卽去之又有燒大敦穴
法再發仍於原處燒之自止大敦肝穴也。凡止血以
藕汁調金墨用及吹髮灰百草霜草紙灰皆驗麻油浸
胭脂漱或生地塞鬱金塗三七塗韭菜炒熨皆妙下部
宜槐花地榆煎洗。痔瘻出血血結未摻。治血七生
飲者卽生地生荷葉生韭菜生茅根生藕節各一兩生
薑五錢取汁加聖汁用者乃四生飲加味生血者氣氣結成痰幻增百怪擦
控涎丸而運之痰者津液之異名潤養肢體者也肺曰
客於肺水升火降脾胃調和痰何從生痰原於腎動於脾
濁爲痰清稀爲飲痰由肺虛火炎熏灼而成故稠濁飲
由脾虛水停不散而成故清稀痰宜降氣清熱益陰
滋水飲宜燥濕利水行氣健脾肺喜涼潤惡溫燥以
二母二冬地黃吉更爲要藥脾喜溫燥惡寒潤以二木
星夏爲要藥。痰有十風痰寒痰濕痰熱痰鬱痰氣痰
食痰酒痰驚痰也寒痰清濕痰白火痰黑熱痰黃老痰
膠風痰青而光陰虛多黏痰。飲惟清水或青黃黑綠
酸辣腥臊鹹苦皆是飲有五流於肺爲支飲肝爲懸飲
心爲伏飲經絡爲溢飲腸胃爲痰飲也懸飲亦謂流飲

又有留飲癖飲總由飲食水漿乘時失度所致令人咳
逆倚息短氣不得卧形如腫脇間動搖漉漉有聲咳嗽
引痛膈滿嘔吐喘咳發熱惡寒腰背痛目淚出或身傷
喘體重背冷四肢慄節痛。凡痰症初起頭痛發熱類
外感表症久則潮咳夜重類內傷陰火痰飲流注肢節
疼痛又類風症但痰症胸滿食減肌色如故脉滑不白
不定爲異凡有痰者眼皮及眼下必有烟灰黑色
痰症與火症別處痰有形火無形腫而痛者痰痛而不
腫者火也。古云十病九痰又曰暴病多屬火怪病多
屬痰王隱君滾痰丸用大黃黃芩礞石焰硝煅加硃砂
沈香丹溪加陳皮半夏白朮茯苓人參甘草薑汁竹瀝
爲達痰丸又丹溪有控涎丹用大戟甘遂白芥子行水
健脾治痰之本或加大黃芫花黃柏南星半夏蒼朮白
朮枳實陳皮紅花杏仁桃仁神麴薑汁竹瀝皂角明礬
或加芫花葶藶巴豆黑丑王全生用控涎丹敷附骨疽
鶴膝風或酒或蜜或醋調用又汪本消痰消核膏用甘
遂南星半夏各一兩麻油熬下麻黃大戟僵蠶四錢白
芥子五錢藤黃六錢撲硝七錢黃丹收貼則皆用控涎
法而變通者也。控涎丸治風痰熱痰濕痰食積痰及
痰飲流注痰毒等症惟陰虛之痰與冷痰勿用 蒼朮

生南星生半夏甘遂各二兩白朮芫花大戟大黃葶
 黃柏黃芩黃連梔子枳實陳皮青皮香附靈脂各一兩
 連翹吉更薄荷白芷赤苓川芎當歸前胡鬱金瓜蒌
 椰靈仙羌活防風蘇子皂角明礬白芥子蘿蔔子
 全蝎木鼈仁延胡細辛菖蒲雄黃各七錢白附子草烏
 木香官桂黑丑吳茱巴仁紅花乾薑厚樸輕粉炮甲各
 四錢研薑汁竹瀝各一碗牛膠一兩水煎和丸殊衣臨
 用薑汁化開擦胸背手足心痰白下或加黨參犀角
 此方用生薑半斤槐柳桑枝各二斤鳳仙花莖子葉全
 一搗貼亦治百病。附方 凡痰塞者皂角一斤生甘草
 一兩黨參五錢百草霜三錢陳酒熬膏臨用加薑汁調
 塗頸名黑龍膏 又治中風驚風乳蛾等症延胡煨二
 錢牙皂十四枚青黛六分麝一分清水為錠名青金錠
 臨用水磨滴鼻凡痰熱水泛則制其水 腎水水泛為痰
 皆可塗心口 餘見前 配氣者血血流變汗危
 睡而不咳者宜入味九藥料熬 配氣者血血流變汗危
 膏貼臍下 或川滋腎膏加藥 配氣者血血流變汗危
 見諸虛塗鎮液丹而斂之 肺其至清而至精者由肺而

灌漑乎四體而爲汗液津唾助血脈益氣力生生不已其清中之濁者下入膀胱而化爲水也。腎主五液入心爲汗又汗爲心液心動則汗出陸云諸汗心腎兩虧病也然有風寒暑濕之邪有五臟之虛宜辨。汗卽血也故古云奪血者無汗奪汗者無血。風傷衛故有汗表氣虛亦多汗風濕多自汗暑病多自汗濕與熱合邪汗出不休而身軟又火氣上蒸胃中之濕亦能作汗。寤而汗出曰自汗屬胃陽虛宜補陽固衛寢而汗出曰盜汗屬腎虛有火宜滋陰降火。凡熱邪乘陰虛出者汗熱寒邪從陽虛出者汗冷又痰症冷汗自出津津淡背又有頭汗分部位看額心鼻脾頰腎左額肝右額肺若齊頸而還血證手足汗屬胃熱心口獨有汗屬心勞過度柔汗絕汗也。治外感風邪自汗羌活防風川芎白芷白朮黃耆桂枝白芍甘草柴胡黃芩半夏各五錢油熬丹收貼心口卽實表法也。按去黃耆白朮桂枝加蔥薑各一斤麻黃蒼朮杏仁各一兩熬卽發表。治自盜諸汗生黃耆二兩白朮棗仁熟地當歸白芍柏子仁麻黃根各一兩五味子防風龍骨各五錢牡蠣粉一兩五錢赤石脂一兩二錢共研末用紅棗肉黑小豆浮小麥各一兩煎汁化牛膠五錢和丸名鎮液

丹隨片酌以開水磨塗心口亦可用麻油熬膏黃丹收
貼按陳脩園曰衛外之陽不固而自汗則用蒼附脾
中之陽遏鬱而自汗則用木附腎中之陽浮游而自汗
則用參附若陰虛火擾之汗則倍用黃耆加當歸生地
熟地黃連黃柏黃芩如熬膏藥可以此為法又痰加
半夏濕加羌活臨症斟酌總期愈病不徒好為高論
附方陰汗腎虛陽衰者蛇床子酒炒白礬陳醬煎洗
血汗髮灰撲或郁李仁研生梨汁調敷按郁李仁破血
或用其敷法而酌易以他藥亦可篇中存方以津脫則
備法往往有取其法而不取其藥者識者察之津脫則
益以津之此即法也。治自汗首烏末津調塗臍以補
用鬱金末臨睡津調塗兩乳上盜汗或用黃柏末
通治自汗盜汗五倍末津調塗臍或加枯礬。附方
治一切虛汗盜汗自汗及漏風等汗泄不止諸藥不效
者麻黃根白朮藥木牡蠣龍骨五錢糯米粉二兩水片
五分撲可參用。誤用麻黃汗出不止將病人頭髮浸
水并用撲法。按腎主五液分化五臟入心為汗入肝
為淚入脾為涎入肺為痰奚由生汗不再泄榮中而
涕自入為唾症詳醫書

衛外爲榮者水穀精氣上注於肺者也衛者其悍氣也血
喪生之本也。榮氣之行自太陰肺始徧行臟腑其行
也以息往來一周於身無晝夜陰陽之殊也衛氣寤則
行陽寐則行陰皆從足少陰腎始至平旦與榮會於手
太陰故少陰病但欲寐。邪氣客於五臟六腑則衛氣
獨衛其外行於陽不得入於陰則陰盛陽虛故目閉半
夏能和胃而通陰陽。又氣行脈外血行脈中相並周
流寒濕搏之則滯凝而行遲爲不及火熱搏之則沸騰
而行速爲太過氣鬱邪入血中爲陰滯於陽血鬱邪入
氣中爲陽滯於陰致生百病癰生六腑疽生五臟亦由
陰陽相滯而成也川芎當歸能和血行氣而通陰陽。仲
景桂枝湯爲風寒調和營衛之方又養榮湯爲大補氣
血之方均可爲法。按十全大補藥料加陳皮等火降而
水分遠志減半油熬丹收貼可治內外諸虛症。升二
句總上。凡陰陽損傷皆因水火不濟故但以調
神氣血自生。治勞損心腎虛而有熱者生地熟地山
藥茯苓神三兩當歸澤瀉黃柏兩半山黃肉杞子牛膝丹

皮黃連生甘草龜板鹿角各一兩麻油熬黃丹收珠砂
一兩攪勻攤貼心口丹田即古庵心腎丸方也若虛
而有寒者兔絲子三兩牛膝熟地肉苁蓉附子鹿茸黨
參遠志茯神黃耆山藥當歸龍骨五味各一兩如前熬
貼即究原心腎丸法也又黃連肉桂同用能
交心腎於頃刻或用蜜丸填臍膏蓋或糝膏貼胃主水
穀而納臍腑皆稟氣於胃五味各走其所喜酸先走肝
苦先走心甘先走脾辛先走肺鹽先走腎穀氣精液已
行榮衛大通乃化糟粕以次傳下大腸主津小腸主
液胃氣不足二腸無所稟受則津液涸焉飲食入胃
則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛更虛更實故氣得
上下而無病何惡心嘔噦噫醋熱吞酸寒食少是慮胃傷之
飲食胸腹脹痛嘔噦惡心噫氣吞酸面黃肌瘦怠惰嗜
卧常多自利。前有健脾胃膏○禦寒暖胃膏生薑汁熬
入牛膠化開以乳香沒藥收糝花椒貼并治腰背冷痛
但須入黃丹方黏此方加蒼朮厚樸陳皮甘草即平胃
散也治脾胃不和惡心嘔噦噫醋吞酸等症再加白朮
神麴麥芽即養胃進食方也再加黃連吳茱萸香附良薑

官桂白芍當歸油丹熬膠攪名和胃膏。按胃氣者清
純沖和之氣惟與穀食菜果為宜藥各有偏性雖參耆
之性亦偏東垣云胃病調其飲食適其寒溫澄心息慮
以待真氣之自復至言也故凡胃病或病後調理胃氣
當遵東垣之說但調其飲食或以和胃膏貼胸庶腸小
不碍乎清純沖和之氣而元可復也胃痛方見下腸小

泌清濁而出

胃中腐熟水穀滓穢傳入小腸上口白小
腸下口泌別清濁水液入膀胱上口滓穢

入大腸上口

小腸有氣則小腹痛有血則小便澀有
熱則莖中痛大腸寒則腸鳴飧泄熱則出黃如麋

膀胱或云有上口而無下口一云上下俱有口上系小

腸下聯前陰中有胞藏水氣化而為尿膀胱熱結小腹

苦滿胞轉小便不利又膀胱冷則濕詎飧泄黃麋大遺
痰上溢而為多唾小便淋瀝或遺尿

淋不利

膀胱詳見前

俱

水短為憂

老人小水短為病進又尿
數陽衰也。五淋亦曰八

淋大抵不外腎虛膀胱熱冷淋千百之一也初則為熱

為血久則煎熬津液為膏砂石也宜戒鹽熱淋血淋散

血利小便煎熬砂石等淋開鬱行氣破血滋陰治法熱

淋瓦松煎洗小腹沙石淋地榆煎浴腰腹血淋麻

目青牛之

三

根髮灰車前子地骨皮煎洗。通淋膏通治膀胱積熱
淋祕尿血等症。元參麥冬當歸赤芍知母黃柏生地黃
連黃芩梔子瞿麥穗扁蓄赤苓猪苓木通澤瀉車前甘
草木香鬱金草薢亂髮各一兩。油熬黃丹收。滑石八兩
攪勻貼臍下。沙石淋及一切淋屬虛者並治。冷閉小
便不通。初起熱者勿用。久則雖熱亦虛。非此不治。用白
蔻砂仁胡椒川椒各末一錢。入小布袋內。以好燒酒熬
極滾熱。沖入布袋內。即套上陽頭熏之。冷淋寒戰後
搜用胡椒煎湯浴腰腹。治膀胱虛小便不禁。附子乾
薑赤石脂塗臍。或糝膏貼。并治殭泄不化。又遺尿龍骨
煨末醋夜卧蚤起。無厭於日。見內經四氣調神法。此二
調數。臍夜卧蚤起。無厭於日。見內經四氣調神法。此二
長生厭也。按古訓。凡陰平陽祕。我體常春。見丹溪氣
人皆宜早起。故節取此。陰平陽祕。我體常春。見丹溪氣

血既和精神自旺。祇如平人即為無病。

平人吃得下。病得出睡。得着即

無病。若程子言。我能吃飯睡覺。乃

聖賢無欲之功。不可同日而語。然百體固稟令於心

而諸臟皆取決於膽。

補言。膽以心陪說者。心膽全一治。膽敢也。

將軍之官清淨之府養心裁紅布抹其胸今人以紅布抹胸云可養

心是既衰以養心之藥如以丹參龍齒遠志茯神柏子

入抹胸溫膽炙青布熨其目兩眼青布代青黛用肝竅

中亦妙溫膽炙青布熨其目或黑豆蒸熱盛囊枕之黑

在日膽脉又起目銳皆也或黑豆蒸熱盛囊枕之黑

豆補肝又膽脉循頸也耽睡用鼠目煨和魚膏點眼

皆取不睡此類方不必盡驗亦浸以溫膽之前用溫

然可議古人用藥并施治之意亦浸以溫膽之前用溫

藥料煎浸青枕虎頭而除魘夢寐無驚心虛多魘枕虎

佩麝香蘇合丸着蛛絲而療忘謀慮自定七夕以蛛絲

之屬貼補心膏着蛛絲而療忘謀慮自定七夕以蛛絲

能療忘又丁酉日遠志着巾角中全此類方今醫所

笑為兒戲者然遠志交通心腎藥也何以不用服而用

着又何以用丁酉日此中當自有妙理憫勞法天王之

惜後人不解耳姑存此以待善悟者

丹○血虛而煩熱口乾者生地二兩黃連一兩黨參元

參丹參歸身天冬麥冬遠志柏仁棗仁茯神吉更五

聖命詳文

矣

味各五錢油熬丹收硃砂一兩攪勻貼一加熱地杜仲
各一兩菖蒲甘草各五錢即天王補心丹法也肝加膽

星解煩效地仙之散煩心虛則煩肝腎肺虛而邪攻之亦

力之劑地骨皮二斤麻油熬丹收貼或加人參麥冬防

風甘草各一兩烏梅三個同熬或地骨皮同丹皮四物

熬皆地仙散法也自上至下而總括三部即三焦也三焦指腔

是也。○心肺無上焦何以宗主榮衛脾胃無中焦何以

腐熟水穀肝腎無下焦何以疎泄津液無形而有用主

持諸氣。○原者三焦之尊號臟腑病皆取原穴如肺太

淵心太陵肝太衝脾太白腎太谿詳難經。○三焦約用

松陳木橫牽牛由內及外而兼列雜篇上言內景以下乃合外

形統於首治周其身下文自首頭面諸疾皆失升降之

故凡頭面諸疾皆百邪上攻胸膈間病皆百邪上衝腸
胃間病皆百邪下流而傳入不然則血氣失升降之
常陽當升而不升陰當降而不降議病機括盡於此矣
○按六陽皆會於頭面者手太陽小腸脉從缺盆貫

上頤至目髮會手少陽三焦脈從缺盆上耳上角以屬
下頤至頤手陽明大腸脈從缺盆上頸貫頰入人中上
挾鼻孔也足太陽膀胱脈起於目內眦上額交頤上足
少陽膽脈起於目銳眦上抵頭角也又足陽明胃脈
起於鼻交頤中入齒挾口環唇循頰車上耳前過客主
人維絡於面故而病專屬胃。六陰脈皆至頤而還惟
厥陰與督脈會於顛。中庭各部隱藏凶吉之分自鼻
古有升降散可倣用藥。髮際曰天中天下曰天庭即額也天庭下曰司空司
空下曰印堂在兩眉間亦曰闕兩額角曰方廣皆命門
部位占病吉凶如黑色出天庭主凶後有一枝梅貼法
。自額而下關上屬首咽喉之部分也自關中循鼻而
下鼻端屬肺心肝脾腎五臟之部分也自內眦挾鼻而
下至承漿屬膽胃大小腸膀胱六腑之部分也自顴而
下頤則屬肩臂手之部分也額屬心鼻屬脾左額肝右額肺頤腎
。兩眉心候肺兩眼中為明堂候肝鼻尖候脾鼻尖兩
旁候胃肝位兩旁候胆肝位下鼻之兩旁候小腸兩
顴之下候腎腎位上焦寄於肺中焦寄於脾下焦寄於膀
胱三焦無部位

眊也。五色獨決於明堂黃為濕赤為火青為風黑為痛白為寒相生則吉相克則凶沉濁為內為裏浮澤為外為表察浮沈以知淺深察澤天以觀成敗生克者如脾病黃為正色見紅為火生土吉見青為木克土凶天者枯也凡色貢有神謂黃明而有光彩隱於皮膚之內如脉之有胃氣也餘詳見鑑本腦為髓

海靈之所存空則胸而冷則遺亥筋益其髓腦為上丹

為中丹田藏神臍下三寸為下丹田藏精之府也背

後有三關腦後曰玉枕關夾脊曰轆轤關水火之際曰

尾間關人諸髓皆屬腦故上自腦下至尾骶骨皆精氣

升降往來之道路也。元宮者元神之室靈性之所存

也即泥丸宮。腦有餘則輕勁多力不足則腦轉耳鳴

脛痠眩冒目無所見。風邪中項乘虛隨眼系入腦則

腦轉而目眩。腦冷髓不固多遺精。按人以腦為主

而奇恒之府腦為首外治貼法百會穴至要又千金方

膏盲三里湧泉三處百病皆治膏藥亦全。腦病鼻曰

猪脊筋晒乾炙研啗。腦痛桃葉作枕盡自鼻出鼻曰

神廬息之所運流則動而凝則靜辛荳和其神黃庭經

名鼻曰

神虛言鼻爲神氣出入之門也。五氣入鼻藏於心肺。心虛言鼻爲神氣出入之門也。五氣入鼻藏於心肺。毛皮細辛川椒乾薑川芎吳茱萸附子七錢半皂角屑五錢桂心一兩猪油十兩熬膏以苦酒浸前八味取入猪油膏內熬附子黃色止棉裏塞鼻効若鼻流濁涕曰淵卽腦漏乃胆移熱於腦亦外寒內束熱之症用辛夷五錢蒼耳子二錢半白芷一兩薄荷葉五分研搗鼻或單用蒼耳子或薑香嗅或山鴿翎毛灰三錢指漆布一口燒灰加冰片吹。鼻鼈風寒客於頭腦而氣窒不通也黃連瓜蒂赤豆冰片末吹并治瘧疾。按呂氏春秋氣鬱則爲鼈爲窒。附方。鼻窒痛杏仁白芷細辛一錢全蠋二個焙末麻油調敷。鼻鼈鼻痔相類皆肺熱也窒塞疼痛辛夷二兩木通木香杏仁白芷細辛五錢以羊髓猪油二兩和藥熬膏入冰片麝香爲丸棉裏塞鼻中消或瓜蒂四錢甘遂一錢草烏尖枯礬白螺螄殼灰五分麻油調勻納鼻化水或搗芫荽塞。鼻痔兒茶雞肫皮乳香沒藥焙研末搽如爛通鼻孔者煨鹿角枯礬一兩髮灰五錢花椒水洗後搽瓦松末收口。鼻瘡杏仁油和鹽塗之。按老人清涕有大蒜搗貼足心法濁涕有香附華蘼發大蒜搗餅貼額門髮斗髮法皆可以法

推用 又鼻流清濁涕鉞灸多取百會上星風眼司乎

府風池風門大顛等穴膏藥貼法亦與鉞灸通

視 其障也 臟腑精華皆稟於脾注於目 心合脉諸

腎水。白馬肺黑屬肝上下瞼屬脾內外眥屬心瞳神

屬腎白輪赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光

被翳火乘肝腎也赤脉貫目心火自甚也眼無火不病

治法清心涼肝調血順氣。凡眼暴赤腫痛畏日羞明

名外障風熱傷血則赤作實則腫攻注則痛實症也表

症也久病昏花細小沈陷名內障由血少所致虛症也

裏症也實宜散風瀉火虛則滋水養陰然散風之中必

繼以養血以目得血而能視也養陰之中更加補氣以

氣旺則能生血也 河間謂目盲耳聾鼻不聞臭口不

知味手足不能運動皆由元府閉塞而神氣出入升降

之道路不通利也故先賢治目昏花用羊肝丸以解肝

鬱肝鬱解則目之元府通利而明矣黃連之數解熱鬱

也椒目之類解濕鬱也茺蔚解氣鬱芎歸解血鬱木賊

解積鬱羌活解經鬱磁石墜邪下降蔓菁下氣通中皆

治氣血鬱結目昏之法也東垣丹溪用參耆四物等以

助氣血運行而元府更無不通利矣。又眼無寒症但

初起宜發散忌酸寒之藥點切忌冷水洗又眼不點不
瞎亦忌水磨金石之藥頻點生火積熱爲害傷寒熱病
後尤忌點恐熱聚於目未有不脩其六事晉范甯苦目
疾張湛書六
瞎者故此篇所錄不專尙點
事戲之曰損讀書減思慮專內觀簡外事早起晚夜眠
早非但明日乃亦延年許學上評之曰審如是而行之
眞明目之奇方也。按點服論云內疾旣發非服不除
外疾旣成非點不退內外夾攻方盡其妙此方足代內
服若不脩六事卽內服藥亦何益乎。又按晉書宣王
童時有目疾華陀出其眼瞳去其疾而納之數以藥此
法妙極今人亦有能出眼瞳而洗者惜不能啗硝蛻暴
如陀之去疾耳然自是一種外治奇法存參啗硝蛻發
眼痛火硝四錢黃丹乳香沒藥各二錢雄黃一錢研含
水吹鼻。又赤腫昏暗羞澀痛癢及翳膜努肉眇淚拳
毛等症并傷風熱腦鼻痠疼皆治用羌活防風荆芥川
芎白芷細辛曼荆子薄荷躑躅花各一錢熟石膏風化
硝黃連青黛各三錢鷺不食草五錢研含水吹鼻。又
內外障瞤藥麻黃根一兩當歸一錢爲粗末炒黑入乳
香麝香各少許含水吹之三方可併用發散去盡濁涕
淚出爲度前傷寒頭痛註有鷺不食草方可參。○遠年

琴明髮障五蛇散指甲一分炮山甲蟬蛻各五釐蛇蛻
分半情退雞蛋殼白皮二分人乳炒研每用三釐含水
吹不患一邊鼻一方吹後再以錫作眼鏡合之三次血
絲翳障皆落或加鷺不食草猬皮炒各三分吉更四分
麝三釐。又川芎白芷防風荆芥羌活細辛稿本白菊
花石菖蒲天麻蔓荊子瓜蒂赤小豆漢防己兔絲子穀
精草常歸川鬱金熟石膏乳香沒藥雄黃黃連大硝蛇
蛻炒焦蟬蛻炒焦山甲炮哺退雞殼煨腦荷各五分水
片麝香各五洗連緣凡時氣赤眼白外而入非臟腑病
釐如前吹鼻洗連緣者不必服藥熏洗足矣黃連川芎
荊穗各一錢半曼荊子去膜一錢五倍三錢分三服絹
包煎入瓶內紙糊口挖孔眼對之俟溫并洗風火眼
神方當歸防風杏仁各一錢銅綠枯礬各五分煎露一
宿棉團蘸洗一加荊芥樸硝各一錢一加荊芥赤芍川
連各一錢飲食傷或便秘加大黃風火爛弦眼荊穗
防風各五錢苦參四錢黃連五倍川芎當歸各一錢銅
綠五分薄荷湯丸熱水化洗可以預合施濟又赤眼
黃連皮硝膽礬歸尾桃仁紅花各一錢煎黑帕罩洗
凡眼病皆血脈凝滯為患黃連當歸赤芍煎洗血得熱
則行也雪水煎丸妙。眼癢蟬蛻菊花煎洗治努肉菌

毒一切目疾川連杏仁各一錢歸尾赤芍地膚子菖蒲
各二錢羌活五分白礬三分煎洗按諸方藥料併爲
一方用黃連爲君八錢薄荷七錢皮硝六錢芍歸荆防
五倍子各五錢餘則三二錢膠水爲丸熱湯化洗治風
火眼甚驗。綠丸子卽神仙碧霞丹治內障當歸沒藥
各二錢血竭白丁香礬砂各一錢牙硝乳香各五分研
黃連三錢熬膏和前藥爲丸銅絲二兩衣新汲水浸一
丸可洗數日丸如芡實大或加水磨各少許又方通
治內外障用蘆甘石製黃丹炒各一兩銅綠入錢海螵
蛸五錢歸尾沒藥血竭白丁香礬砂牙硝乳香青鹽輕
粉雄黃元明粉礬砂明礬硃砂各一錢熊膽一分冰片
三分麝一分共研細末用黃連一兩同川芎當歸赤芍
生地柴胡龍膽草蕤仁杏仁蟬蛻菊花黃柏五倍羌活
防風木賊草各三錢熬膏槐柳桑枝各五錢攪令條盡
爲度去渣入蜜和前藥爲丸蜜不足加阿膠五錢煎湯
和藥臨用熱水化洗甚妙亦名碧霞丹此方兼紫金膏
陰陽丹諸法無熊膽以羊膽或膽星一錢代用。老
眼桑皮皮硝煎洗或加黑豆紅棗菊花妙紅棗納銅綠
明礬煨塗丹硃赤眼腫痛黃丹白蜜塗太陽或用土硃
用亦妙塗丹硃石膏水片塗二方亦可併用又薄荷防

風荆芥煎湯沃之以山漆磨汁調塗四畔或用生薑汁調枯礬末抹紙上閉目合眼胞一時如紅赤爛弦用川椒入猪油熬枯以銅綠五錢研如膏敷眼胞均可參○附方○摩風膏黃連細辛當歸杏仁防風白芷松香黃蜡小磨麻油熬塗太陽○軟腫膏貳粉少許黃蜡代赭石研各五錢細磁末黃栢末各一兩麻油熬塗腫處○清涼散血膏治赤腫不能開睛痛熱淚如雨紫荆皮大黃黃連黃栢薑黃當歸赤芍白芷羌活防風細辛南星薄荷五倍蓉葉赤豆花粉菖蒲各五錢共研末以生地二兩浸水絞汁調藥敷眼胞四圍并治撞打眼腫及外症一切熱毒一方加土硃石膏各五錢米片三分無土硃用黃丹按諸藥研末加牛膠化水和生地汁爲錠臨用或非水或雞蛋清磨用尤便○眼暗肝虛也柴胡決明子研末人乳調敷目上久久目視五色○眼見黑花或黃白不定肝腎虛風上攻也附子炮廣木香末各一兩青鹽兩半牛酥二兩鷲油四兩硃砂二錢冰片一分熬膏塗頂上○按赤絲亂脉有鯁膽一枚黃連五分調飯上蒸透入蜜塗敷目眥者凡肝膽皆治目此方可以通用如羊膽入蜜青魚膽和蜜亦佳○虛眼黃連五錢穀精草一兩羊肝去筋膜二兩蒸同搗丸陰乾磨

敷或加夜明砂蟬蛻木賊各一錢當粉搓針煮玉飴
歸二錢末搗丸東垣有圓明膏
海螵蛸蛤粉各一分冰片五釐黃蜡八分搓丸麻子大
帶圖式臨卧納眼皆次日照水自落亦名照水丸一方
去蛤粉加硃砂用同○七鍼丹眼藥能除久昏白菊花
川花椒各三錢膽礬三錢五分青礬銅綠各二錢五分
烏梅一個去核新綉花鍼七枚將藥研細末水調同鍼
入磁瓶內封浸七日隔水煮六個時辰鍼化為度去渣
取水點此方奇效眼方甚多二方錄其新別者○按
點藥黃連為主火眼同雞蛋清攪如水點虛眼同人乳
點又百病在眼者黃連人乳少加丁香煎注尤得苦降
辛散養陰之妙陽症去丁香加樸硝血虛加當歸氣虛
加黨參皆可火眼熱脹痛以人乳調黃連末塗碗底
點艾於地覆碗熏之以焦黑為度飯上蒸過清水調隔
紙透出黃水取點又黃連人乳同裝仁熬點少加炮
薑炭名乳汁煎治冷淚者其用炮薑炭甚妙可佐黃連
之寒眼翳指甲磨人乳點或象牙磨人乳點小兒
用胡黃連人乳敷足心又雀目白犬乳點或鷹眼或臘
月鵲鴿眼灸研人乳調點並良○老眼翳仁同蜜熬點
女貞子熬點龍膽草熬點亦可加藥用○明眸膏蒼朮
里翕并文

柴胡龍膽草苦參元參生地赤芍歸尾川芎荊芥防風
麻黃白芷細辛薄荷大黃芫花硝黃連黃芩黃柏黑山梔
羌活子五倍子決明子草麻子羌活連翹蓉葉陳膽星
木鼈仁杏仁桃仁蛇蛻蟬蛻木賊草山甲片菖蒲紅花
乳香沒藥各一兩羚羊角入錢犀角片二錢丁香一錢
先用槐柳桃桑枝枸杞根竹葉菊葉各半斤生薑一兩
麻油熬去渣入藥再熬成膏黃丹收石膏黃蠟松香各
四兩羊膽二個攪勻糝冰片貼太陽井通治風熱症。
附方。暑月行路眼昏薄荷葉揉汁滴赤腫童便洗
雞蛋煮熟合眼胞豆腐亦可或生薑片貼四圍加瓦松
搗敷亦可。眼起星胡椒菲菜薺菜根橘葉菊葉鷺不
食草不拘一味塞鼻皆可又方丁香黑棗塞不患一邊
鼻星斗上時去之。爛眼蠶砂麻油浸塗黃連煎汁以
甘石收敷海螵蛸入冰片和敷。血灌瞳神熊膽點真
珠水晶琥珀牙硝各五錢硃砂一兩冰片一分研點。
迎風流淚甘石海螵蛸冰片點如冷淚香附蒼木椒目
麝吹鼻或用前連乳麝薑方。拳毛倒睫鰓膽點或木
鼈仁研棉裹塞不患邊鼻或五倍末蜜調敷眼胞自起
或薑黃土硃麝香烏金紙灰吹鼻或草烏南星乾薑桂
枝塗足心皆忌摘摘之復起更硬此症有服補中益氣

者亦有用乾蒼蠅研嗅蝨子血蘸點者醫法無窮學者
須擴其眼界每謂外治中多奇方可悟格致之理通人
當以爲然。蟹睛鱈魚血曬乾蘸點。眼漏流膿閉目
熱牛糞敷胞上或柿餅搗塗。努肉杏仁去皮尖自己
生嚼點雄麻雀屎男孩乳調點努肉赤白膜蛇蛻麻油
炒勿焦人乳調點努肉急起遮眼鐵綉磨水滴努自開
切忌割。偷針生地南星搗貼蛇蛻皮貼猪精肉貼白
芡磨水點。痰核生於眼胞推之移動皮色如常硬腫
不痛醋磨南星敷或指甲擠出白粉即愈。珠菌堅凝
不痛黃丹和鯉魚膽熬膏點或醋磨櫻桃核搽亦治痰
核。眼蘇銅綠膽礬塗或加明雄塗碗上以牙皂荆芥
薄荷艾葉捲紙燃點熏升黃色搽。打傷眼睛用前散
血膏敷四圍眼突出者猪肉摻當歸赤石脂末貼。損
目破睛牛口涎日點黑睛破者亦効。飛絲入目磨濃
墨塗泥沙入目嚼牛膝搓九塞之淚裏砂出左眼右嚼
右眼左嚼石灰入目生梔子煎濃汁頻洗烟矢入目亂
髮揉箭頭入目米糖點入待其發癢一拔即出。小兒
跌損瞳神不正石楠葉一兩甜瓜蒂七個藜蘆三分末
吹鼻日三。按人之五官最要耳聾眼瞎即不可以成
人至唇齒喉舌尤爲飲食所關生之本也雖曰外形而

內心存焉矣其症最多而其治最難故文耳司平聽

其閉也耳腎竅腎和則聞五音肺貫耳亦聰聲若勞傷

虛有火耳聾新聾多熱散風熱開痰鬱舊聾多虛滋

補兼通竅左聾忿怒動肝火多婦人宜當歸龍薈丸

藥料右聾色慾動相火多男子宜六味地黃丸藥料左

右聾醇酒厚味動胃火宜防風通聖散藥料凡耳病用

膏倣此傷寒耳聾及因病耳聾非尋常可比經摩其

日精脫又仲景曰陽氣虛又或將發斑不可不審

兩輪此脩養法亦燻艾麝暴聾屬氣閉艾末一兩加磁

少許黃蜡融離紙上卷筒燒熏氣通後仍艾塞避風

又蒼木削下尖上平式插耳內艾燒之耳有熱氣為度

或用檳榔削尖挖孔納麝少許插耳內納杏冰通耳錠

艾燒全按耳聾屬風熱者用風熱膏納杏冰通耳錠

去油一個斑痧三個麝少許葱涎和捏為錠如麥形棉

裏塞耳中响如雷勿懼二十七日耳有膿水出去錠此

方太峻毒宜用下方治耳卒聾蒲黃細辛神麝各五錢

研杏仁七錢搗膏和捏為錠塞或加椒目冰片亦可

耳鳴而聾屬肝火者全蝎末酒調滴聞水聲效或同葱
涎搗塞痰火膽星研酒調裏塞腎虛削生烏頭塞或同
菖蒲棉裏塞或煨生地或搗熟地塞○久聾草麻仁二
十一個皂角肉半個地龍一條全蝎一個遠志肉磁石
末各三錢黃蜡溶棉裏塞一加雄黃白礬半生牛蝎抽
各五分麝二分葱白三個同搗塞面壁坐或熊膽滴抽
椒蠟腎虛耳聾巴仁川椒菖蒲等分研末加全蝎松香
蜡爲條如鹽蒸鐵磨之凡耳中熱痛蒸鹽令熱布包枕
上法亦可鹽蒸鐵磨之或磨刀鐵漿滴之又金絲荷
葉草汁滴鯉魚腦蒸熟滴鯉魚膽滴皆可又乾痛蛇蛻
燒灰麻油塗○附方耳出青黃白黑膿俱由胃濕與肝
火相兼而成惟紅膿屬風偏於肝經血熱○耳疳膿血
腫痛韭菜自然汁滴入又石榴皮加水片吹卽結痂龍
骨亦可或用海螵蛸水龍骨黃連枯礬雞哺退殼焙研
吹或雞子黃炒出油塗或用麥小粉陳醋熬如膏塗耳
外或胭脂明礬鐵銹糝○耳疳形如櫻桃或如羊奶耳
聾如初生蘑菇頭大蒂小耳挺形如棗核細條而長努
出耳外俱由肝腎胃三經火結微腫悶痛色紅皮皺觸
之痛引頭頂雄黃輕粉細砂各三錢冰片五釐研冰調

點凡耳病用塞法滴法不如塗耳外。耳內生粒即
耳定人指甲焙加冰片吹入耳中結塊蚬泥鍋底煤和猪油生研葱
加冰片吹愈。耳中結塊蚬泥鍋底煤和猪油生研葱
涎調棉裹塞。耳子即耳疔痛如椎刺牽引腮腦破流
血水蟾酥丸水調濃汁滴耳內并塗耳外或荔枝蝦蟆肝黃
油調塗耳外內疔自消或用拔疔法荔枝肉蝦蟆肝黃
丹同搗塗或用荔枝肉蠅牛爛雞矢黃丹同搗塗。諸
蟲入耳醋及菲葱薑汁香油雞冠血猪油牛乳隨灌
耳有物不出弓弦或麻繩打散塗膠唇齒相依喉舌是
入耳粘之。水銀入耳枕金器自出唇齒相依喉舌是
司唇者肉之本靈吻之外緣也實紅而虛白唇主脾
驗五臟之寒熱熱則紅甚寒則淡紅實則紅活虛則紅
白又紅赤內熱黃白氣血虛紫黑胃不足又風則紅
動寒則掀縮熱則乾裂血虛則無色氣鬱則瘡腫凡
唇口俱腫赤者熱極也唇口俱青黑者寒極也六腑
之華在唇潤以松毛橄仁唇燥舌松毛煮老豆腐
唇有病治脾潤以松毛橄仁唇燥舌松毛煮老豆腐
胭脂燥之粉綠連琴錢枯礬錢半宮粉三錢熬膏加水

麝敷。○附方人中腫大生蒲黃二錢黃連米片各一
錢麻油調塗口唇腫黑痛癢銅錢石上磨猪油搽之摘
荷瓣而止血出。○附方口唇緊小不能開合飲食名緊
唇蘭唇瀋唇黃栢二兩用五倍子蜜陀僧各二錢甘草
二分研末水調勻塗黃栢上烘乾再敷再烘藥盡為度
俟黃栢冷透切片貼此製黃栢貼法佳加青黛并治口
瘡一切又蘭唇白布作燈炷如指大安斧上燃燒令刃
上汗出拭取敷唇上日數次或青布灰和猪油敷更便
又方五倍子訶子肉等分香油敷又方亂髮蜂房蛇蛻
六畜毛蟾蜍燒灰猪油調搽又緊唇及重齙重齙蛇蛻
灰敷。○嘴唇翻轉形如猪嘴名唇菌此心脾熱毒也針
刺少商穴出血洩毒再用猪雞糞敷或破癰團敷或地
龍搗爛加吳莫灰熱醋調敷足心。○唇疔刺委中穴餘
照疔治。○唇瘡藍靛葉汁塗唇破生瘡瓦松生薑汁搗
融入鹽少許敷唇瘡四圍如黃蜡旋覆花椒麻油塗葵
花根焙研蘇油塗口角生瘡燕子窩研蘇油塗砂仁殼
焙研敷。○缺唇先上麻藥將雨邊皮微割破絲線縫好
以生蟹黃塗靜坐勿言笑七日收口亦有不必要割者一
用龍骨白蠟塗或用活蟹炙乾為末每取二錢加乳香

沒藥敷并可接舌。麻藥卽齒者骨之終髓之所養腎實主之故

川烏草烏末涼水調難貼

床也盛堅而衰豁

齒者骨之終髓之所養腎實主之故

齦屬胃喜寒惡熱下齦屬大腸喜熱惡寒

則宣露又虛者搖動不痛痛是風火蟲然腎虛相火上

炎亦痛又火有虛實虛火痛緩日輕夜重實火痛不可

忍風痛者痛而且腫甚至頭面皆腫呵風亦痛蟲痛發

時必在一處叫號不已亦有虛火只在一處者又寒痛

不腫不吐喜熱飲熱痛齒齦腫爛喜吸涼風又熱痛怕

冷水激冷痛怕熱水激風痛不怕冷熱。齒痛胃有濕

熱上出牙齦爲風寒飲冷所鬱作痛寒是標宜辛溫熱

是本宜辛涼有用涼更痛者宜從治。上牙痛腎經

虛熱宜細辛等下牙痛大腸虛熱有風宜白芷等補

以羊脰鼠脊固齒之法用羊脰骨燒灰同食鹽擦寒加

石膏之類或單加骨碎補炒黑擦或再加牛牙蝦擦均

可如齒落不生者加雄鼠脊骨蝦作末搗折處自生此

古方也。腎經犯風寒齒痛連腦者麻黃去節草薢皮

各一錢黃芩桂枝各二錢吳萸白芷各四分羌活八分

稿本三分當歸熟地各五分升麻一錢為末先用溫水嗽以藥擦之一加蝎梢少許全又風寒濕犯腦痛牙齒顛動搖欲脫柴胡五錢麻黃防風各三錢羊脰骨灰二錢羌活一錢半草薹皮一錢當歸六分蒼朮升麻各五分稿本白芷桂枝各三分細辛少許研擦此即前方以脛灰代著地等也如合兩方油熬丹收貼頂上及痛頻佳虛人發散風寒亦宜。附方。預免齒痛法白鹽四兩青鹽二兩花椒一錢煎汁炒鹽每早擦牙以溫水嗽後吐出洗眼可免牙疼眼痛一用槐柳桑枝汁煎鹽全。牙宣珍珠散龍骨煨二錢海螵蛸一錢珍珠三釐兒茶硃砂象牙乳香沒藥冰片各五分血虛齩齩加散白芷棉團蘸水蘸藥以指抵實之并治牙落血不止散之防辛椒芷。通治風火蟲牙防風細辛川椒白芷各等分擦勿嚥入口或加雞肫皮青鹽樟腦雄黃礞砂牙硝冰片數類。附方。虛火牙痛冬桑葉黑山梔煎嗽或仙靈脾煎嗽或核桃殼花椒鹽煎嗽或荔枝肉連殼燒灰研擦或元參桂元肉貼。又方無論虛實火蟲蛙黃連細辛生石膏一錢兒茶五分冰片一分虛加黨參蟲加樟腦擦按此方治胃有火者若胃寒者宜川椒丁香冰片。牙疼吹鼻散雄黃胡椒萆薢良薑

細辛乳香麝香等分男左女右吹鼻如牙痛臉腫用紙
捲藥香油點燎又是一法如治骨槽風陰症者用此甚
妙○牙疼塞耳丸川烏底草烏尖蜈蚣頭全蝎梢雄黃
川椒卷紙蘸醋炙乾塞兩耳又方雄黃一錢樸硝細辛
各三錢牙皂四錢大蒜二枚搗爛丸如豆大塞痛一邊
耳一丸可治數人如耳聾亦可用又方壁錢包胡椒末
塞痛一邊耳手掩枕之額微汗愈此方發汗法甚奇又
方冷痛大蒜巴豆棉裏塞耳○蟲痛雄黃藤油煎嗽或
五倍冷水數頰外或菲根川椒搗塗病頰蟲自出又方
靈胎五錢蟾蜍一錢黃丹三錢松香黃蜡爲丸塞蛀孔
內又蟲痛有菲菜剪蠟紙而固齦搖治牙齒動搖不牢
子熏法有取蟲法剪蠟紙而固齦搖而痛者黃蠟一兩
溶化入定粉龍骨末各五錢加麝香五分和勻候冷取
出熨斗燒熱鋪紙用藥攤之勻薄每剪紙條臨卧貼齒
斷間至早取出半月效按牙疼玉帶膏即照此方加
黃芩黃栢各五錢桃仁三錢熬刷連四紙剪貼一夜黑
色驗此與上柏片方皆取其貼法倣此可以用膏○
治牙痛及骨槽風口噤覺腮內熱者陽症也貼頰上亦
治一切風熱羌活防風麻黃荊芥穗薄荷升麻甘草
復黃芩連翹丹皮射干殭蠶茵陳大黃生地獨活川芎

白芷當歸赤芍乾葛黃連草薏仁各五錢細辛一兩黑
丑二兩麻油熬黃丹收石膏四兩攪。又骨槽風齒痛
不已齲內浮腫紫黑色而出血久則腐爛屬腎虛胃火
口疳藥加牛黃珍珠兒茶頻吹。又骨槽風有由風蟲
牙痛潰爛變成者地骨皮白芷細辛防風升麻川芎當
歸槐花藁本甘草各一錢生薑三片黑豆百粒煎熱嗽
冷吐并治各種牙疼此玉池散也。又方天麻防風草烏
畢發川芎細辛乳香礞砂薄荷麝香共末口含溫水嗽
鼻內吹之此乳香華發散也較上方為溫寒症宜之
又骨槽風牙骨及腮內疼痛不腫不紅痛連臉骨者卽
陰寒症宜溫散忌用涼藥者犀黃麝香乳香沒藥吹并
用蟻螂研末加乾薑末擦可出骨。透骨穿腮者南星
挖空入明雄麪裏煨加麝香掃。按骨槽風多口噤者
風也。穿牙疔先二日牙痛寒熱後痛更甚齲上發一
紫塊齲上肉皆紫黑者是用金針吹消腫出痰卽鎗確
入分生蒲黃四分殭蠶一錢牙皂錢半冰片一分也。
疳齲牙齲臭爛出膿水枯礬青黛胡黃連蘆薈梧桐淚
各二錢半蝦蟆灰五分麝二分半敷。凡牙痛大蒜泥
敷經渠穴週夜起一小泡挑破出黃水愈。口舌以辨味
穴在大指二指手背微窩處用蜆殼蓋扎。

心脾旺而舌病生

心脾脉繫舌而主口唇諸經皆會於

食則酸煩躁則澁虛則淡疸則甘勞鬱則苦寒勝則鹹宿

生瘡。心之本脉繫舌根脾脉連舌本散舌下主舌強

肝脉絡舌本腎脉挾舌本主舌乾腎之精液出於舌端

分布五藏心實主之三經爲四氣所中則舌卷不能言

七情氣鬱則舌腫不能語至于心熱則舌破生瘡肝壅

則出血如湧脾閉則舌胎如雪。臟腑積熱口舌生瘡

赤屬心白屬肺又口舌狀如無皮曰瘡口舌糜爛曰糜

不痛者難治無血出者不治。又大人小兒熱病後火

毒留胃致牙根黑爛甚則穿腮破唇名口疳有走馬疳

延爛至速鼻梁上發紅點及龍門牙落不治。凡心火

舌上生瘡或舌上燥裂或舌尖出血或舌硬宜用黃連

梔子生地麥冬當歸赤芍各五錢犀角薄荷生甘草減

半再加元參連翹吉梗各五錢升麻乾葛減半并治咽

喉牙齒耳面腫痛如用麻油熬黃丹鉛粉收加牛黃清

心丸一粒攪勻攤乃有剛子豆即巴敷頤巴霜黃連加硃

貼心口及患處佳。頤門可以拔毒凡舌病皆治如起泡溫水洗去更以葶

蒲水拭之巴豆性毒宜酌小兒嘴爛不能吮乳亦用此

或用巴豆入黃陀僧貼眉舌病南星陀僧連辛納臍黃

丹飯丸貼眉心寒一熱功成而無偏勝此配藥之法也按

細辛也口舌糜爛心脾蘊熱黃連乾薑末細辛水散加黃栢

黃芩梔子細辛末名赴筵散或用黃栢細辛或用黃連

細辛俱名赴筵散然皆忌入喉網目載納臍之法甚善

推之可以貼膏附方凡口破俱禁水嗽用辰砂滑石

冰片數或五倍一兩黃栢炙滑石飛各五錢數又凡

口舌瘡色紅而渴者屬熱用黃連一錢炮薑五分青黛

兒茶各八分加雞肫皮一錢按若色淡白斑細點不渴

者乃思慮多醒少睡血傷火動也不宜太涼以黃栢青

黛各五錢桂心一兩末按或黃連桂心末等分

普濟方云舌病按後須以小膏蓋蚬莢丁黃塗足之

之方能久留可以悟舌上貼膏之法蚬莢丁黃塗足之

法凡舌病用涼藥不効者中氣不足虛火上炎也宜理

中膏貼胸附子塗足又舌腐爛者生蚬吳萸醋和

飛麩塗足心并治咽痛又治大人小兒爛嘴凶極者大

黃三錢丁香十粒菜豆粉二錢用開水或醋調塗足心

亦治牙疳此即下治亦湯熏旋覆舌腫旋覆花煎湯熏

法也見毛本驗方

老

燒熏。附方。舌腫硬名木舌心脾壅熱也。茵硝百草霜滑石酒調塗。舌突腫大名痿舌。樸硝研綠礬煨敷。重舌卽小舌舌根下生形如舌而小口不能聲飲食不通心脾熱盛也。着上膠者名重膠。着齦上者名重齦。蒲黃摻之或用青黛散黃連黃栢各三錢青黛牙硝硃砂各六分雄黃礬砂蒲黃各三分冰片一分共末先用薄荷湯拭口再摻并治咽喉腫痛佳。或牙硝點之或黃栢末竹瀝點之。舌腫舌脹蒲黃乾薑敷并治虛熱重舌。舌長毒熱馬前子四兩黃連四錢煎浸再用硃砂冰片猪膽汁塗。舌縮生艾搗敷。按舌者心之外候心主血故熱毒甚而腫脹重舌木舌等皆以針刺出血而愈然不可輕試。舌菌初起如豆漸大如菌痛甚紅爛無皮朝輕暮重心脾熱毒也。塘雞矢和冰片點蒲黃末蓋或蛛絲纏忍痛自落血出用蒲黃或百草霜或五倍烏梅銅綠摻皆可止如不止危。舌瘡羊骨髓和鉛粉熬貼。按通用治心脾熱毒宜冰硼散卽硼砂元明粉各五錢漂硃砂六分冰片五分也。又收口八寶散卽珍珠牛黃冰片象牙枯礬銅綠銀硃輕粉枯鹽雞金金箔也。泔水洗淨敷或勿先紫藥之吹。肉法每薄荷三用哺雞殼煨功同八寶。

分配兒茶一分五釐製黃柏釐許醋煨龍骨二釐白芷
二釐半如腫痛白芷用三四釐甘草五釐珍珠五釐研
加水片三釐再研收治口碎口瘡皆妙初起腫熱多
加薄荷久病長肉多加兒茶珍珠龍骨喉症腐爛亦
用此長肉名紫藥如治走馬疳穿牙疔重舌口瘡小
兒胎毒口疳本方加牛黃倍珍珠各五釐多效疔瘡後口瘡
去黃柏龍骨加牛黃倍珍珠各五釐多效疔瘡後口瘡
非此不治按按萃萬應喉中散即此方加味用薄荷
七錢兒茶滴乳石五錢燈草灰青黛血竭生甘草生黃
栢三錢香白芷二錢犀牛黃辰砂米片珍珠各一錢治
喉痺纏喉風雙單乳蛾喉癰喉癰喉瘡陰虛咽痛效○
附方○口疳砂仁殼煨吹或紅毡灰甘草洗後敷或白螺螄殼煨
灰狗屎內骨煨灰米泔甘草水洗後敷或白螺螄殼煨
同兒茶水片吹諸疳皆妙○走馬疳紅礬如豆大納紅
藥內煨枯加冰片敷一加黃栢佳又東垣治牙疳用
信砒青黛輕粉各一錢麝香五分爲末香油攤紙上用
木槌槌實收起臨臥以漿水嗽淨藥紙剪封瘡口至曉
去之仍淨嗽勿嚥三次效按走馬疳非砒不可二方
一加黃栢一加青黛皆濟其烈其咽喉以發聲肺胃鬱
木槌槌紙法尤妙即用膏之法也

而喉患作

咽以嚥物通胃喉以納氣通肺嗇者咽之低處會厭管於咽喉上司開闔四者缺一不可

○咽喉症皆火病也君相二火經脈並繫咽喉君火勢

緩熱結爲痰爲腫相火勢速腫則爲痺痺者痛也閉也

痺甚則痰塞以死雖有數症之名輕重之異乃火之微

甚故也○又風寒包火者多古方起手只甘吉荆芥開

發升散及其火勢既盛則清劑方施熱結下焦而攻法

始用非得己也按清如勞子貝母薄荷及重再加元

參前胡銀花花粉僵蠶之屬陰虛火炎必用元參攻如

大黃芒硝之屬○又火有虛實實火因過食煎炒蘊毒

積熱所致其症煩渴便閉將發喉痺先三日必胸膈不

利脈弦而數宜先用重劑潤下去其積熱再用去風痰

解熱毒之藥清其上焦元氣虛者用蜜導法○虛火由

飲酒忿怒房事過度動胃肝腎火動痰上壅於咽喉

唇舌乾燥便澀心脈虛數腎脈微弱此水不勝火宜滋

陰降火○又有寒症如非時暴寒潛伏於少陰經越旬

日而始發名曰伏氣咽痛卽腎傷寒也法當辛散更

有少陰中寒之重症寒客下焦偏其無根失守之火發

揚於上遂致咽痛宜理中四逆湯藥料景岳所謂火虛

於下而格陽於上者宜熟地牛膝炙草澤瀉肉桂熟附

子治之是也。按經云：驟起非熱，緩起非寒。大抵喉症，頃刻而起，毫無別恙者，卽是虛火陰寒之症。又寒症，脈沉緩弱，小喉內皮肉淡白，或頭項如斗，大色白，無光，或赤而色黯，大便或瀉，或漉，小便清，白口不碎，不渴，身涼，或畏寒，或手足微厥，火症反是。又寒症，痛雖甚，至早少輕，喉雖腫，舌必不乾，痰雖多，必不黃，而成塊，可辨。○喉症有數名：喉蛾，亦名喉痺，屬風火紅腫，而有膿頭起，尖似乳生，喉間一邊爲單蛾，兩邊爲雙蛾。左肺病，右胃病，關上者輕，關下者重。雙蛾輕，單蛾重。又有連珠蛾，白星上下相連，乃酒色過度所致。朝發暮重，虛症也。難治。○纏喉風，如咽，喉腫痛，脹塞，發寒發熱，外有紅絲纏繞，且癢，且麻，愈腫愈大者，此外纏喉風也。屬風火如惡寒惡熱，內外無形，出氣短促，胸前紅腫，兩足畏寒，乃腎經有熱，水枯不能上潤，名內纏喉風。無論內外纏胸，前育紅絲挑去爲要。以皂角桐油攪喉，出涎無桐油，以燈盞油代如纏喉風驟然而起，舌白不腫，外無紅絲纏繞，喉內痛不可忍，亦無形狀者，更兼口不渴，大便溲，卽是陰毒。切忌用涼。○鎖喉者，一云喉間無蛾，微有紫紅色纏繞，一云喉旁兩塊大如雞卵。二說不同。大約亦卽乳蛾纏喉二症之輕者耳。用杜牛膝汁和醋數喉，外再

攬喉中出涎如雨三日前氣急短促手足厥冷忽然痰壅氣閉命懸頃刻此名急鎖喉風亦名喉閉宜用蘇子前胡等化痰降氣切勿忌牛黃吹藥入口不效。喉風有硬舌根而爛兩旁者名纏舌喉風甘吉湯吹冰片散吹又者脚跟先一日紅腫疼痛而後移於喉者名脚跟喉風善化痰解毒若移為心痛不治又有星發暴腫轉腫轉大者名飛瘍亦名走馬喉痺急以太乙紫雪膏間作痛爛頸甚者名熱出血鹽湯洗冰片散吹又有喉間作痛爛不收口者名爛喉痧土茯苓煎嗽紫蘇薄荷煎敷上爛喉痧藥詳見後。又喉痺日久頻服清降藥致痰壅塞聲如曳鋸名肺絕喉痺宜四君藥料救之。凡喉症先寒熱後見形者重先見形後寒熱者輕寒熱多者其症必重若一發寒熱夜間便起者凶。喉症多日輕夜重喉症耳聾耳痛頭痛微發寒熱者輕若傳變於手臂肩背痛者吉如頭重難舉不知痛痒或胸脇痛寒熱大作無休歇者凶若傳為心痛者不治。又喉症聲如雷鳴或如拽鋸或喜坐低處或痰多不能吐出或全無痰者或痰吐升斗者皆難治。喉症忌發汗以砭刺出血為汗無論風火時邪喉蛾喉癰及生珠小瘤皆用三棱針刺少商穴出血并刺委中穴以洩毒氣喉閉刺十

宣穴皆是火鬱發之之義又急症并刺患處出血惟陰虛之火及腎傷寒帝鍾風不可刺內傷虛損咽痛失音者誤鍼不救又關上血泡可鍼關下不見者令病人含水一口以蘆管尖刺鼻孔出血或磁鋒刺鼻準尖出血又男從鼻樑尋至頂女從腦後尋至頂小兒看虎口有血泡挑破之單蛾單點雙蛾雙點忌見火均可灸○喉症宜吐痰然虛寒亦能作痰此痰乃精液不可去宜以法通喉○喉症使閉者宜通大便然四五日後不飲食人虛者亦慎下○凡時行喉症惡寒者寒閉於外熱鬱於內也不可輕用膽礬酸物點者恐陽鬱不得伸也寒涼即陰虛用滋陰藥亦忌純涼蓋上熱未除中寒復生致毒乘胸高腫上喘下泄為難救也○喉症殺人最速故詳註之然猶未備是有專書宜究又喉症以吹藥為主然亦易誤故文中所載皆外乃有商陸掩頂大凡治而吹藥只作帶筆識者察之有風熱則咽喉腫痛商陸沈陰下行用酒煎塗於頂上或用商陸根炙熱熨頂并頸或用生薑將頭頂髮擦紅

即巴麝寧鼻

開關破蛾巴霜麝香為丸棉裹塞鼻○又陸方喉痺乳蛾巴霜薄荷細干冰片等分

裏塞鼻一時頭頂冰涼喉卽開并治喉痺生瘡潰爛水
漿不入者愈後鼻瘡並無害。巴仁人蒜同搗塞耳
鼻并治牙痛。孫真人紅棗丹治喉風喉痺雙單乳蛾
等症用巴豆霜杜蟾酥當門麝冰片各一錢山荳根五
分礪砂老薑粉各三分以紅棗去蒂裝藥塞鼻卽閉口
目避風噫出膿血後銀花甘草煎濃湯漱之治喉蛾塞
蛾一邊喉風男左女右周時方可拔出早
則誤事虛火症及陰毒皆忌慎勿冒昧
喉風皂角細辛冰片取噫乳蛾白破再用皂角末醋調
封項下腫消蛾破或加膽礬蠶并可吐痰或用牙皂
草烏尖蟾蜍點蛾亦破。大蒜搗擦頸蛾白破或用前
牙痛大蒜數經渠穴方亦佳。爛喉症生細辛二錢生
附尖生南星生半夏各一錢末蒜泥一盞將藥十分之
九拌勻布攤貼於喉外面左右換貼以痛爲度餘藥捲
紙爲筒鼻嗅之見杭州張氏刻送本。附治喉症方。
實火症大黃芒硝雄黃末以濕紙裏塞鼻凡杜牛膝
山荳根黃栢末牡蠣粉萊豆粉均可用雞子清和蜜調
塗項又喉症開關生津薄荷五錢礪砂一錢半雄黃
三錢兒茶二錢冰片五分以井水或蜜調塗頸上如口
舌瘡牙疳亦可治按喉症清火消痰用內藥卽薄荷

六錢研青黛六分燈草灰七分百草霜三分冰片四分
甘草末一錢也喉症開關破腫用黃藥卽牙硝六錢蒲
黃四錢雄黃三錢硃砂少許也破爛者勿川又喉風痰壅口噤
生瘰一錢硃砂少許也破爛者勿川又喉風痰壅口噤
者用金鎖匙卽硃砂五錢牙硝錢半雄黃二錢僵蠶一
錢冰片五分也加枯礬劈砂卽紅藥方破爛者勿用
凡喉蛾纏喉鎖喉喉閉喉癰以青藥爲主黃藥爲使輕
症青多黃少重症黃多青少喉症凶極以黃藥爲主腐
爛者以紫藥爲主再加清熱解毒便祕者用大黃石膏
金底抽薪法如風寒閉者勿用明礬虛寒症勿用青黛
牙硝此其大略也古方多用吹然可以塗頸法代之便
祕者用敷胸及導法亦効。凡喉蛾壅塞雄黃燒酒和
燕窩泥臨臥塗頸上自破。喉風開關蜈蚣焙全蝎僵
蠶膽礬蟬蛻山甲蟾蜍川烏尖草烏尖乳香末葱菲汁
調敷喉外或元明粉薑汁調敷喉外破者勿用。實火
喉痺紫金錠塗頸梅花點舌丹塗頸并治喉爛者。虛
火喉痺遠志肉末或白芥子末醋塗頸或烏星附子扎
用醋化牛膠黃丹收攤貼頸上亦可加藥。烏星附子扎
脚之法。古云喉藥忌全寒宜炮薑附子從治或用黨參
白朮羌活荆芥防風薄荷赤苓吉梗甘草炮薑

無不愈者。一、去薄荷加元參升麻附子同。又虛火上升，喉痛喉閉，喉瘡有用元參、白芍、熟地、當歸、川芎、黃柏、知母、天花粉、吉梗、荊芥、甘草、加竹瀝者。二、方俱以外塗為穩。再用生草烏、生南星、末醋敷足心，妙。又如喉痺喉風，勺水不下，生附子、吳萸、醋敷足心，微火烘，即寬。更烟吸蛇床附子一個，故紙五錢，煎足心，微火烘，即寬。冬月喉痺腫痛，不能下藥，蛇床子、燒烟、置壺中，口鼻吸之，出涎為吉。又腎傷寒及帝鍾風腫者，亦用此熏。忌針刺。附方：喉痺欲死，乾漆、燒烟、熏吸，或僵蠶、乳香、燒烟、熏鼻。喉蛾、家麻皮、七節、燒烟、吸。尸咽症，喉中痛痒，語聲不出，乃尸蟲蝕喉也。麻黃以青布裹，燒烟於母祇筒熏之。喉症有油胭脂、水磨研擦耳背，法存參。白散之糝：白散一名尿白散，即人中白也。喉症爛者，人中白、米片吹。又人中白、薄荷、珊瑚砂、銅綠各五錢，蒲黃炒甘草炙三錢，元明粉、黃柏炙、黃連炒，明雄青、黛各二錢，雞肫皮、椒冰片各一錢，吹治咽痛臭爛。牙疳口瘡等毒，加牛黃、熊胆、珍珠各一錢，兒茶八分，麝一分，尤妙。又方：人中白、椒青、果核、椒雞、哺退殼、椒兒茶、水片各等分，研吹，通治喉痺喉癰喉癰喉癰雙單蛾口疳等見陸方。附方：喉閉喉癰七寶散、山豆根、牙硝、膽礬。

白礬雞肫皮辰砂冰片等分吹亦治懸癰下垂又七寶散雄黃硃砂殭蠶全蠍明礬膽礬牙皂各一錢治全按二方併用力尤大。統治三十六般喉症青果核灰薄荷各二錢明雄錢八分冰片三分二釐青黛四分加兒茶硼砂亦可。喉症急切無藥白麪和醋敷喉外喉蛾指甲灰吹小舌落下燒鹽枯礬以筋頭點之可消皆簡便方也。喉癰體虛多鬱所致狀如秋海棠喉中不閉不腫氣出如常微微疼痛飲食不遂者是此係虛火淹纏難愈忌刺畏補久則失音成癆矣用橄欖核灰兒茶哺退小雞殼煨各三錢加冰片吹能定痛此即前陸方去人中白。咽喉生瘡胃脘實熱熏炙上焦發爲白頭赤根或屬虛火上行無制則痛或楊梅天泡瘡多服輕粉毒氣流注所致當分別治凡咽瘡忌生薑辛辣喉瘡并聲啞硼砂二錢兒茶青黛滑石寒水石各一錢蒲黃枯礬各六分黃連黃柏製各五分加冰片吹或用蜜調敷喉外同醫鑑加牙硝六分方外人傳按喉啞有肺熱者有寒包火者宜酌治。敬信錄載爛喉痧急救驗方牛黃指甲灰男女互用各五釐青黛六分壁喜窠二十個要墻頭上者焙黃冰片二釐藥珠三分象牙屑三分焙黃共研末吹又醫鑑方壁錢燒存枯礬髮灰

又爛喉紅棗散紅棗肉四兩燒枯銅綠二
分煨枯礬二分犀黃麝香冰片各一分吹
子梗煨一兩明礬三錢冰片五分吹。婦人經水不調
壅塞經絡亦令喉腫宜通經。又有梅核氣喉中如有
物吞不人吐不出氣鬱痰結也婦人爲多紫蘇厚樸半
夏赤苓蒼米枳實陳皮南星香附砂仁神麴青皮梔子
檳榔益智仁黃連生薑各一錢杏仁搗丸擦。西醫肺
病證論喉痛用熱茶一壺口含壺口呼吸之令熱氣蒸
騰於喉使喉溫潤外用布巾浸熱絞按喉上或用熱油
或華蔞油醋水搓擦貼白芥子末或貼斑毛黃蜡猪油
膏引病外出。又肺病炎症螞蟥置竹筒內按患處吮
血更用斑毛膏貼腿肚或用白芥子末敷腿肚引病下
行。此皆法也臨症可酌用中國體氣情性與。審陽經
外國迥不相同有宜彼而不宜此者須知。於頸項
於頸項前日頸後曰項屬太陽膀胱經。缺盆之中任
皆奇經脉也名天突項中央督脉名風府。任脉督脉
身急活鼠去臍貼。秋氣於肩背。經曰西風生於秋病
氣者病在肩背。肩背痛不可回顧。又背痛多作勞所致。方見後

中府之地

中府肺穴

華蓋自懸上接喉

喉

下覆

胃

中府

呼逆則咳喘

有痰無聲曰嗽屬脾濕有聲無痰曰喘

頗吐呼吸不接

咳嗽者

有外感有內傷總由火剋肺金

最重秋是濕熱傳肺冬是風寒外束

肺不傷不咳脾

不傷不久咳腎不傷火不熾咳不甚

新嗽肺有實邪

久病屬虛屬鬱傷風以有嗽為輕邪

在皮毛未及臟

肺也癆瘵以有嗽為重五臟受傷上干於肺也

咳分

十三經春夏多虛秋冬多實

又早

辰上半日多實火午後黃昏多虛火

冷吸欬冬之花

凡久咳冬咳風入肺竅者宜熏用欬冬花末燒烟以筒吸之或置瓶中吸。不論新久晝夜無時欬冬花同佛耳草熟地燒吸名三奇散用熟地是一法一無熟地有雄黃鷲管石佛耳草即杭之棉細頭作烏飯糕者或用鬱金。又欬冬木鱉仁或欬冬雄黃艾葉各一兩共研末黃蜡融難紙上卷筒燒烟吸并治水腫喘促者又熏黃同蠟難紙如上燒吸取吐或難清刷紙全熱食白粥七口後以羊肉羹補之吐亦是治嗽一法熱

塗燈籠之草

燈籠草一名酸漿治熱咳水調塗喉外如咽痛用醋調塗凡嗽藥皆可以此法推

擦髮油宮粉於胸

治咳嗽不止并脹滿痰喘者亂髮香

火嗽久嗽乾嗽食積嗽酒嗽用青黛瓜蒌貝母研末和白蜜爲丸擦甚佳。乾咳嗽火鬱也薑汁和蜜擦背佳

卽用逍遙散繼燥癢更吹礪石

肺燥喉癢者用款冬花

吹喉內或用蜜調藥塗於喉外

止嗽臍填粟殼

久嗽不止驚栗殼末

咳

用骨脂

咳從臍下起者宜用破故紙末糝膏貼納氣歸

黃去根節杏仁去皮尖桂枝蘇葉陳皮薄荷桑白皮大

腹皮甘草桔梗欬冬荆芥炒百部炒白前炒半夏貝母

知母南星各一兩柴胡黃芩枳殼葶藶均炒天冬麥冬

旋覆花馬兜鈴各五錢五味子烏梅木香皂角乾薑各四錢川椒輕粉各三錢麻油熬黃丹收牛膠一兩攪勻

肺貼此方亦可加入七寶五子膏用熱油在缺盆穴搓擦亦能止癢免咳又久咳者常令身暖則脫胸前用布

巾蘸熱水洗按避冷風吹襲。凡治咳嗽哮喘者

大取天突肺俞膻中氣海等膏藥貼法照此哮喘者

哮喘有食哮喘水哮喘風痰哮喘年久哮喘之別古上專痰後謂寒

包熱治須表散以行氣化痰為主忌寒藥閉邪熱藥升

火喘有氣喘痰喘火喘水氣逆行乘肺喘肺脹喘食

喘忌斂瀟升補燥濕酸鹹之品宜散邪清火祛痰潤肺

若短氣溫以麻黃白果哮喘用白果麻黃搗塞鼻按

宜補氣溫以麻黃白果哮喘用白果麻黃搗塞鼻按

苑三錢南星半夏桔梗川貝細辛杏仁甘草各五涼以

錢生薑一兩如以麻油熬黃丹收阿膠一錢攪良

蕎麥雞清治哮喘痰稠便鞭屬實摩芥芷輕粉於背治

喘咳嗽及痰結胸白鳳仙花根葉熬濃汁擦背上極熱

再用白芥子三兩白芷輕粉三錢蜜調作餅貼背心第

三骨節雖熱痛勿揭正是拔動病根不論寒熱虛實鹽

齒哮喘並治數餅除根又痰實氣喘者用紫蘇子白芥

子蘿蔔子寒熱且薄桃羌肺熱喘急寒熱往來桃皮羌

炒熨亦良

治水氣乘肺而喘者。又痛如定喘鼻塞巴霜巴霜薑

打羌花黃菊薊獨花布包蒸熨

理渝駢文

論

橘皮裏塞 又痰喘上氣者生 哮須紅信 冷哮宜用紅

南星或白芥子薑汁調敷足心 按古方治遠年近日哮喘

阿膠膏貼或哮喘膏亦可 痰嗽有用蟬蛻去足輕粉馬兜鈴各一兩生薑脂生雄

黃杏仁生砒各五錢淡豆豉四十九粒以生薑葶藶自

然汁丸如黃豆大亦可以薑汁化一丸臨臥擦胸○西

法喘者用紙入硝水中浸濕晒乾置盆內燃點乘烟燄

熏騰時吸其養氣入肺或用醉仙桃葉晒乾置烟筒中

吸之又法用熱油搓擦胸膈 嘔吐辨有物有聲 嘔屬陽

此與前治嗽之法相參 俱病聲物俱出生薑主之吐屬太陽血病有物無聲橘

紅主之嗽屬少陽氣病有聲無物半夏主之三者皆脾

虛病或寒客胃或傷食或有痰嘔重吐輕 食久乃吐

手足冷胃寒宜丁香砂仁食已即吐手足心熱胃熱宜

黃連梔子又渴而吐黃水者熱不渴而吐清水者寒又

脇痛者停飲腹脹者食積○惡心無聲物由痰凝胃脘

或濕熱鬱遏膈中○乾嘔只有聲或厥冷吐 或絞竹茹

涎乃胃家氣血虛乾嘔聲輕噦逆之聲濁惡 或絞竹茹

薑汁 治嘔吐面赤手足心熱者以 或搵酒藥蔥椒 凡嘔

薑汁 竹茹生薑絞汁棉浸擦胸口 或搵酒藥蔥椒 吐噎

薑汁 竹茹生薑絞汁棉浸擦胸口 或搵酒藥蔥椒 吐噎

膈反胃各方可以通用 酒藥胡椒熬白 見物即吐屬
 炒無熱酒炒貼心窩○又有分經治法 見物即吐屬
 胃經米炒加酒藥貼○嘔吐清水屬胆經蜡樹根瓦上霜路旁
 艾葉茶炒貼○嘔吐清水屬胆經蜡樹根瓦上霜路旁
 茅草皂角灰茶炒貼無前二味以胆經藥代之○欲嘔
 而不嘔屬小腸經燕子窩樟樹皮搗有熱茶炒無熱酒
 炒貼如小便不利楓樹漿熬膏糝皂角末貼臍眼再用
 燈火燒喉下三次○口吐白沫欲嘔而不出者屬膀胱
 經刺藺胡椒艾葉皂角灰研清油炒貼○欲嘔而不嘔
 而發紅眼流淚屬三焦經桑根皮茶葉四季葱搗炒貼
 如二便不通加皂角灰黃糖水調貼臍○不嘔不瀉如
 乾霍亂者二酒糟皂角灰同炒貼并刺中指出血 凡
 病皆須分經用藥 利之以楓皂 見鎮以金石土硃 金沸
 錄此以為規例 氣消痰代豬石重鎮虛逆加土硃等分醋調末塗胸口
 治嘔吐并治噎氣痞氣及哮喘有聲者○附方○陰症
 乾嘔冷涎作吐用吳萸生薑大棗噎膈分無水無火 症
 煎熨○胃寒吐水者用前和胃膏 噎膈分無水無火 症
 食不能入是無水也食入反出是無火也治宜以安胃
 為本○按噎塞脾虛病反胃胃虛病皆在膈間受病故

統名膈 上焦吐者氣食則暴吐口渴噎塞是也中焦

吐者積食下良久吐出或先痛而吐病在中焦下焦吐

者寒酸臭不化或朝食暮吐暮食朝吐尿清便閉即反

胃病皆氣血虛胃冷胃槁而成又有翻胃病食入即

翻而出或痰或熱阻塞膈間非如反胃朝暮有定候也

一云反胃是腎虛非胃寒翻胃亦是腎虛非胃熱亦

通 又按膈分氣膈食膈酒膈痰膈蟲膈惟氣膈及老

人膈難治又糞如羊屎者不治大腸無血故也口吐白

沫者亦不治氣血俱憊故也 血虛宜潤火 或煮附子

衰宜補有肝旺脾弱似膈非膈者平肝補脾 而搓

塗膈神方用牛口涎狗涎童便煮大附子一個先

能開闕以鹽塗牛口即或烹雄雞而吸雄雞破洗置

有涎吊狗一脚亦有涎出 飯上蒸熟戮孔以筆管插入含吸之俟熱氣沖入喉自

開 按附子補火雞溫中皆治胃冷○開膈膏黨參白

木蒼木黃薤荻荅甘草生地熟地當歸白芍川芎天冬

麥冬黃連同吳萸炒黃柏知母貝母青皮陳皮半夏膽

山杏檳榔木通蘇子草蔻仁砂仁木香丁香藿香乳香

大黃巴豆黑丑莪木三棱草烏官桂雄黃明礬鬱金牙
皂各五錢生薑二兩烏梅七個鳳仙子一錢油丹熬貼
○開關丹膽星一個瓦楞子錢半生礬枯礬雄黃牛黃
琥珀乳香沒藥珍珠白降丹各五分白矾用人糞黃泥
固煨取五分麝香一分以青魚膽丸如芥導之以油簍
子大糝膏貼○此症非善調攝難免復發
膈症便閉者可通大便如大黃等可暫用以治標鑑方
用瓜蒌根浸麻油導更穩○按經曰三陽結謂之膈註
云小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不能便膀胱熱結
則津液涸三陽熱結脈必洪數有力前後閉塞下既不
通必反而上行所以噎食不下縱下復出乃陽火上行
而不下降也據此則瓜蒌導法甚妙非只穩也○附通
大便秘方大黃元明粉生地當歸枳實各一兩厚樸陳皮
木香檳榔桃仁紅花各五錢麻油熬黃丹收貼臍氣虛
加黨參潤以牛羊人乳按胃槁津枯者宜用此潤之或
五錢亦治標不治本之藥如以此哕非咳逆之謂哕卽哕忒
蒸阿膠調人養血膏貼亦可
火鬱痰阻食滯血瘀水氣之分皆屬實有中氣大虧者
又有胃虛陰火上沖者皆屬虛哕在中焦穀氣不運

其聲短小得食即發呃在下焦真氣不足其聲長大不
食亦然凡呃半時一聲者虛又脾敗而發連聲不止
收氣不同者危○虛寒呃麻黃酒煎嗅或燒麻黃烟嗅
或羌活附子茴香木香乾薑鹽布包烘熱熨之如陰火
上沖者用龜板熟地各四兩黃柏知母各二兩汕丹熬
貼臍下即介以潛陽法也尋常氣逆取噫即止久病
薑汁白糟豈虛煩是云火宜清火化痰由思慮傷心者
蜜擦背糟豈虛煩是云火宜清火化痰由思慮傷心者
宜清火養血與鬱為積聚之本五鬱者木達之火發之
虛煩症不同鬱為積聚之本五鬱者木達之火發之
是也古方如小柴胡達木升葛發火三承氣奪土景嵩
崖有辨宜詳看○六鬱相因以氣為主氣鬱胸滿脇痛
濕鬱周身關節走痛首如物蒙足重遇陰寒便發熱鬱
目蒙口乾舌燥小便赤濁痰鬱胸滿動則喘急起卧怠
惰血鬱四肢無力能食小便淋大便秘紅食鬱噫酸惡食
黃疸鼓脹痞塊不言風寒者鬱則為熱故也○鬱為積
聚疰癖癥瘕之本積屬五藏陰也有形發痛有常處
肝積在左脇名肥氣脇痛痠瘥心積起臍上名伏梁心
煩脾積在右脇名息賁咳喘肺癰腎積起小腹上至心名
肺積在右脇名息賁咳喘肺癰腎積起小腹上至心名

奔豚喘逆骨痠最難治諸積禁吐下徒損真氣聚
六腑陽也無形發痛無常處痞與癰胸膈間病症積
聚肚腹內疾多見男子瘕瘕獨見臍下婦人常有皆因
痰飲食積死血而成其實一也在右食積左血積中痰
飲○凡婦人有塊多屬死血○大概治鬱忌酸斂泥滯
以開發志意調氣散結和中健脾為主積未成宜解
鬱積初起屬寒宜辛溫消導久則為熱宜辛寒推盪又
壯人無積積皆因脾胃虛弱氣血兩衰四時有感而然
宜加補益於攻伐中使氣血旺而積自除○解鬱香附
又有腸覃石瘕血蠱及息積等病詳見醫書
任摩升偕蒼朮 蒼朮香附總解諸鬱 或燒蒼朮聞或
氣吞酸惡心嘈雜等症平肝順氣和中甚妙蒼朮香附
二兩陳皮川芎梔子神麴枳實青皮半夏麥冬吳黃黃
連赤苓砂仁木香山查乾薑甘草蘇子蘿蔔子白芥子
各一兩丹油熬即越鞠加味○又七情鬱結榮衛凝滯
周身牽引作痛木鬱仁白芥子沒 攻積巴霜堪握 治積
藥木香官桂共末酒和飛麴調擦 聚及
老人虛寒便秘巴霜乾薑良薑白芥子硫磺甘遂檳榔
等分飯丸清早花柳湯洗手麻油塗掌心握藥一九少

時卽瀉欲止瀉冷水洗手 攻積丸用川烏吳萸官桂

乾薑各一兩黃連橘紅檳榔茯苓枳實菖蒲吉梗延胡

半夏各入錢巴仁皂角各利等大黃凡積聚癥瘕諸症

五錢○二方均可熬膏貼 利等大黃凡積聚癥瘕諸症

石灰炒八兩先分炒後合炒入桂心末五錢米醋熬量

虛實貼○治積聚脹滿血熱大黃一兩煨硝三錢大蒜

一劑加麝貼并治瘧母消卽去之○治諸積香附八兩

半生半製靈脂八兩半生半炒黑丑白丑各一兩半生

半煨麻油熬黃丹收廣木香末一兩攪一加川芎大黃

當歸各二兩皂角木鱉僵蠶炮甲各一兩○治積聚痞

塊并一切外症川烏草烏羌活靈仙防己生南星半夏

元參生地首烏川芎當歸白芷赤芍黃耆防風丹皮連

翹銀花梔子秦艽鬱金烏藥枳殼青皮紅花木香木通

官桂蘆薈蜂房全蝎山甲各五錢頭髮一團烏梢蛇用

蛇蛻代癩團用乾蟾皮代各四錢大黃一兩油熬炒黃

丹收下蟾蜍三錢製乳香製沒藥各七錢血結兒茶各

五錢樟腦二兩麝一錢貼○附方諸積及氣血食三鼓

白馬糞同大蒜搗敷 治積塊龜鼈瘕白馬尿同白蠟

鷄搗敷 痞與鼓脹不同 痞在心下脹在腹中痞但覺

數方皆効 痞悶脹則外有脹急之形痞

輕脹重治痞須分虛實不宜專用利氣藥致變成鼓脹
○鼓脹單腹大外堅中空如鼓也氣虛不能制水故脹
其形與膚脹相似惟腹有青筋為異膚脹病根在肺鼓
脹病根在脾○有寒脹熱脹穀脹水脹氣脹血脹蠱脹
之分寒脹腹滿濡時減吐利厥冷宜溫之熱脹者以陽
并陰則陽實陰虛陽盛生外熱陰虛生內熱陰虛不能
宣導飲食如故腹中脹滿穀脹者失饑傷飽痞悶停酸
難化故不能食水脹者脾上受濕水積於腸胃而溢於
皮膚澼澼有聲怔忡喘息氣脹者七情鬱結氣道壅塞
上不得降下不得升身體腫大四肢痠削血脹者煩躁
漱水迷忘驚狂痛悶嘔逆小便赤大便秘結人多有之
蠱脹由脾胃濕熱積滯或內傷瘀血而成另是一症
一云因其中有血或蟲故名蠱鼓脈必浮蠱脈必實實
則按之隨手凸起虛則有凹不起○單腹脹俗名蜘蛛
鼓多傷風與食不治○尋常傷食或氣滯腹脹消導行
氣○久病氣虛腹脹宜補○凡鼓脹病多由怒氣傷肝
漸蝕其脾脾虛之極真臟見也脈喜浮大忌虛小若臍
突出肚見青筋四肢黑身熱如火或寒熱如癰大便秘
泄皆難治凡腫脹朝寬暮急為血虛暮寬朝急為氣虛

朝暮俱急氣血兩虛又腫脹從腹達於四肢者吉反是
因又鼓症不比水腫多土敗木賊宜調和氣血而兼利

肝爲痞熨吳黃一作能化又方水紅花子乾研一兩大

黃甘遂甘草阿魏各五錢急性子炮山甲各二錢獨蒜

二兩硫磺一錢麝香三分用猪肝裹燒酒入藥在內布包

熨痞自消留末少許灑膏上貼再用紙卷筒藥如爆竹

或點火隔紙五六層熨之此楊氏驗方也阿魏爲治

痞要藥○神仙化痞膏用大黃黃柏常歸秦艽三棱醋

莪朮各三錢全蝎梢炮甲片各十四木鼈仁七個蜈蚣

五條用麻油二斤四兩浸熬炒黃丹收入乳香沒藥各

五錢風化硝三錢攤貼先用薑擦過貼後炒鹽布包

熨於膏上或烘兒鞋或熱手熨皆可一方無黃柏有

黃連巴豆蘆薈阿魏各三錢冰片一錢治積痞氣塊身

熱口疳三日熱止七日腹痛十日便膿血愈加琥珀麝

香并治馬刀瘰癧○又方大黃黃柏川烏梔子蘇木各

一兩草烏生地紅花巴仁肉桂各五錢黃連黃芩當歸

赤芍川芎各一錢蛇蛻二條蜈蚣六條山甲二十片桃

柳棗枝各三尺香油二斤熬黃丹鉛粉各七兩收松香

陀僧黃蜡各二兩攪再入黃連末三錢製乳香製沒藥

各一兩血結五錢輕粉陳膽星蚶子殼各三錢麝一錢
和勻狗皮膏攤先以酒煮硝擦洗貼後以火烤之或烘
兒鞋之丸點硃砂治痞癰蟻酥黃蜡各二錢巴霜一錢
各一分九如菜子大粘在化痞膏貼一周時痞化膿血
愈○按本事硃砂丸治一切積聚痰飲心脇引痛硃砂
巴霜三棱乾薑白芷各五錢木香青皮胡椒各二錢半
乾漆炒大黃各一兩檳榔肉蔻仁各一個醋熬入硃砂
成膏細藥攪如上粘貼又隔噎膨脹久積鼓敷甘遂還
驚痰大黃牙皂當歸巴仁硃砂丸並可參鼓敷甘遂還
消大戟甘遂芫花海藻醋熬膏敷先用甘草口嚼再以
香填臍一切鼓脹肚飽發虛小便不通者臍內先填
麝香再用甘遂雄黃各一錢因螺一個搗敷○附方○
鼓滿蒼朮白朮香附常歸蘇梗黃連梔子枳實山查木
香檳榔赤苓木通澤瀉生薑油丹熬備貼○按舟車丸
治腫脹形氣俱實者上下表裏分消其水黑丑四兩大
黃二兩甘遂大戟煨芫花醋炒青皮炒橘紅各一兩木
香檳榔各五錢輕粉一錢或照上用醋熬敷或用油熬
丹收貼并加敷藥雖虛弱人亦可試乃通變之法也○

十鼓取水法大戟勝脫水甘遂肝水麻黃膚水烏梅腹
水葫蘆巴胃水葶藶心水芫花通身水黑丑腎兼徧身
水細辛氣水漢防己胃水檳榔血水海蛤肺水陳皮牙
水桑皮腸水加生薑土狗視症倍用君藥油丹熬貼外
加敷藥亦散研琥珀治五鼓琥珀散大黃二兩巴豆五
通變之法錢牙皂一兩五錢枳殼羅蔔子炒
各四兩琥珀一兩沈香五錢薑皮搗汁丸臨用研末糝
膏貼。附方。水鼓杜蒺藜煎洗蓋屋稻草煎洗地骨
皮煎洗水氣自下。氣鼓而黑脇痛者炒大麥芽熨。
血鼓脇滿小腹脹有血絲酒煎荷葉洗。食鼓噉氣作
酸飽脹炒羅蔔子熨。婦人血蠱劉寄奴或馬鞭草煎
洗。水鼓灸法水分穴在臍上一寸中脘穴在臍上二
寸神關穴在臍之中央以鹽填滿再灸忌刺刺之水盡
則死即當時不死後亦復發不救此親見者。凡治脹
皆取三里穴在膝下獨聖謂單則水蓼鳳仙臭椿皆治
三寸外旁膏藥照貼用則水蓼鳳仙臭椿積痞
商陸治腫脹行水。水蓼治疰癖積氣連花莖子葉熬
膏良一方水蓼花子和飛麴敷或同大蒜搗貼鑑
本加當歸赤芍各一錢沒藥五錢阿魏血結麝香各三
錢貼又水紅花子二錢大黃樸硝山梔石灰各一錢酒

醉一塊同鴉貼湯壺熨手帕勒之三日揭起肉黑如墨

是其驗也。治瘡大紅鳳仙花雄黃獨蒜搗敷或鳳仙

子白芥子馬蘭頭根麝香同搗敷或臭椿樹根熬膏貼

。商陸治腫脹赤者傷人只堪貼臍入臍三分搗貼小

便利自消又方赤商陸根搗碎蒸熟熨再加葱白搗貼

并治水腫喘促者按疏鑿飲子用商陸羌活秦艽檳榔

腹皮茯苓皮椒目木通雙奇川則牛糞猪肚猪肚丸

澤瀉赤豆薑皮可參

合蝦蟆鯽魚按鼓脹症皆川雄猪肚裏甘遂大戟芫花

方蝦蟆鯽魚紫背浮萍絲瓜絡為主藥氣鼓加蝦蟆敗

鼓皮烏藥檳榔砂仁沈香之屬血鼓加馬蝗乾漆血結

紅花之屬水鼓加土狗雞屎牛糞之屬可參又十鼓

雞猪肚雞肫皮陳香圓砂仁沈香生薑大蒜同搗餅貼

亦可加藥。蝦蟆膏乾蟾皮油熬黃丹鉛粉收槐枝攪

治食積痞塊疳疾腿腫濕氣瘡毒又鯽魚膏鯽魚一個

三兩皮硝五分杏仁木鼈仁甘遂甘草各一錢加葱蜜

同搗臨用糝麝貼功同甲莧腫鋪藥餅而行腫謂水腫

鑑方有蝦蟆鯽魚膏可參腫鋪藥餅而行在四肢
頭面為水腫在腹為水鼓視人之目窠上微壅如蠶
新卧起之狀其頸脉動時咳按其手足上窻而不起者

風水膚脹也鼻頭色微黑者有水氣 一云通身浮腫

皮薄而光手按成窟舉手即消者是也 陽水即風水

多外因涉水水冒雨或感風寒暑濕其證先腫上體肩背

手臂熱渴而二便秘陰水即石水多內因飲水及茶酒

飢飽勞役房勞其症先腫下體腰腹脛跗身冷大便利

陽水多實陰水多虛陽水在上多喘陰水在下多滿陽

水宜散宜攻陰水宜溫宜補然陽中有陰陰中有陽宜

辨水腫多因腎水不能攝心火心火不能養脾土脾

虛不能運化水穀停於三焦注於肌肉滲於皮膚而發

腫也加喘者肺為心火剋也久則肌肉潰爛陰囊足脛

水出唇黑缺盆平臍口肉硬足背手掌俱平五藏敗矣

○治腫以健脾行濕為主一云以辛散之以苦泄之以

淡滲利之使上下分消其濕忌鹽醬○治水腫及黃胖

九鼓等名鋪臍藥餅巴霜四錢輕粉二錢生硫磺一錢

研調作餅鋪棉花於臍上貼之俟行三五度去餅以溫

粥補之久病隔日一取○治水腫消河餅大田螺四個

大蒜五枚車前子二錢作餅敷臍取利或地龍甘遂猪

苓鍼砂蕤涎醋調全○又治男婦頭面浮腫肚腹脹滿

上氣喘急者用黑丑白芷煨牙皂煨各二錢半木香沈

香乳香沒藥各三錢琥珀一錢亦可以砂糖飛麪調貼

兼煮赤豆漬滕

水腫從脚起入腹能殺人赤必實其脾

陰水宜實脾溫腎用白朮厚樸木瓜大腹皮草果赤苓
附子各一兩木香炮薑甘草各五錢再加獨活川椒茱
香吳萸官桂肉蔻仁紫蘇陳皮疸黃燻藥筒而取黃疸
澤瀉各七錢麻油熬黃丹收貼疸黃燻藥筒而取黃疸
目珠黃漸及皮膚爪甲身體皆黃也然不痛苦色黃身
痛者濕病非疸一曰腹脹滿面萎黃躁不得睡屬黃
家又尿黃赤安臥蠱動食已善飢又身黃卧時身體青
赤憎寒壯熱者真黃疸也色亮口渴身熱尿赤名陽
黃屬濕熱色黯體重背寒肢冷白汗名陰黃屬寒濕
陽食名穀疸傷酒名酒疸黃汗染衣者名黃汗皆陽黃
類也酒疸變為黑疸難治女勞疸亦名黑疸額黑微汗
手足心熱膀胱急尿利過房寒熱脾腎俱病陰黃類也
難治亦有腹脹如水大便黑者○膽汁黃因驚傷膽得
之諸黃皆尿不利惟瘀血黃尿利蓋血結下焦熱但
耗血而不耗精液也脫力黃者傷力所致瘟黃殺
人最速○凡時行感冒及伏暑未解宿食未消皆能發
黃○黃汗者身腫發熱汗出而渴汗出染衣如黃柏汁
以汗出時入水浴得之○黃腫非黃疸黃疸眼黃不腫

凡色帶白眼如故黃疸有濕熱黃腫濕熱未甚多蟲
與食積。治疸與濕熱相似然宜滲利中佐以甘溫勿
純寒再傷脾成鼓脫力黃等宜兼補。取黃法先用
瓜蒂散搐鼻再用濕麪為餅穿孔放臍上以黃蠟卷紙
為筒長六寸插孔內以煤頭點燒至根剪斷另換取盡
黃水為度効亦治水腫。附方。黃腫燒酒調白芥子
末二錢攤貼小腹上并搗青鯽填臍治疸青背鯽魚一
起泡為度忌吃糖鹽并搗青鯽填臍尾全用加砂仁一
兩洋糖一撮搗爛入蚌殼內覆臍上一夜見効或用
鯽魚背肉二塊加胡椒麝香全。附方南星搗置孟內
扣臍上起泡挑去洩水如濕熱甚者田更平其胃黃疸
螺敷臍引下毛脚并搗塗臂大肉上更平其胃用平
胃散四兩醋調敷臍睡須臾戰汗或瀉黃水愈一方
平胃散加香附青礬青皮蓬朮黃連苦參白朮并治黃
胖黃腫鍼砂與青礬同鍼砂須忌鹽青礬可不忘也
又如熱壅便秘者用平胃加醋大黃二兩黃連黃芩
甘草茵陳各五錢薑汁調末敷腹寒濕者用平胃加
茵陳附子乾薑各一兩白朮枳實半夏橘紅茯苓澤瀉
草薢仁赤小豆吳萸當歸木通各五錢薑汁調敷。附
方酒疸大黃山梔枳實乾葛豆豉等敷。黑疸明礬滑

石大麥芽研敷。○河白用梔子黃雞子清飛麪調餅貼。
○痘癖愛喫土炭生米茶葉者用麥芽使君子檳榔南
星等各加本物治。胸痛橫連於脇。○咽下膈上為胸痛
之。○前傷寒有力。肝餘經能令胸滿短氣而不痛。肝膽脉布脇脇之骨
為肋火上沖則胃脘痛橫行則脇助痛。○脇痛有風寒
又左痛屬瘀血或怒氣所傷或跌閃所致右痛屬氣滯
痰食瘀痛無時不膨或夜痛或午後發氣痛時止而膨
嚔即寬旋復痛痰流肝經咳嗽氣急走注有聲食積右
脇有一條扛起又虛甚成損脇下悠悠常一點痛不止
古治痛多用通法通則不痛也然調和氣血上逆者
下行中結者旁達虛者補寒者溫皆是通法必以下洩
為通者。利脇先以琥珀之膏。脇痛先貼琥珀膏即大黃
非也。歸草龍膽梔子黃連川芎青皮木香蘆薈藿香薑汁調
敷膏外。○此膏或用油丹熬貼。又白芥子水調敷或
吳黃醋調敷或青皮醋炒熨或韭菜連根醋炒熨或枳
殼小茴鹽炒熨。○疏肝法柴胡陳皮青皮各一兩川芎
當歸白芍枳殼香附瓜蒌丹皮各五錢同麩皮醋炒熨
氣加烏藥延胡索血加官桂紅花虛加杜仲黃肉跌打

傷瘀血加大黃炮山甲各五錢 按此方藥 腕痛下挾

其臍

皆腕胃腕當臍心痛李曰屬腎景云亦屬胃○凡心痛

膈上胸內寒痛手足反溫火痛手足反冷胃痛在膈下

兩岐中一云傷於七情作心痛食積痰飲瘀血作胃腕

痛○胃痛有寒有熱實熱易治虛寒難治雖愈必發虛

寒者口多清涎得熱飲痛稍緩實熱者口渴咽乾或多

痰喘急虛寒者肢冷面白實熱者肢雖冷面必赤○大

抵胃腕下大腹痛者多屬食積外邪繞臍痛者屬痰火

積熱臍下痛者屬寒屬痰及瘀與尿澁按腹痛時痛時止

緩挾寒者急寒痛痛無增減或兼吐利熱痛時痛時止

腹滿堅結實痛痛甚脹滿手不可近虛痛按之則止食

痛者痛後卽利利後卽減死血痛者痛有常處濕痰痛

者脉滑痰氣阻礙不得升降腹中引釣脇下有水聲小

便澁飽則暫止蟲痛五更心嘈聞食而痛惡心吐清水

上下攻刺而白唇紅時作時止或面色青白赤不定木

賊者痛而瀉瀉而痛不止者是也○又腹痛欲嘔吐者

上熱下寒也陽不降故上熱而 溫臍必以附子之散

嘔陰不升故下寒而腹痛也 痛

臍濕附子一個挖空入甘遂末錢半蛇床子一錢火酒
煮烘乾研加麝香納臍名附子填臍散此方去蛇床加
甘草名接命丹養丹田助兩腎添精補髓如前法製單
取附子同麝為丸納臍甘遂甘草並用妙。溫胃法
治脾胃虛寒心腹疼痛或冷汗出者非治霍亂等痛附
子巴戟炮薑茴香炒各一兩官桂七錢黨參白朮當歸
吳萸白芍炒白茯苓良薑甘草炙各五錢木香丁香各
四錢沈香三錢研生薑汁調加麝或油丹熬貼。○
附方 治胃熱痛大黃元明粉梔子香附鬱金各一兩
滑石二兩甘草黃芩各五錢末薑汁調敷。○九種心胃
痛并嘔吐噎膈久痢疝氣等症雄黃硃砂木香沈香丁
香麝香桂皮鴉片灰各等分人乳和丸納臍用暖臍膏
蓋 暖臍膏有用生附子五錢甘遂甘草各三錢葱汁
熬膏和藥加蟾蜍麝香鴉片丁香末攤者有用栝子尖
松毛心五斤附子八兩麻油熬黃丹鉛粉收加肉桂雞
皆。又方受寒腹痛炒鹽炒薑葱及熱灰滾水皆可熨
熱腹痛痧藥喘鼻 小腹痛俗名陰寒葱白連鬚七
個胡椒照病人年紀每歲一粒加枯礬少許男孩乳丸
納臍一炷香愈。蟲腹痛川棟肉酒浸棉裏塞肛門
小兒用煨大蒜塞。腹臍冷痛每旦以猩紅枯礬作紙

煎蘸油點燒熏臍或貼煖後宮之病腎為列女熨脊腎

臍膏後再熏亦是一法在後宮熨脊腎

貫脊又腎脉緩甚為折脊又足太陽之脉病腰脊強痛

凡背脊痛皆腎水衰耗不能上潤於腦則河車之路

乾澁難行故痛也老人背脊偃僕腎虛髓空也腎

尖痛者陰虛而膀胱有火也○按脊惡寒屬陽虛者生

薑汁化牛膠入附子肉桂花椒乳香沒藥收貼烘鞋底

熨之脊痛由風寒濕者用川烏頭附子羌活細辛川

芎官桂川椒各一兩醋拌濕布包烘熨又方草烏白

附子南星肉桂川芎白芷乾薑共末酒同麴糊調敷脊

上以熱碗覆之或作餅貼熱物熨之○陰虛者摩腰經

用四物同黃柏知母龜板研作餅貼熱物熨之摩腰云

太陽所至為腰痛又腰為腎府大陽腰痛外感六氣腎

經腰痛內傷色慾○諸經皆貫腎而絡於腰腰痛有九

腎虛是本風寒濕熱痰飲氣滯血瘀閃挫是標○常痛

者虛有定者瘀或左或右者風或痛或止者濕熱往來

走痛者痰積遇寒發者寒濕久坐者氣滯○治老人腰

痛婦人白帶附子尖烏頭尖南星硃砂各二錢五分雄

黃丁香各錢五分乾薑一錢樟腦冰片麝香各三分蜜

丸彈大薑汁化開熱摩腰上并貼一加吳萸肉桂○附

方 腰痛無力天麻半夏細辛蒸熨或黑豆和鹽炒熨
腰脊脹痛白芥子酒調敷。養元固本暖腰方川椒
木香故紙大茴升麻川棟肉桂各一兩附子丁香各五
錢艾絨一兩和勻縫暖腰貼肉着。通治腰痛羌活防
風靈仙天麻川芎當歸延胡牛膝官桂杜仲續斷從蓉
故紙南星黃柏蒼术草薢秦艽小茴烏藥紅花知母香
附胡桃肉骨碎補木鼈仁全蝎龜板木香乳香沒藥白
然銅草烏川棟子生地白芍五倍子靈脂各五錢生薑
一兩麻油熬黃丹收。西醫治腎病有栗殼野菊沸湯
沖布巾絞按患處法有鴉片酒或樟腦油麻油擦痛處
法有鴉片丸納固之以芙蓉即阿金鎖芙蓉膏能止瀉
肛門法亦可參固之以芙蓉芙蓉金鎖。固精保元
煖腎補腰膝去寒濕一切腹痛痞疾夢遺五淋滑淋白
濁婦人赤白帶下經水不調久貼能煖子宮又治色慾
過度陽痿黨參黃耆當歸各五錢甘草五錢附子一錢
木白芷白芨紅花紫梢花三錢肉桂二錢附子一錢麻
油二斤熬黃丹收鹿角膠一兩乳香丁香各二錢麝香一
錢加芙蓉膏二錢攪勻陽痿加陽起石二錢和之貼臍
上及丹田。金鎖固陽膏慈子韭子附子肉桂絲瓜仁
各三兩麻油熬松香收龍骨煨二錢麝香一分獾狗皮攤

理淪駢文

古

韮子龍骨治遺要藥。按金鎖正元丹治真氣不足
吸短氣四肢倦怠脚膝痠軟目暗耳鳴遺精盜汗一
切虛損之症用五倍二兩故紙從蓉巴戟葫蘆巴胡桃
茯苓各一兩龍骨煨入錢硃砂一錢亦有用木香茴香
羊腎者又鎖精丸用山藥杞子五味莢肉瑣陽黃柏知
母黨參黃耆石蓮海蛤粉各一兩白朮二兩亦有用兔
絲子四兩牡蠣煨金櫻子蒸茯苓酒蒸各一兩者遺症
多由思想或傷陰或傷陽或兩傷可酌熬膏餘見前腎
藏精散燒鯪鯉之甲凡肩背腰痛用手臂腿膝環跳貼骨
註 麝香山甲末裏核桃殼覆患處飛麝作圈護住上用荷
葉遮蓋以防火落燒艾一二炷覺熱氣入內即散免舫
延生 下元之衰也陽虛 肚兜治疝積遺精白濁婦人經脉
變症 角各一兩沈香零陵香白芷馬兜鈴木鼈仁甘松升麻
血結丁皮各五錢加麝香和艾絨作兜肚着 又方大
附子大茴香小茴香公丁香母丁香木香升 膝蔽治元
麻五味甘遂沈香麝香揉艾縫兜肚縛丹田 膝蔽虛膝
痛等生草烏川烏黃耆杜仲仙茅金毛狗脊瑣陽川芎
當歸白芷蒼朮防己牛膝甘松五加皮木香松香細辛

肉桂各二錢艾二兩作蔽膝縛全。一用菊花陳艾一用
草烏防風細辛陳艾作蔽膝縛全。凡虛寒體服風燥
熱藥多防涸陰如作 媛之以硫磺玉抱 硫磺補火。治
兜肚蔽膝用最善 白濁遺精女子子宮虛冷赤白帶下男
子精寒痿弱 六錢母丁香五錢麝一錢獨蒜九如豆大硃砂衣每用
一丸納臍眼上貼紅緞膏 紅緞膏川椒三兩韭子蛇
床子附子肉桂各一兩獨蒜一斤真香油二斤浸藥熬
黃丹收或硫磺丁香胡椒杏仁麝肉九或用胡椒硫
磺黃蜡九納臍上貼紅緞膏全。玉抱肚法治積冷腹
痛用鍼砂四兩炒出烟入白礬五錢礬砂粉霜各五分
新水拌勻微濕裏以皮紙貼安懷中候熱發置臍內或
放氣海關元穴大補元氣置於他冷處亦汗出立瘥此
藥燥則不熱再以新水拌再熱可用十餘次如藥力盡
晒乾再入礬即如舊或用鍼 補膠麋鹿之茸舊有參
砂明礬二味亦効 亦見治痢 補膠麋鹿之茸舊有參
按香茸九滋補精血治下焦陽竭腹臍疔痛目盲夢遺
食少肌瘦鹿茸麋茸各二兩浸搗菰蓉五味茯苓山藥
龍骨沈香各一兩熟地三兩 大便之結 氣祕欲下不下
加麝九每用一丸研膠膏貼 雖努力不暢名

陽結能食以調氣為主結屬糞結血不足腸燥肛裂名

陰結不能食以活血為主亦有似秘非秘者年高血少

病後血氣未復或脫血津涸皆宜大補氣血大約此病

只宜生津潤燥忌破氣損液大便祕結不通皆腎病

然祕結不過艱於下利而不通蜜導為最前見大黃皂角

或胸腹脹滿氣悶欲絕危症也

掩其臍取通加黑丑樸硝熱角五分數臍或加香油入

猪膽內用竹管插入扎緊附子寒錢炮川烏香白芷牙

皂各三錢胡椒一錢麝少許同大蒜搗敷臍再以蒼歸

桑葉竹管中吹入肛門即通前有二烏通陽方蒼歸

補氣虛加蒼血虛加蟾粉大實大滿如結胸者用蟾蜍

歸或用莖荖妙蟾粉巴霜輕粉醋丸納臍膏掩

蠟芸膠陰症便秘雄鼠屎白可消息小便之閉肺氣為

源氣行則水行又腎氣足則化以吐法通小便如化

數開而下數利有有餘者膀胱有水熱結氣閉有不

足者五內枯燥膀胱無水當分氣血以渴不渴辨之渴

而不通上焦氣分熱宜清肺不渴者下焦血分熱宜滋

腎 凡嘔吐腫脹 葱熨為先 試法冷秘葱熨即通熱秘

車前滑石圍其腹 見前 肉桂寒 見前 同車前用。附方

梔子熱 敷陰囊一用桃枝柳枝木通花椒明礬一兩葱

白燈心各一把煎湯圍被熏洗再炒鹽熨其臍下亦可

加梔子等味。附方猪胆龍陰首婦人以胆汁滴陰中

內將陽頭插入熏之 血閉韭白濃煎洗臍下或桃仁

或麻根搗攤絹上貼小腹連 柴麻提氣陷宜提老人產

柴胡升麻熬 螺冰 田螺冰片敷臍或用田螺葱白輕粉

膏貼肛門 螺冰 田螺冰片敷臍或用田螺葱白輕粉

或半夏填臍加田螺葱白作餅蓋扎下用皂角燒烟熏

或用田螺十餘個放水 中澄清取泥入臍粉塗臍立通

并治 鯽魚全個搗敷 或加蜜麝香敷碗覆 當變通

熱淋 鯽魚全個搗敷 或加蜜麝香敷碗覆 當變通

諸藥不效葱熨 關格 關者不尿寒在下 有冷熱之

中填鹽令滿艾灸 關格者吐逆熱在上

里會并之

髮熱白一斤切細入麝五分拌勻分二包先以一包置
 盆度不應老薑木通煎湯飲探吐或身無汗葱湯入浴
 亦謂陰陽關格瓜蒂芥子令吐瀉垂死者但治下焦以
 硝黃枳樸通之煨蒜塞肛或蜜導忌淡滲利小便藥
 中通先皂麝之填關格乃痰格中焦上下皆病也先用
 火若頭汗出則陽絕不治如脈沈細手足厥冷者用人
 參附子麝香納臍中虛者用黃耆白朮升麻柴胡木香
 枳榔末布包放臍上熨斗熨之即升降更聞臍轉小便
 法也前傷寒有寒熱不調灸法可參
 所致○涼藥疎利小腸熱仍通泄大腸大便下臍白
 歸正小便自順○甘遂末數口含甘草○又寒水石二
 兩滑石髮灰車前子木通冬葵子各壹兩葱白五錢搗
 汁調藥敷於臍下○女子轉臍用猪尿脬吹脹裹竹管
 扎緊擠氣入戶大尿而愈孕婦胎壓臍亦有腸交即
 不尿吊起一脚睡即尿蒲黃縛腰見前
 腸症方控羣丸也救黃茛橋荔
 侯補丸也

或有形如瓜有聲如蛙俗名小腸氣又名腎與膀胱氣
一云均屬肝病人身白兩肋小腹至陰囊畢丸皆肝位
與小腸膀胱無涉子母相關病所由致則有之如丸升
上入腹者難治○七疝者寒疝囊冷硬如石氣疝由號
哭忿怒所致氣鬱而脹血疝俗名便癰水疝囊如水晶
陰汗或癢搔出黃水筋疝莖脹筋縮出白得之房術狐
疝夜消晝大癰疝即大卵得之胎中○治法初起鬱熱
在經鬱久後感寒氣外束不得疎散因而作痛勿專執
寒治亦忌補○七疝及瘕聚帶下屬寒者吳萸小茴橘
核荔枝核川棟子地膚子青皮元胡靈脂香附黑丑沒
藥丁香木香金竭蒼朮各一錢研酒敷○附方○疝初
起薑蔥蒜搗敷熨皮炒熱烘於藥外寒濕痛者艾葉
川椒紫蘇炒熱袋盛夾囊下勿洩氣又葫蘆巴一兩
鐵鍋炒黑研酒調敷治氣胞木腎水胞偏墜用灶心
土炒熱加川椒茴香艾葉末拌勻放盆內隔磚坐之令
冷血冷氣冷水化為汗出愈又偏墜肥薑切片鋪板
上堆艾一尖燒之將完乘熱帶火連薑艾搗爛攤菜葉
上向囊下託之初時其冷如水少頃滾熱寒濕從汗出
愈○簡便方水疝連鬚葱白同灶心土敷可收水○血
疝馬鞭草洗并搗塗亦治木腎不痛者又胡椒菜葉搓

揉可散血。○狐疝，煨牡蠣乾薑末水敷。○癰疔，薏仁一兩，陳壁土五錢，炒黃水煮研膏敷。按：十香丸治氣滯寒滯及癰疔之屬。烏藥香附小茴荔枝核煨陳皮澤瀉木香丁香沈香各等分，皂角減半煨酒丸，彈大可磨數。○外腎着驚縮上者，草麻敷足心止，即去之。又高莖子一中潮腦三錢，磨一分同高莖菜搗膏貼臍下。○穿心疔以手招大敦穴一炷香，即止，不止灸之。○按志和曰：凡遺尿癰閉陰痿，胞痺精滑白淫，皆男子之疔也。血涸不月，足蹇咽乾，塞閉小腹，有塊前陰突出，後陰痔核，皆女子之疔也。但女子不名疔，而名瘕，知此則治諸病皆可以治疔。○鬱宜梔子，古方同烏附，用小便澀者川楝合法通之矣。○或塗以芙蓉黃柏，偏陰用，荷香荔子核不荔子核黑山。○或塗以芙蓉黃柏，效者熱症也。醋磨木鼈梔末酒調敷。○包之以蛙皮，治疔開元固氣丸用此。○附方：鮮地骨皮生薑各四兩，搗爛包囊上。○脫肛，搽膽乳茶冰瘰即消。○陰腫如斗，雄礬甘草煎洗。○脫肛，搽膽乳茶冰肺熱脫肛，豬膽汁同兒茶人乳米片搽熱汁白下而肛收也。○附方：生地龍撲硝清油調塗，先以荆芥葉葱白。

煎洗或冷水調黃連末敷溫用蛇床蛇床子溫陰之藥同甘草研末

鬼絲子和如泥塗日五并治陽衰不起再或糝以熟地

加吳萸煎熏并治產後玉門不閉症效烏梅陰虛脫肛熟地枯礬烏梅炭糝膏貼○附方鬼絲

烏梅下末雞清塗或用蚌灰蜜調塗或用鱉甲頭燒灰加枯礬赤石脂訶子肉

竈心土五倍子末升之以蟬蛻氣墜者用蟬蛻焙黃為末研菜油調

敷自收或用升麻防風既傳附子靈脂補氣蒸臍之祕

末摻氣虛加參耆末太乙真人熏臍法通治勞傷失血及陰虛遺精白濁陽

痿精神倦怠痰火婦人赤白帶子宮冷諸症麝香龍骨虎骨蛇骨附子木香丁香乳香沒藥雄黃硃砂靈脂夜

明砂胡椒小茴青鹽兩頭尖等分以麝填臍眼蒿麝圈臍外填藥蓋槐皮艾灸之汗出病已慎風寒戒油膩生

冷酒色等如畏灸者可加艾和藥裏袋鋪腹上熨斗熨之偏藥氣入肚但令溫暖即止亦効下全○原評曰麝

香引透諸藥丁香堅守其胃啟飲食之進青鹽入腎以實其子使肺無漏洩夜明砂以補其血散內傷之有餘

乳香沒藥木香小茴升降其氣不致咳嗽龍骨虎骨蛇

骨硃砂雄黃以削病根兩頭尖巡視經絡有推前拽後之功附子胡椒補元氣使血行血室氣歸氣宅痰散為金波靈脂連操其肺削有餘補不足用槐皮之藥閉押諸藥之性使無走竄之患艾灸有拔毒起死回生之功凡諸藥不効可用此法。濟眾熏臍法川烏乳香沒藥雄鼠屎續斷二錢麝一分食飽後灸如前法勿令痛反泄真氣每年中秋行一次隔兩日一灸灸至臍內作聲大便下涎物為止只服米湯食白粥黃酒助力溫臍即止過則生熱婦人尤宜。氣虛體倦肚腹畏寒用五靈脂夜明砂枯礬麝香灸全每于二分二至前一日溫水洗臍眼納麝少許用麪團臍填藥灸之灸後以蕎麥為餅蓋藥俟冷取下忌茶。按太乙鑑名延壽復著鳳丹有人參白附無兩頭尖婦人無子冰片代麝復著鳳仙鶴糞殺癆蟲灸脊之奇治癆蟲鳳仙根蘸潮腦擦背或加薑桂同搗擦。治癆病人未全虛者水灸法用白鴿糞淨靈脂白芥末各五錢生甘草二錢末加大蒜五錢同搗入醋化麝一分離脊上皮紙蓋一炷香七日一灸。浙杭有沈姓醫治癆用白鳳仙猪脊筋同藥末攤貼脊背者其用脊筋法可取

○又方白鴿糞三五合炒焦布包從尾間起擦上至大
椎又從大椎起擦下至尾間如此數十遍日夜數十次
蟲盡死先用濕紙搭脊樑看一點先乾處是蟲所在竭
力擦之有乳香熏手背驗蟲有無法不甚驗故不錄
○傳屍癆熬商陸根囊盛熨或佩麝香安息香再用甘
松元參炭屑加白蜜和九常燒可以辟蟲免傳染○凡
蟲證眼眶鼻下青黑面色萎黃臉上有幾條血絲如蟹
爪分明或面上白斑唇紅能食心嘈時痛時止痛則咬
心口吐涎沫清水夢中嚙齒腹中或有塊凡辨察蟲蟲
頭赤食人肉可治蟲頭白或嘴白或肚白食人髓皆難
治黑者已入腎臟亦難治○殺蟲膏挑枝李枝梅枝桑
枝石榴皮並取東向者各七莖青蒿一小握苦楝根七
寸生藍葉七片葱白連根洗七個黑丑頭末半生半炒
一兩大黃五錢檳榔入錢醋炒三棱煨蓬朮雷丸蕪荑
使君子木香甘遂皂角靈脂雄黃各三錢明礬輕粉硃
砂各一錢麻油熬黃丹收麝香體一加貫仲厚樸乾漆
炒白僵蠶各三錢紫金錠二錢尤佳○婦科解鬱爲先
凡療疾皆蟲食肺系吹血聲嘶最難治
女屬陰遇
氣多鬱
通經是主
婦人經血有常期愆乎常則病矣
方書以遺前爲熱退後爲寒亦未

盡然要之以色。紅爲正。其變爲紫黑者熱也。黃如米泔者濕也。淺淡紅白者虛也。或成塊而紫黑色。熱者寒凝也。成塊而紫黑色。明者熱結也。將行而腹痛拒按者氣滯血凝也。既行而腹痛喜按者氣虛血少也。經前發熱者爲血熱。經後發熱者爲血虛。腹脹者爲氣滯。腹痛者爲血滯。泄瀉者是脾虛。瘧瀉者是寒濕。凡逆行上溢而吐血。衄錯行下流而暴崩。皆屬血熱妄行。而亦有絡脉傷損。瘀積肝旺所致。若經水過多色淡爲虛。色深爲熱。或兼赤白帶而下者。臭者爲濕熱。腥者爲寒濕。治法不外四物逍遙散。及五苓散。藥料加減。帶下是濕熱爲病。赤屬血。白屬氣。主治燥濕爲先。又肥人白帶是濕痰瘦人是熱。久帶下陽氣虛極下流白滑多悲不樂宜溫。崩漏者非時血下。淋瀝不止爲漏。下忽然暴下爲崩。中又悲哀太甚。則胞絡絕。而陽氣內鼓動發。則心下崩。而數淩血也。經閉有三。上焦心火中焦胃弱津枯下焦胞脉熱結。血海乾枯。閉久則血滲脾經發爲水腫。室女憂思過度。則傷心而血逆。竭故月水先閉。且氣滯。心不能養脾。故不嗜食。脾虛則金虧。故發嗽。以木香同生地搗餅貼熨斗熨之并治腫核。又木香烏藥香附枳殼青皮陳皮川芎厚樸蒼朮三錢

官桂甘草一錢生血瘀浴以益母通經益母草煎洗小

草四兩黨參當歸香附製丹參熟地白朮靈脂炒生地

各二兩陳皮青皮烏藥柴胡丹皮地骨皮川芎酒芍半

夏麥冬黃芩杜仲續斷延胡紅花川練蘇木各一兩沒

藥遠志肉枳殼炒吳萸黃連厚樸茴香木通木香官桂

甘草各五錢炮薑三錢雄烏骨雞一隻竹刀破腹去毛

雜或用全付骨亦可麻油熬黃丹收牛膠二兩蒸化攪

勻貼臍下。經閉蠶砂酒炒熨種玉有丁公仙枕之喪

○崩帶蠶砂炒心土牛膠酒敷丁公仙枕用槐木爲枕如天蓋地式鑽孔一百二十衰

川椒吉梗荆實子柏子仁薑黃吳萸白朮薄荷官桂川

芎益智仁枳實當歸川烏千年健五加皮黎蘆羌活防

風辛夷白芷附子白芍稿本茯苓細辛牙皂蕪荑甘草

荆芥菊花杜仲烏藥半夏等分各一兩咀片研末絹袋

盛衰枕睡能除百病壽高多子寶鑑有仙枕方稍異

調月有濟陰蜜丸之納濟陰綱目云凡下焦虛冷腹痛

床子五味丁皮各一兩木香丁香五錢絹包煎湯熏洗

後再用藥納下部帶下延胡五錢厚樸三錢當歸茴

香

里禽餅文

香防己肉桂赤豆龍骨川烏丁香木香良薑木通全蝎
枯礬各一錢蜜丸棉裏納之。又方爲上藥力小再加
三錢內加行性熱藥羌活柴胡二錢大蒜一錢破故紙
與蒜同焙一錢三奈子川烏頭大椒五分甘松三分升
麻枯白礬二分全蝎三個麝香少許爲末如上納法
一用枯礬蛇床子一用吳萸川椒一用遠志乾薑
吳萸蛇床子一用五味皆如前納法兼暖子宮。
凡下部有病藥難達到此法甚捷而不傷臟氣此卽濟
陰綱目中論也乃知今人專講內服亦非古人所取
又壽世編云古方勿妄用有產病用外臺祕要坐導方
其後反得惡露之疾此非法之不慎佩雄精而宜子孕婦
善乃藥之不當也然亦不可不慎佩雄精而宜子孕婦
精於左臂宜子取陽精全於地產東大布以安胎婦人
也此類古方雖未必驗當知其理胎之
所居曰子宮亦曰胞門亦曰丹田在臍下三寸。任脉
衝脉皆起於胞中上循腹裏爲經絡之海又衝爲血海
任主胞胎女子二七天癸至任脉通太衝脉盛月事以
時下故有子胞亦名血室血澁不行則成癥作痛胞
寒則無子。凡胎動多在當臍。孕婦以潤布束腰免
胎墮臨產解之兒易轉身良法也。安胎主膏黨參蘞

當歸各二兩熟地三兩酒條芩淮藥白木各兩半酒川
 芎酒芍陳皮蘇梗香附杜仲續斷貝母各五錢麻油熬
 黃丹收一加黃耆生地各一兩下血者加桑寄生阿膠
 各五錢又加如子腫加薑皮茯苓皮大腹皮陳皮梔子
 末調子喘加馬兜鈴吉梗貝母子癰加防風獨活羚羊
 屑又止嘔定痛加砂仁少許又肝脾血熱小便帶
 血加柴胡黑山梔又胎動不安古保兒預貼丹田
 方一月用烏雞雞十個月用猪腰入藥保兒預貼丹田
 乃血氣虛損不能榮養而自墮有因勞怒傷情內火便
 動亦能墮胎又婦人有孕則碍脾運化遲而生濕濕生
 熱也又婦人受胎經三月而墮者雖氣血不足乃中衝
 脉有傷中衝即陽明胃脉供養胎孕至此時必須謹節
 飲食絕色慾戒惱怒方免。專保小產方生地八兩當
 歸炒黃芩益母草各一兩白木續斷各六錢酒芍黃耆
 各五錢甘草三錢麻油二斤熬白蠟一兩黃丹十四兩
 收龍骨煨一兩攪勻紅緞攤貼丹田十四日一換將產
 一月一換一方無白木加荏蓉。又方保小產先一月
 貼腰眼七日一換過三月半月一換十月滿為止如治
 淋帶血枯經閉貼丹田如治腎虛腰痛貼命門及痛處
 諸瘡入關貼之亦可收口用黨參當歸生地杜仲續斷

桑寄生生地地榆砂仁阿膠各一兩熟地二兩蠶砂炒
一兩半麻油斤半黃丹十二兩黃蜡二兩收下紫石英
煨赤石脂煨龍骨煨各七錢攪勻一方無
赤石脂如無真桑寄生可不用或倍續斷
足孕婦有病其胎已傷不能保者留之則害其母用附
子一個研醋調塗母右足去之非萬不得已切勿亂
用臨產遵六字真言

餘詳達生編胎產全書催生滋四

物大劑

生不必催催生更不可亂服藥。瀝漿生用熟

以滋益之此方洗冤錄以治跌壓死者一方用黃蓍

當歸煎熏全

一用麻油和蜜摩臍皆穩而效。附方

。按婦人鬱極傷損肝脾濕熱下注陰痛四物湯料加

乳香搗餅納陰中又產後子宮不收陰門突出四物

湯煎熱入龍骨少許以麻油和湯熏洗

此皆內府方

也即四物推之凡四君八味十全大補無不可外治矣

龜殼散能開交骨

即龜板二兩川芎當歸各一兩髮灰

以蒸汁麻油調敷腹閉目靜卧一時即生蓋開日烏雞
則氣行陽閉目則氣行陰也或加車前子一兩數

湯足出死胎

胎死母舌必黑又指甲青黑腹脹悶口臭

死。死胎不下烏骨雞去尾煎湯摩臍下妙。治難產

及死胎用龜殼散敷最妙或用立聖丹寒水石四兩以

二兩生用二兩煨赤同研末加硃砂五錢再研如桃紅

色每用三分井水調如薄糊攤紙貼臍心死胎平胃

散加樸硝五錢桂心三錢麝一分敷此方雖較內服有

差然產後人虛硝麝尚嫌其峻須審視明白再用又

死胎方黃牛牯屎不胞衣不下豆醋濃摩黑豆四五合

拘多少塗母腹立出

數滾布蘸溫炭臍腹并厚敷胞自下蓋豆滑而醋斂也

驗。又方用石灰一大塊置淨盆中以沸湯潑之扶產

婦蹲其上熏之即下此方太峻有葱白濃煎湯熏洗法

至穩或川芎當歸煎洗或黑豆二兩熟地赤芍當歸

甘草炮薑肉桂一兩附子五錢酒煎洗危者附子五錢

丹皮乾漆大黃一兩醋熬貼如誤用濟坤丹等下胞衣

必致產後子腸不收者水溫浸盤腸生臨產小腸先出

百病皆作

則神散宜先以產婦髮梢或紙撚入鼻取嚏再放腸漆

器中黃耆煎湯溫浸之自收急抹桐油以防風襲或藥

魚焙塗或用參耆苓朮歸陳柴升倍升麻濃煎溫浸亦
佳凡產婦脫肛及下茄帕等症俱是氣虛下陷宜用此
法又治脫肛用參耆苓朮歸升加熟地黃肉芩絲餅肉
桂附子黑豆煨薑可參或熬膏備用又子腸不收葱湯
或枳殼湯浸或煉暈塞半夏臨產時忽暈絕者乃氣悶
麻油傾盆中坐浸暈塞半夏亂不清所致以生半夏飯
丸裹寒鼻卽醒此扁鵲法若產後血暈有去血過多
者宜補血有惡血上冲而暈者宜破血行血爲妙又先
用炭盆潑醋使聞其氣則精神斂而不散且酸能益血
也或用秤錘燒紅置醋盆中全如血上冲用醋煎韭菜
熏鼻熨胸肝風動發厥亦悶蒸紅花用紅花煎盆湯熏
用葱或韭菜熏髮并合臍悶蒸紅花用紅花煎盆湯熏
自醒或紅花扎緋線以止衄產婦口鼻黑色起鼻衄爲
同醋煎熏鼻扎緋線以止衄胃絕肺敗難治一方用
紅線三根本婦髮三根扎中指中一節乃手少陰心位
也。附方產後熱入血室發熱煩躁晝輕夜重譫語
如見鬼神或往來寒熱小柴胡加靈脂佐以黃連少許
赤苓等清心涼血。產後血崩如色紫脹痛者是敗血
勿以崩論若鮮紅者是心肝脾受傷當以崩論治產
後血崩不止如塊如片宜大補脾胃升氣血用當歸

二兩黑荆穗黨參白朮熟地黃蒼川芎白芷蒲黃炒靈
脂炒各一兩柴胡升麻陳皮各五錢烏梅炮薑各三錢
麻油熬黃丹收或加麥冬五味羌活防風黃連用吳萸
水炒黃柏炒黑各二錢再加伏龍肝蠶砂炒阿膠香附
艾葉各一兩兼白帶者加蒼朮半夏各一兩熬貼心口
臍下凡老少血崩皆可用與前血症門十灰散參若
小腹滿痛是肝藏已壞難治。白帶熱鹽炒艾熨臍
又醋炙雞冠花酒炒紅花荷葉灰白朮茯苓陳壁土車
前子各一錢末酒或米點硃燈而鎮譴產後胡言亂語
湯調數臍可利濕熱點硃燈而鎮譴乃氣血虛而神
不定也四根燈草加硃砂點四炷燈照之。按產婦譴
語怔忡驚悸宜川芎當歸黃芩黨參白朮熟地茯神棗
仁栢子仁各一兩半夏陳皮麥冬甘草各五錢油熬丹
收硃砂末歸心口可安神惡露未淨加桃仁紅花炮
薑各二錢熬貼以免敗血沖心尤穩勿悞作邪祟治反
擾其神又如有塊痛者另用藥治塊處此膏即用著
參朮地補藥貼亦無碍風驚煮其髮鼻嗅荆防產後驚
膏藥異於湯藥以此風驚煮其髮鼻嗅荆防風驚煮
四兩生薑二兩河水燒滾將產婦髮煮至白沫起汗愈
此又是一種汗法奇妙前有蠶慈膏可貼。凡產後

髮灰一錢炮薑五分黑豆一撮葱白三個煎熏口鼻如
用麻油熬黃丹收牛膠攪貼心口背脊肚臍亦可。產
後中風黑荆穗童便煎熏口鼻。產戶受風葱白紫蘇
煎熏羌活防風煎熏。烏金膏紅花二兩熟地赤芍莪
朮煨全當歸蒲黃炒陳黑豆乾薑官桂各一兩麻油熬
黃丹收治產後敗血爲患諸症。又方當歸二兩川芎
一兩桃仁薑炭甘草紅花延胡官桂靈脂香附各五錢
麻油熬黃丹收治產後諸病消積行瘀甚妙較回生丹
穩。○寶金膏當歸四兩黨參香附川芎延胡索蘇木白
朮蒲黃桃仁醋大黃紅花熟地茯苓烏藥川烏各一兩
牛膝地榆炭山萸肉金毛狗脊蒼朮何首烏酒芍靈脂
炒醋三棱羌活橘紅木香良薑青皮木瓜乳香沒藥草
烏大荷血結桔梗防風天麻黑荆穗香白芷細辛各五
錢黑豆艾葉牛膠各一兩五錢麻油熬丹收或加厚樸
枳殼黃耆半夏炮薑炭吳萸各五錢髮團八錢生薑葱
白韭白各二兩同熬槐枝攪通治產後一切諸症或貼
心口或貼臍下寒症糝肉佳未貼。○凡產後百病以此
膏爲主隨症加藥。按千金不易方治產後百病用當
歸三錢川芎生地澤蘭益母草醋香附醋延胡各錢半

風加防風天麻血崩加靈脂炒荆穗炒三四朝發熱
 加炮薑著參咳加杏仁桑皮桔梗脹加蒼白木茯苓厚
 樸陳皮砂仁枳殼即藥例寒痛護其心肢揉薑附產婦
 此方治十三症茲不備載
 棉護心○又產婦勞倦傷脾足冷逆而厥氣上行宜用
 炮薑附子布包烘熱熨四肢冷處○按胎產全書有加
 味理中方法治胃痛用淡附子三錢白朮炒茯苓二錢炮
 薑肉桂各一錢醋炒延胡製乳香各一錢五分甘草七
 分荳蔻五分黨參七錢或一兩如氣痛加丁香廣木香
 鬱金炒良薑炒各等分血痛加靈脂醋炒錢半炮薑蒲
 黃炒各七分歸身炒二錢寒痛加吳茱萸一錢小茴鹽
 水炒錢半胡蘆巴鹽水炒二錢桂附倍用食痛加焦神
 麴錢半山查用糖水炒雞肫皮焙各二錢廣皮一錢母
 丁香七分蟲痛加川椒四十粒烏梅三個吳茱萸用黃
 連水炒八分梔子肉三錢痰痛加製半夏牡蠣粉各二
 錢肉苁仁煨橘紅沈香各一錢積疳痛加巴霜虛痛分陰陽
 陳香圓佛手柑各一錢冷積重者加巴霜虛痛分陰陽
 陰虛加熟地用薑汁益智仁砂仁炒五錢杞子酒炒阿
 膠用蒲黃炒山萸肉酒炒各二錢炮薑五分陽虛原方
 加附子實痛去參朮加枳殼草蔻仁各一錢桂枝醋炒

入分甚者大黃用菲汁製三錢去肉桂產後宜溫而
溫中進食尤急此方可熬膏貼其加法即可為糝藥之
例通之可治百病丹溪治產瀉虛鬱冒喘倉公之散後
脫用參朮苓附加五味枯礬可推鬱冒喘倉公之散後
亡血昏迷不醒名鬱冒即血厥厥脈芤芤芤芤芤
蘆雄黃明礬末隨鼻取嚏此倉公散也逆亂塗二氣之
丹按產後嘔逆者古云用香砂六君藥料治之加製吳
銀硫黃各三錢結成砂同研米糊為丸以柿蒂丁香湯
調用水銀得硫白化呃逆霍亂俱治如敷胸甚妙。附
方產婦咳逆官桂末以薑汁調塗脊即肺俞也塗脊一
條并治瘧。敗血入肺面黑咳嗽喘急蘇木煎湯熨胸
背如氣短發喘者醋煎生化湯熏鼻若聞食即吐胃氣
絕者難治又方用續氣養榮湯料當歸四錢川芎黨參
各二錢黃耆熟地棗仁炒山藥各一錢炙甘草炮薑各五
分陳皮三分此方補氣血而兼能消痰導滯安神清熱
如熬膏備用甚宜足冷加附子三分汗多加麻黃根一
錢渴加麥冬五味便閉加麻仁從蓉即是藥例又痰加
製半夏傷食加山查砂仁痰加肉桂紅花咳芎歸任熏
加杏仁可臨症時酌用茲不具載能者自知

凡產後怪症皆是敗血爲患通以川芎當歸治之最穩
如乳懸症用芎歸煎湯熏口鼻并患乳久之血散自愈
可以爲證又芎歸加天麻羌活熟地治中風
又芎歸加赤芍三棱莪朮治血痞皆醋調敷
貼產後下物如茄如鉢如怕如肉線有用草麻肉同乳
香一半研膏貼頂心收卽去之者非萬不得已勿用
肉線有生薑一斤麻油二斤炒乾盤
起肉線絹盛乘熱熏法甚佳可推
人死血食結痰結三等塊痛黃連用吳萸益智仁蘿蔔
子拌炒加川芎桃仁黑山梔六神麴三棱莪朮山查香
附白朮當歸陳皮
薑汁九醋調敷
五香鋪蒜之餅
產後流注及陰毒腫
沉香肉桂各等分麝香減半加白芷蘇葉薑黃血結
研末以米湯調作餅先鋪蒜泥再放餅灸或熨斗熨腸
分內外產婦患癰疽皆由氣衰血阻外腸癰難治內腸
癰腫痛當臍必硬宜用灸法兼用補託外腸癰治後其
毒內消往往有寒毒如雞腸者從臍出牢不可斷如肚
腹脹痛者內腸癰也潰後必從大腸內瀉膿血灸法
用生附子一片放患處以葱薑蒜搗糊放附片上塘雞
里禽并文

矢亦好艾灸之能散更妙如爛用山上白色陳牛糞研
麻汕調搽切忌涼藥敷致毒內攻禍不旋踵按灸法
亦宜乳辨壯衰產後乳病或虛或癢須分別治按婦
慎用乳辨壯衰人乳病與男子異女損肝胃男損肝腎
此症過四十外經斷者難治。兒吹氣而得者名乳吹
在胎中者名內吹既產者名外吹如紅腫青白者
疽。先核漸漫腫如盤未潰先腐微斑紫黑失治則串
及胸肋膈下流臭水敗漿成損名乳勞。又由憂思抑
鬱脾氣消阻肝氣橫逆所致不痛不癢如碁子大一核
數年後方破者名乳岩滴盡氣血而死難治。乳初作
痛生半夏慈白塞不患一邊鼻并治乳核或加巴豆細
辛橫扎鼻上嗅之或巴豆米片飯丸雄黃衣貼眉心並
效。乳癰初起慈白炒敷再用砂罐盛炭火隔汗見前
註。一用牛膠醋化塗或用柴胡連翹當歸枳殼皂角
煎汁入醋化牛膠塗或用常歸瓜蒌甘草澤蘭青皮乳
香沒藥白芷貝母醋水熬入牛膠成膏塗并治乳勞乳
核陸方加白芨可束根。一用香肥皂紅糖搗敷又
鯽魚一個山藥如魚長一段加糖搗敷單山藥亦可敷
消即去之恐肉腐。乳核初起可散久則成岩矣用慈
和蜜同遠志末敷忌入口。或烏頭桂心甘草酒調敷

或煨蚶子殼醋塗 鑑方治乳核用南星半夏僵蠶

白芷草烏皂角末葱和蜜搗敷忌入口 又治乳核用

木香生地搗餅敷熨斗熨之前有五香餅可參 心悟

治乳核用香附麝香末蒲公英煎酒調塗 乳癰結核

刺痛及潰後不斂丹參炒白芷赤芍各五錢猪油熬黃

蜡收塗 乳癰衆療不愈但堅紫色青者柳根刮去皮

搗爛燉熱盛練囊中熨乳上一宿即愈此毛養生方也

○乳癰田雞皮入半夏三錢麝五釐搗餅敷帛縛約三

時解去 乳勞爛見心者取猫腹下毛燒存入輕粉少

許清油調塗 乳頭破裂或小兒吹乳血乾自裂破多

痛丁香末敷如燥津唾調敷 乳頭生瘡汁出痛不可

忍生鹿角三分甘草一分共末以雞蛋黃入藥攪勻置

銅器中炙溫敷日二次愈 乳不通麥芽煎洗木梳梳

乳干癰 治乳吹膏藥川烏草烏南星白芷各一兩生

地當歸白芍各二兩麻油熬鉛粉收此方去腐生新拔

毒長肉無不效 乳疽敷藥初起可消已潰可束住不

致日開日大黨參黃耆熟地川芎當歸青皮各二兩白

木香木蘇葉柴胡白芍白芷香附靈脂烏藥遠志陳皮

木香半夏僵蠶草烏南星官桂木鼈仁五倍白芨白斂

乳香沒藥神麝各一兩羌活防風厚樸枳殼桔梗甘草

名五錢共末牛膠五兩醋加生薑汁化開和錠人乳磨
敷或油丹熬貼陽和湯料作餅敷犀黃丸塗。凡乳

症須早治傳盡乳房再傳次乳則患深矣灸法用碗

一個以燈草四根十字排碗內頭各露寸許再用紙條

一寸五分潤用水濕了蓋碗內燈草上其紙碗口齊

碗覆患上留燈草頭在外艾一大團放碗底久之艾盡

再添俟碗內流水氣內痛覺止曰逆曰橫曰側俱是產

方住不應次日再灸一次自消

難手足出為逆忌針刺將真灶心土搽母臍中如足出

者用中指點鍋底煤於兒足心畫一叉如手出者放

鹽於兒手心即順俗名討鹽生或用蛇蛻灰少加麝香

酒調勻塗兒手足心全橫則生者輕手扶正之切勿驚

慌亂用蠻法。附方坐產太早下部受凍血冷凝滯產

戶不開者紫蘇煎湯熏之或胞破已久水竭血乾者葱

湯濃煎有熱有嗽有汗謂發熱咳嗽也悉為蓐勞按產後蓐

洗自下有熱有嗽有汗謂發熱咳嗽也悉為蓐勞按產後蓐

生內熱所致熱鬱積久變成虛怯宜清熱止嗽潤肺瀉

火滋補真陰但過用清熱瀉火藥亦恐重傷脾胃故前

人有宜參助真陽以生真陰引瘋癰日難治此亦血虧

火歸原之法前有滋陰膏

忌用風 非虎骨鹿茸可瘰用膠亦可或同參歸著地等

燥藥 補藥熬敷。附方。產後惡

露不淨發熱煩躁或大小腹有塊痛者貼寶金膏後再

州當歸川芎肉桂炙草各五錢蒲黃沒藥乳香靈脂各

二錢半赤芍一錢血結五分另研熱酒調敷膏外或

用炒吳萸熨。產後脫肛等症皆氣血虛。脫肛用荆

芥末熬頭灰蜜調塗肛上以陳年草鞋一隻烘熱緩託

上數次可愈或五倍末摻或黑豆菉豆赤豆末少加枯

礬蜜調塗并治痔。子宮脫者五味子泡洗。陰戶不

閉或真陰大虛致脫者大鰲甲一個破去腸雜連頭煮

爛細帕蘸汁滴之其頭連骨煨研摻傷冷者用硫磺四

兩吳萸兔絲子各一兩半蛇床子一兩研每用五錢煎

湯溫洗無硫磺用川椒或煎香油坐其中皂角末取噓

白收或油紙燃點火吹滅熏鼻。陰脫如脫肛者硫磺

烏賊骨各五錢五倍二錢半敷。升補法見子腸不收

註。婦人淋症填鹽於臍切葱一把扎好放鹽上熨斗

熨之。淋血者照血淋治。陰翻澤蘭煎洗。陰笑蛇

床子烏梅熏或鯽魚生煎油塗。陰挺雄黃輕粉各一

錢冰片二分葱管黎蘆二錢煨研先用川芎當歸白芷

甘草龍膽草五錢煎洗再上藥。陰癢濕熱下注生蟲

明礬納之又蛇床子一兩苦參五錢川椒艾葉各三錢

葱白五個煎熏并洗猪肝香油炙香貼雞亦可皆引蟲

或用塘棲疔藥能殺蟲甚效陰旁腫痛手足不能屈

伸四季葱入乳香末搗餅置於陰兩旁自愈陰門生

瘡生甘草銀花元參土茯苓蒼朮白芷茶葉桑葉苦參

葱白蒜梗槐枝花椒等分煎洗再用三仙丹底一錢黃

連大黃無名異各一錢象貝蘆甘石黃柏各二錢輕粉

升過樟腦各五分猪膽汁麻油調搽○子宮大痛不可

忍五倍明礬煎洗并敷○婦人隱疾乾癆婦女經閉久

每多諱言錄此令識字者可自治也乾癆則成乾癆即

乾血豈扁蓄胡椒能愈乾血癆扁蓄二錢地黃一錢半

癆也用線帶住納陰內三寸許病淺者臭穢盡出見鮮血即

下深者五六日亦下忌房事麪食魚腥此方見幾希

錄或先將藥作餅貼兒病胎毒居多凡兒病大半胎毒

仲景海藏均有納法兒病胎毒居多小半傷食外感風

寒十之一大率脾虛肝盛腎水弱心火旺肺金受制

○治胎毒雄黃黃丹乳香沒藥白芷王不留行木猪膽

汁塗小兒胎毒胎瘡頭上紅赤痛癢遍身無皮白附

子蛇床子黃丹各五錢羌活獨活白鮮皮滑石雄黃枯

生三日身上紅腫謂之油風爛草鞋灰菜油敷胎瘡
生槐枝六兩麻油二兩熬鉛粉收輕粉一錢熟石膏三
錢和勻塗治胎毒重舌馬牙牙根腫脹并治臍風驚
口及口舌生瘡桑樹日出時用刀斫二三下少頃其漿
自出和蜜塗之立愈金墨亦妙又重舌驚口白芨磨
乳塗足心重舌木舌竹瀝調髮灰塗舌上小兒頭面
肥瘡禿瘡黃水瘡一切惡瘡松香用葱汁煮過一兩川
椒輕粉各二錢飛黃丹枯礬各六錢香油調塗甚佳
小兒一切熱瘡雞黃五個髮一團同熬少頃液出取塗
或人苦參末塗之一方單用髮熬液亦佳口角爛瘡
髮灰猪油塗竹衣垂并無皮膚膿血淋漓赤剝楊梅
一切胎毒蘆甘石用黃連水童便製過一兩黃柏用膽
汁塗炙甘草皮燒兒茶赤石脂各五錢菜豆粉炒七分
冰片五分麻油煎雞蛋取油調塗并治婦人陰蝕爲丈
夫梅毒所過者毒重加犀黃珍珠塗胎赤生地甘草
連翹花粉水抹浮萍搗爛取汁調赭石撲硝敷小兒
丹毒亦胎毒也然大人亦有之其症紅腫痛癢遍身皆
有游走無定或初起白斑漸透黃亮搔破出水濕爛者
爲水丹又名風丹多生腿膝屬脾肺有熱而夾濕也又

色赤而乾發熱作癰形如雲片者為赤游丹屬血分有
火而受風也又偏起白泡無熱無痛為冷瘡即冷丹由
火毒未發肌膚外受寒鬱而致也又有腰間紅腫一道
名纏腰丹亦名纏蛇瘡又有雞冠菜莢等名甚多總由
心火三焦風邪蘊結而成自胸腹起於四肢者順反是
逆治宜涼血清肝消風養血為主○火丹大黃黃柏
栢葉蚬糞各五錢赤豆輕粉各三錢雞清和水調敷
如雄黃青黛石膏滑石龍膽草黑山梔木鱉仁枯礬水
龍骨鐵銹馬蘭頭汁青苔松毛瓦花雲臺菜馬齒莧南
瓜水皮硝任用○按飛灶丹從頭頂腫起漸發紅腫頭
項俱浮眼睛紅色用葱搗汁塗須令病者倒卧將汁自
下潤至巔頂其毒從頂上百會穴出否則毒侵喉矣凡
丹毒宜用砭者亦如此鬼臉火丹滿面頻出膿血發
癢難禁者爐甘石煅入黃連汁淬三次陳膽星輕粉各
一錢熟石膏二錢官粉七分冰片二分摻丹從臍起
檳榔末醋塗蚬糞用白糖搗敷或用墨汁塗纏腰丹
遍身起泡如蛇纏有赤白纏白芨雄黃水龍骨研無根
水或麻油敷先用燈火向兩頭燒五次兜糞杓上竹
篳燒灰研香油或麻油調敷糞桶篳亦可即血泡皆治
或蛇蛻燒灰以童便和毛刷板浮泥調敷或蠶砂雄黃

麻油塗或蠶豆殼燒存麻油塗并治天泡 白蛇纏枯
漆水敷四圍硃筆點之或杉木皮一塊燒存入水片敷
或白螺螄殼七個杏仁七枚輕粉三分研敷此方加松
黃并治下疳。丹毒入裏腹脹欲死於毒氣所走處砭
去惡血以伏龍 乳傷尤甚 乳食過飽生冷不節脾虛則
肝雞子清塗 瀉胃虛則吐久則成爲慢驚

與須識陰虛之體并知嬌膩之情 哕呼初以通秘 初

生二便不通用哕吸法大人嗽口哕呼兒前後心兩足
心手心臍下紅赤爲度。附方小便不通遍身腫滿蘇
葉煎燠囊腫光亮疼痛蟬蛻洗蘇葉敷或蘇葉香油敷
雖皮破子出亦效又陰縮入腹者寒也硫磺吳萸末研
大蒜塗於臍下蛇床子炒布包裏 擦捏並可鬆肌 無論
大便不通用葱豉鹽敷臍法 大人以指蘸溫水擦兒兩鼻孔
外感及痘疹皆可用

上推二十四下印堂分開二十四下食指中指下擦各
三十六下擦上十二下掌上運八卦周旋擦一百二十
下於虎口及手足接骨處其穴有窩於各穴窩用力各
捏一下臍下丹田背後兩飯匙骨下及背脊骨節間各
捏一下任其啼叫汗出肌鬆白愈避風爲要。此亦推

拿之一端但得臍風燒其臍輪臍風臍內入風也最爲
其意勿用重力
心眼角必有黃色乳內必有小核先擠去乳內核臍有
青筋以燈心於青筋頭上燒之筋縮爲度。又方燈火
燒臍門一下人中一下承漿在下唇垂下處正中一下
兩手大姆指外側少商穴各一下臍輪繞臍燒六下如
式臍帶未落於帶口燒一焦既落於落處燒一焦其
十三下効又臍風生地生葱蘿蔔子田螺肉等分搗
爛搭臍四圍一指厚抱住一時泄屁愈。附方臍腫
荊芥洗蔥葉貼肚臍突腫神方赤豆淡豆豉南星白
斂以芭蕉根汁調或雞子清或醋調敷臍傍四旁尿利
愈又臍中出汁赤腫者用赤石脂煨敷或艾灰敷
口撮抹其口角口撮症大便必熱宜大黃。撮口者初
看齒齦有小泡以指蘸溫水擦破之一用白鹽炒研
蜜調敷唇口或用南星水片研薑汁調擦牙齦口自開
或用蟬蛻僵蠶薑汁炒研硃砂麝各五分蜜敷唇上并
抹口角。附方小兒口病雞蛋白生香附生半夏作餅
貼足心前口塗雞矢以止夜啼有四症寒則腹痛面青
舌門可參看

舌則不能吮乳犯客忤或觸生人氣皆啼。熱者男用
雄雞糞女用雌雞糞塗臍并治兩腮腫硬名疳腮亦名
螳螂子珠砂方見前。小兒鎮心解熱退驚安神除煩
躁止啼用羌活防風天麻薄荷黃連甘草全蝎僵蠶陳
胆星各三錢犀角片乙錢油熬丹收以硃砂一錢牛黃
五分冰麝少許攪勻攤貼胸臍。受寒曲腰而啼者腹
痛也葱鹽炒布包熨。按心主驚肝主風脾主困洗蛇
肺主喘腎主虛小兒五臟虛實所主宜觀醫書
蛻以去胎垢身如蛇皮鱗甲名胎垢蛇蛻煎洗蠶亦
黃栢末葱汁麻油疏表月內傷風鼻塞發搐蠶細
膽汁敷葱汁麻油疏表大人掌上搓熱貼顙門又兒發
熱用葱白搗汁加麻油和勻指蘸擦兒心口頭項脊背
諸處疎通腠理不傷正氣名疏表法按小兒貪睡口
中氣熱呵欠煩悶者傷風頭目雄黃雞白清裏若風寒
痛畏人畏寒者傷寒山根必青裏或有停滯鬱熱口渴
裏或有雄黃末調勻用婦人髮團蘸擦兒之胃口寒天烘
油加雄黃末調勻用婦人髮團蘸擦兒之胃口寒天烘
暖用能滋陰退熱拔毒涼肌倘身無熱惟啼哭焦躁者
去雞子清專以麻油亂髮拍之仍敷胃口即時安臥名

清裏 菖蒲開閉 風痰閉塞昏沈不醒用生菖蒲生艾葉

法 從頭項胸背四處乘熱往下熨之薄荷同之 小兒風熱

痰自豁然凡閉症皆效名開閉法 薄荷一兩大黃當歸赤芍甘草五錢僵蠶炒一錢麻油

熬黃丹加六一散收通治小兒五藏蓄熱敷胸亦治丹

疹 菉豆解煩芙蓉共之 心煩熱及麻毒等面赤口渴五

及兩手心更以酒麴研爛熱酒和為二餅貼兩足心名

解煩法 水粉即鉛粉或用宮粉或用菜豆粉全。又

熱症皆可用雞子清調菉豆粉敷如喉閉敷頸上吐蛔

也。雞上瀉血敷臍下吐者塗兩足心瀉者塗額門皆法

貼頂門一貼肚臍急驚貼臍亦治馬牙重舌蛇舌吐舌

諸 搓煨薑而通脉 厥冷者用煨薑搗汁和麻油塗兒手

症 封酒萸而納氣 虛脫症吳萸五分酒和餅封痰喘醋礬

包於脚心 痰喘症生礬米粉醋和餅包足心一宿痰自

下或咳嗽發喘鼻扇肺脹明礬一錢白蜜調

擦胸○按痰乃風苗火靜伏脾火動則壅肺痰火交
作則咳嗽喘急宜泊肺又治小兒肺張胸滿喘粗氣
急兩脇扇動兩鼻竅張痰涎壅塞悶亂喘噎死在朝夕
白丑黑丑各半生半炒各取頭末五錢大黃一兩檳榔
二錢半木香一錢半末入輕粉一字和勻蜜水調餅貼
臍內微利為度即一捻金也又治寒邪入肺寒鬱為
熱痰喘上氣肺脹胸膈若不速治即不救硃砂二錢半
甘遂一錢半輕粉五分為末每取一字以溫漿水少許
上滴香油一點抄藥在油花上待藥沈到底痰結薑附
去漿水取藥用名馬脾風散亦如上法敷臍痰結薑附
貼於胃口胸有寒痰濃厚青色不時昏絕者生薑一兩
芥同熨子疳衰羊脬掛於胸疳血乾也積滯久則生熱
搗貼胸口疳疔羊脬掛於胸熱久生蟲大都脾胃傷津
液亡之所作也有五疳屬五藏肝疳脾疳肺疳心疳腎
疳也腎疳即走馬疳腎虛受邪疳奔上焦初作口臭次
傳齒黑齲齲出血甚則齒脫最險外有蛔疳脊疳腦疳
乾疳疳渴疳瀉疳痢腫脹疳無辜疳丁奚疳哺露疳皆
危其證頭皮光急毛髮焦稀腮縮鼻乾口淡唇白兩眼
昏爛或目脊聳體重鬪甲咬牙焦渴白汗漩白瀉

酸吐肝腸鳴結癖潮熱或身多瘡疥酷嗜瓜果酸鹹炭
米泥土多飲水者是也詳見醫書。治疳積羊脾吹起
陰乾入汾酒二兩掛兒胸口問消即去之。凡小兒肚
大青筋身熱肉瘦牙疳口臭腹痛蟲積黨參白朮當歸
生地胡連枳實青黛蘆薈青皮陳皮三棱莪朮胆星大
黃巴豆黑丑白丑苦楝根木香檳榔木鱉全蝎胆草山
查神麴靈脂僵蠶明雄炮甲蟾皮皂角柴胡地骨皮黑
山梔輕粉元參羚羊角各一兩麻油熬黃丹收硃砂二錢
石膏滑石各四兩攪。腦疳頭皮光急頭髮作穗或有
頭瘡腫至顙顙腫則多損眼頭軟倒肥而不瘦附子生
南星末薑汁調貼患處。又腦疳滿頭餅瘡腦熱如火
或鯽魚胆滴鼻。諸般疳瘡瘡乾蟾皮灰三錢黃連二錢
青黛一錢加麝數名玉蟾散須先洗。洗疳瘡藥甘草
黃柏馬鞭草連根葱荊芥穗煎湯洗訶子燒灰入輕粉
麝少許摻之。走馬疳疳見前。治小兒面耳疳瘡下疳
諸般惡症牛糞尖經霜者佳瓦上炒灰加水片一分礪
砂二錢人中白煨皮硝雄黃各一錢明礬五分吹如牙
疳只川牛糞灰冰片摻即愈。小兒口患不能吮乳及
乳草牙疳等白蠶蠶去絲嘴全人中白冰片擦。又日

疳甘燕皮灰吹。小兒患疳有天柱骨倒者。或煨蟾與一可用五加皮末酒調敷項骨上乾易效。

研蠶

見痞癖皆塗莧甲

甲在中脘癖在兩脇敷前有鼈

甲驚勻蜂蜜擦於背

急驚有入候兩手伸縮十指開合勢如相撲頭偏不正身仰向後臂

如開弓目直似怒睛露不活此實熱症宜清涼忌辛燥

攻擊風藥助心火。又有欲出痘疹而驚搖身熱者勿

誤用藥致毒內攻。治急驚用蜂蜜放掌上開水和勻

擦兒背心鉏出黑毛愈。附方以布襖兒髮抱烏毛雞

手上蹲吸或以雞尾對兒臍無風雞必遠去有風雞必

貼緊慢驚亦可用。又治急驚代赭石一兩研末醋敷

足心小腿上有紅斑效。老蜆當中切斷跳一段治急

驚不跳一段治慢驚同麝搗敷臍然治急驚為效。按

急驚由內有實熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家生

風而發搐肝風心火二臟交爭血亂氣併痰涎塞壅所

以百脈凝滯關竅不通風氣蕃盛而無所泄故暴烈也

治法通關截風定喘去痰其熱尚作則下之洩後急須

和胃鎮心。開關用皂角半夏喘鼻名噎驚散。噤口

用南星皂角。廬蠶蜈蚣麝香研末生薑蘸擦牙。利痰

理禽辨文

重

用前青金錠入木香汁和蜜擦胸。○定驚膏治肝風驚
搐并胎風兼清心法羌活防風川芎當歸龍胆草梔子
蠟梢生甘草薄荷竹葉加黃連麥冬膽南星赤苓硃砂
雄黃木通生地丸臨用生薑汁化開擦胸此方治熱。○
小兒急驚風錠子麻黃四兩甘草二兩蟬蛻僵蠶全蝎
各二十一一個陳膽星一兩白附子防風川烏天麻川芎
白芷黨參南薄荷白朮木香各五錢乾薑四錢煎膏蜂
蜜二兩牛黃冰片輕粉各三錢麝一錢硃砂雄黃各八
錢和捏爲錠臨用淡薑湯同白蜜磨擦胸背麻黃麝香
同用發散而不引邪妙并治風癇破傷風諸風皆良。○
又急驚祕方治咳嗽驚癇發搐發熱喘痰涎上壅痰
厥跌倒膽星全蝎各一兩牛子五錢硃砂四錢巴仁三
錢糝薄荷膏貼心口加大黃一兩五錢黑丑七錢五分
膽星半夏枳實各五錢牙皂三錢油丹熬貼亦良薄荷
可用二兩入膏同熬此方合用。或抱雞與截蚓上吊癇
行而不泄。按小兒急驚險症。並嘔飛龍。則天吊與癇病皆驚風症。但天吊頭目仰視癇
吊有九龍控涎散治癇有三癇丹皆用蜈蚣或加全蝎
等味。○治小兒天吊目久不下眼見白睛及角弓反張

并不出者大蜈蚣一條去頭足酥炙用竹刀剖開記定
左右各入麝半分研末包定每用左邊者塞左鼻右邊
者塞右鼻以眼下為度。附方雄黃五錢砂仁六分梔
子五枚炒冰片五釐雞子清調敷肚之四圍如碗口大
留出臍眼入麝少許棉紙蓋軟帛扎一周時洗去治急
驚等症。烏紗驚風偏身皆烏者用黃土一碗搗末入
酒醋一盃炒熟布包引下至足刺破之。又生人驚
亦能抽搐勿作風治雞子清調灶心土敷頂門及心口
硝棗皮硝軟堅以棗和之於攻加補治疳積傷食生蟲用皮硝三
苦杏仁生梔子各七個酒糟一兩白灰麪三錢搗勻貼臍眼命門三日後肉見青黑即效體瘦甚則
著苓當倣肥兒疳病虛中有積腫脹泄瀉及疹後將成
草製厚樸檳榔山查麥芽神麴陳皮益智仁木香砂仁
山藥茯苓使君子川練肉胡黃連蕪荑各五錢麻油熬
丹收硃砂一錢攪胡椒並能達下以熱佐寒治驚風杏
貼古有肥兒丸胡椒仁桃仁糯
米胡椒梔子各七個搗爛雞蛋清和飛麴敷臍板心男
女夜脚板黑愈或用胡椒梔子葱白各七飛麴

除下有青黑色效此又一法脾虛極則木附宜從福幼
莊在田著福幼編治慢驚風。慢驚多因吐瀉或久病
得之其症身冷面青或白不甚搖擗目微微上視口鼻
中氣塞大小便清白昏睡露睛筋脉拘攣由脾虛中氣
不足故寒痰壅盛而風動筋急也此陰症也宜辛溫藥
溫中補脾或可衝開諸症自除蓋治本即以治標也忌
蜈蚣全蝎硃砂之屬宜用參朮薑草或胡椒肉桂炮薑
丁香灶心土治之又理中地黃加味法用熟地五錢當
歸枸杞子熟棗仁故紙炙黃耆黨參二錢白朮三錢炮
薑黃肉炙甘草各一錢加生薑三片紅棗三枚胡桃三
個灶心土二兩附子五分如咳嗽不止加菴殼金櫻子
各一錢大熱不退加白芍一錢泄瀉不止加丁香六分
此在田方也又溫中補脾法用製真白朮錢二分人參
炙黃耆八分製半夏七分白蔻仁炒茯苓乾薑炒砂仁
炒各五分陳皮肉桂酒芍炙草各四分虛寒甚者加熟
附子五分老薑一片大棗一枝此聶清江方也治慢驚
之法大略可見矣。下痘症中有人參等納臍及附子
等數臍之法皆照慢驚治者可以推用。按慢驚瀉青
者乃夾驚木克土見木質也摘擷者非風胃氣欲絕也

煩渴者津液內竭也眼合者脾困氣乏神迷也虛痰上
 攻呼吸粗大陰盛強陽覆燈將絕也○治慢脾風黃菁
 炙黨參附子炮各一兩白朮二兩肉蔻仁煨白芍酒炒
 甘草炙各五錢丁香三錢炮薑炭二錢油熬丹收糝肉
 桂末貼臍上再以黃米枕以蟬蛻小兒胎瘡席以雞窩
 煎湯調灶心土敷膏外枕以蟬蛻小兒胎瘡席以雞窩
 驚啼一切以雞點之以蠟膽之并治喉嘶聲啞病後
 窩草襯於席下點之以蠟膽之并治喉嘶聲啞病後
 舌不能言南星浴之以蜂房發熱手搐蜂房煎浴擺以
 末猪膽汁調點浴之以蜂房發熱手搐蜂房煎浴擺以
 鯽魚內熱以小鯽魚尾置坐以螺蛳肺熱脫肛鋪活雀
 兒口中頻擺動之坐以螺蛳肺熱脫肛鋪活雀
 血能塗雀目即雞眼詳龜尿足擦龜胸如龜背用龜尿
 解願有封願散小兒願縫不合名解願屬腎虛不生髓
 用栢子仁防風南星四兩末每用一錢
 猪胆汁調絹攤大小看願剪貼此方涼○又方乾薑四
 兩細辛二分肉桂五分末薑汁調敷願門小兒面赤即
 愈此方溫又方南星白斂醋敷或蟹灰白芨敷○瀉
 痢日久脾氣虛寒願空髓陷附子川烏五錢雄黃二錢

慈根葉同熬膏每早以少許空心貼陷處。斷乳有書

眉丹小兒斷乳用山梔一個雄黃雌黃辰砂麝香二分

三分勿令兒知且忌生人若夏月勿用此方奇驗莫測

痘出於命痘為胎毒藏於命門感天地邪陽之氣而發

皮膚初熱三日類傷寒初證自初熱至報痘類傷寒六

經證六日以後謂之雜證報痘次至收靨謂之常證

痲出於肺痲為肺病痲疹痧瘡南陰陽攸分痲為陰毒

前後彌慎痲前恐其不出是有專科姑明我法痲疹詳

及會通諸書茲但痘為第一關痘為小兒第一關頭

錄其外治之法其形尖圓起發瘡皮厚硬者吉平塌伏陷者凶其色光

明潤澤根窠紅活者吉慘暗昏黑者凶自唇四圍人

中上下起發次及頤顴眼眶太陽太陰正額及於胸背

四肢者吉例從下起者逆起脹灌漿結靨亦然所謂序

也頂額陽位耳後腎位及前後心手足心均宜稀少凡
發熱出痘頭面有一片色如胭脂者胸背有成塊紅者
皆逆遍身如蠶種摸不得手者凶。痘發於肌肉陽明
胃氣主之故始終以能食為寶。痘症有聲音咽喉痛
腰腹痛驚搐嘔吐泄瀉痰喘渴腹脹自汗痒痛斑爛
寒戰咬牙失血尿澀便秘倒靨黑陷護眼滅瘢凡二十
一條及痘後雜症計十二日。以報點日算起三日點出
症俱詳寶鑑。症計十二日。至足心為齊毒尚在內若
熱不退多噴嚏者猶防增出。痘至三日後毒浮於表
當潮起脹頭面腮頰俱腫點皆紅綻以一線圈紅緊附
痘根者吉平鋪散漫地界不分及熱不退而乾枯紫黑
者險。痘至七八日貫漿根之紅者漸提於頂為白毒
己化膿也身帶微熱蒸漿最佳漿不滿足氣血虛也諸
痘有漿而天庭地角不起者逆自頭至足各有一二顆
黑陷者為九焦痘不治凡空漿漏漿疔瘡疳瘡灰白塌
陷血靨倒靨諸症均於此時見之。痘至十日後血化
毒解白者變黃眼開腫消是為收靨之候險症不能辨
色摸其皮面高處微有硬意重按之內內甚軟即是收
靨正期從上靨至下為順若從陰囊腳下起者逆通身
靨而有一二顆不靨又似靨非靨熱不退或有雜症者

猶防有變。○治法一二三日宜解表表疎則痘易出或
用紫蘇荊芥防風牛子薄荷連翹山查甘草之類陽明
實熱邪盛者宜升葛虛者宜柴歸忌寒涼冰伏其出亦
忌參耆閉其腠理并助熱令胸飽氣悶四五六日以涼
血解毒為主免致毒盛不能盡出反內入臟腑然四日
五日已熱退者不必藥至第六日上午大熱不退便祕
可川大黃釜底抽薪之法次用芩連紫草紅花繼之勿
雜入煖藥只須留三分餘火爲灌漿起勢地步若火盡
退去恐開灰白下陷之門如虛寒體切勿用大黃妄下
痘無裏症始終皆忌下七八九日溫補氣血氣血流行
而成漿自易忌雜入寒涼藥致成泄瀉并茯苓等滲利
藥致漿不足十與十一二日以收斂爲主大和氣血補
脾利水自然結靨海藏云痘疹膿而不焦此失清涼之
氣也如五穀得陽氣而成熟非涼風一至則不能實也
須察證候而清涼之則痲矣董氏亦云收結時解毒爲
主勿幫熱助漿痘回至頸黃蓄內託大忌虛者人參黃
連同用所謂引以清涼助以結痲是也又攝生編謂痘
全賴毒火以見苗出齊長漿足漿此毒不可解遂生編
謂痘始終當以補氣血扶陽氣爲第一義用藥以溫補
少加發散爲首務然編中亦有用大黃石膏治實火之

方竊謂不必先執一見當視小兒體氣強弱受毒輕重
隨其時日審症用藥為得其宜 古云虛寒用異功散

實熱用涼膈散起 未發觀耳筋 耳後筋紋水紅色為上
死回生可以為法 杏紅次之大紅者多火

紫筋重兼青帶黑屬腎尤重又條條直上者輕分枝纏
繞多而向下者雖紅亦重橫過髮際者不治 又耳上

屬心熱者輕涼者重耳下屬腎涼者輕熱者重 腎經
痘忌下苗又小兒面薄耳綿聲音澇滯係脾經痘不宜

下 將發辨指梢 小兒五指梢及中指冷是痘疹中指熱
苗 將發於言笑是其候也又看心胸有細點如粟起則真

水癩於言笑是其候也又看心胸有細點如粟起則真
將發痘也 又小兒痘症熱動五藏阿欠煩悶肝也時

發驚悸心也或嘔吐翻胃惡心或瀉手足煩悶脾也面
頰腮赤嗽噎肺也或腰痛喜寐腎也但顯一二症者痘

稀五藏症盡顯為險 凡痘之險症初出圓暈乾紅少
潤也將長光澤頂陷不起也繼出雖起慘色不明也漿

行色灰不榮也漿足光潤不消也漿老濕爛不斂也結
痂而胃弱內虛也痂落而口渴不食也痂後生癰毒也

或潰而 畫八卦之宮 痘看卦宮於印堂下頰兩顴點三
斂遲也 兩額兩腮見本色相生者吉 點三

才之穴風起或肺熱喘嗽喉咬牙浮萍敷足湧泉

尿多紫草泄瀉寒戰癢塌雞清敷胸璇璣黑陷發疔牙疳

敷頂百合燒爐香以辟穢大棗燒烟解之加茵陳同燒

亦免黑陷作廢一用茶葉紅棗乳香薷麝四味和勻燒

更良凡犯穢不起及痘癢一切皆宜蒼朮恐燥血起

張時忌酒與燃油紙以照影神燈照法見前。後亦有

醋均不可用神燈照法。照法紅紙然

燕麻油點燒如欲觀其右燈移於左欲觀其左燈移於

右麻疹則浮於外而肉內無根如紅雲一般謂之朶痘

瘡則肉內有根而極深謂之粒麻宜成朶痘宜成粒反

是逆。又看痘法凡痘形色雖險若燈光影與痘根圓

暈相為周旋根窠紅活漿影深厚則皆可活若根窠不

紅不起血死不活漿無影者雖輕難治故白目亦宜照

之手眼神巧在此又初熱時用燈照

心窩或徧身皮肉有成塊紅者難治

心經之痘桃蕊

燈草搭其顙子心經發痘忽然抽掣與急驚同用桃皮葱

足心合骨處燈火燒一下以散風痰

或用葱敷頂亦可

可勿輕用驚風藥古云有錢難買痘前驚蓋驚則心經

之痘可出也。按桃慈發散燈心清熱痘前用藥之法。倣此其敷顙門及肚臍手足心法乃外治之部位也。痘科古無用膏藥者。惟觀音膏。腎經之痘椒薑豆豉罨其治步。痘閉症貼胸即出。宜推。腎經之痘椒薑豆豉罨其胸。痘出胸腰痛者。豆豉三兩胡椒一錢搗爛將生薑四兩共搗敷胸腰二處。亦是發散法。附方。腎經出痘尾脊骨痛者。芙蓉根馬鞭草搗爛炒敷。又腎經痘偏身痛者。黑豆一升煮爛搗敷腰上。即止。黑豆能解腎毒也。命門出痘鎖眉刺心煩悶不安大熱不退生艾葉一兩黑豆一撮白芥子一錢醋熬一滾搗爛作餅敷心前。數換心安熱退。按痘以四經俱有而腎經獨無為上。若一出即變黑者。腎症也。保元加紫草紅花救之。如偏身俱陷而尾脊骨一團飽滿潤澤。實熱者舌黑口臭者。腎精足也。以法託之。則偏身可起。而祕結虛熱者不臭。敷以蝎防必用大黃石黛。太陽症口氣臭大小便閉痘色紅紫者。用防風全蝎大黃石膏膏青黛敷臍。附莊在田白虎地黃湯治小兒出痘發熱不退口渴喜冷痘瘡黑陷小便赤臊大便祕結口鼻氣熱等症。用石膏當歸各三錢生地木通各二錢枳殼澤

瀉甘草各一錢大黃一錢半以行爲度燈心作引熱退
身涼卽宜平補用荆防地黃湯調理之卽熟地四錢山
藥二錢荊芥丹皮防風雲苓山萸生甘草各一錢加生
薑二錢黃酒一盃也補血散毒血虛者初出時卽用之
痘易灌漿氣虛頂陷者與補中益氣相間用。按痘症
小便不通細茶嚼爛紙包敷臍或樟樹皮蔥薑艾共搗
炒熱敷小腹上女子放陰上卽通虛寒者眼白肢冷而
一元散亦妙大便不通膽蜜導之
吐瀉糞黃臭穢小便赤澀者爲熱泄毒氣奔越也痘必
紅紫宜五苓散藥料若糞青白清利者虛寒也痘
必淡白宜木香砂仁肉蔻訶子龍
骨枯礬赤脂等藥料不可不審覆以雞酒尤須附子
薑香小兒體性怯弱或吐瀉後元氣愈虧不能勝毒汗
出肢冷似睡非睡眼中露白症似慢驚用附子乾
薑各四錢丁香陳淡薑各三錢小雄雞一隻共搗爛
再用燒酒略炒溫敷臍上及兩足心數次如泄瀉加灶
心土三錢痘自出。附方上身痘已起脹下身痘尙未
出或出而下陷不起用熱燒酒細帕蘸熨之自出或再
用燒酒噴雄雞敷臍眼一炷香再換數換白起又腎
經痘初起腰痛身如被杖背不能伸或連尾脊骨痛者

亦用燒酒噴雞敷腰上。限一炷香。雞青臭再換。痘白出。又後生輩或失陽之症。方發痘欲出不出。狂言亂語。此痘毒不出。鬱火攻心。既不敢用清涼之藥。以解毒。又恐驟用補劑。以助火。最難措手。用燒酒噴雞敷於臍上。痘白出。語亦止。此從外託內神方也。貧家尤宜。又厥陰痘。出一半。忽然厥冷。目閉面青。唇白者。用燒酒噴雞敷臍。如不噴。燒酒或塗雄黃麻油於雞內。亦妙。雄黃肝經藥也。此又是一活法。可類推。凡熱症。方形虛症。又起元虧。毒重。及欲補而不敢補者。均用此雞酒方。或加以藥尤妙。○按痘身涼不溫。色白不紅。及根無紅盤頂。含黑水者。乃陽虛也。宜大補元煎。莊在田大補元煎。治痘症。悞服涼藥。嘔吐泄瀉。不起發。危在旦夕。用熟地。止錢黨參白朮各三錢。山藥杜仲棗仁杞子。故紙炙草。肉桂各二錢。黃肉附子各一錢。加生薑三錢。大片好核桃仁三個。如泄瀉不止。酌加附子。更多。加龍骨栗殼各一錢。倘泄瀉全止。減去附子。若附子太多。則小便恐閉。若痘後調理。此方須減去附子。只用肉桂數分。計日可以復元。又六味回陽飲。治小兒氣血本虛。痘瘡白塌。或悞服涼藥。嘔吐泄瀉。危似慢驚者。速用此方。如有轉頭。卽加入大補元煎。內名返魂丹。用黨參當歸各三錢。肉桂

二錢附子炮薑炙草各一錢加胡椒細末三分灶心土
三錢或減去附子二方可參。按痘症不外虛寒實
熱四字觀廣編所載外治方與莊在田遂生編相較則
知內外用藥一理而外治為尤穩疑難之症可免失手
或則鬱甘寒永杏胡瓜萸痘出脾經本順症也若穢沖
啞氣急者用甘草一兩寒水石鬱金各五錢煮乾為末
入麝香蜂蜜調敷胸前按痘科小無比散治焦黑潮
熱煩躁用石膏寒水石鬱金甘草加滑石六兩亦有再
加紫草紅花生地磨犀角用者可參。肝家痘便血眼
紅丹砂滿面紫黑不起白頸老蚰七條焙瓜萸仁三十
粒去油杏仁十五粒去皮尖共末陳茶調勻作餅貼臍
敷換諸症悉退按熱毒盛極有用生大黃麻黃升麻
川芎烏藥神麴白頸蚰者黑陷發搖目直喘急有用地
龍一兩蟬蛻五錢乳香湯調者皆可參。胃經痘喉閉
失聲不思飲食上吐蛔蟲下瀉惡血即用前菜豆粉雞
子清敷法喉閉敷頸吐蛔敷臍上瀉血敷臍下良方也
按焦乾黑陷身熱如火者可用犀角羚羊井水磨塗
口或則乳没人參芍歸生地冷汗者陰盛陽衰也人參

乳香沒藥各一錢研末水丸納臍艾葉炒熱鋪於丸上
源出東垣慢驚土旺木衰之義用人參炙黃耆各二錢
炙甘草一錢生薑三大片名保元湯氣虛及陷者主之
與莊在田用補中益氣同如氣虛而血弱漿不滿者加
川芎一錢官桂五分糯米助漿甚效可搗餅貼保元有
芍此方用糯米解毒助漿甚效可搗餅貼保元有
連翹荆芥防風牛子紅花黃芩赤芍用者補氣活血散
火解毒亦可取法痘科皆以保元為主湯其加減方
甚多茲不備載又莊氏大溫中飲用保元湯藥料黨參
三錢黃耆甘草各二錢生薑三片加熟地五錢白朮三
錢山藥柴胡各二錢麻黃肉桂炮薑各一錢杜心土煎
水入黃酒和補氣血散寒邪提痘漿散痘毒凡嘔吐泄
瀉頂陷空殼痘色不紅將塌陷者與大補元煎間用汗
多去麻黃○彙精十二味異功散治元氣虛寒痘疹色
白寒戰咬牙泄瀉喘嗽等症黨參丁香木香肉蔻仁陳
皮厚樸各二錢半白朮茯苓官桂各二錢當歸三錢半
製附子製半夏各錢半薑一片棗二枝陳氏云陽明主
肌肉胃氣充足則肌肉溫暖光澤起脹而無痿塌之患
此方主之數方均可敷貼亦從用參而推廣者○又

時值瘧疾而復出痘口吐白沫咳嗽失聲生薑切片包
大附子煨再取生薑汁和當歸白芍生地共搗爛敷臍
白沫白止按痘疹氣血不足者可以此方加減用之
如九味異功煎用參歸薈附熟地乾薑桂丁甘草六物
煎用參芍芎歸甘草熟地或生地是也熱初當散其熱
二方亦有加減法可倣用茲不備載
初發熱未曾見點可以表汗以葱白煎湯熏之并治麻
疹又發熱三日末見形跡宜以生酒塗身上時看之狀
如蚤痕者是癰也按表汗有加味敗毒散用柴胡前
胡羌活獨活防風荆芥薄荷枳殼桔梗川芎天麻地骨
皮各五分加紫草蟬蛻紫蘇麻黃同葱白煎者可以參
熏○痘症發熱胡言亂語以冷水拍其手足心更用吳
萸末熱醋調敷兩足心引熱下行如點稠蜜者以水調
吳萸末敷足心一時許小兒覺足心熱即去之又痘毒
狂熱由脚麻至小腹而死或由頭麻至心口而死一日
死幾次者亦用醋調吳萸敷足心又發熱不退者生
羅蔔搗和鉛粉敷足心熱極者燕窩泥搗標內須透其
以雞子清調敷臍熱退去之不可過分標內須透其
標董氏標內擦法用芝麻油每夜卧時以手中三指沾
油擦兒頭額頂背腰兩手腕兩足腕然後睡即可候

輕此亦暢達流通升脫凝滯之義也。附方痘出不快煩渴悶亂卧睡不安咳嗽者艾葉一碗胡椒三十顆搗爛調水取汁熬膏敷臍諸症。隱浴水楊蟬蛻之煎隱者悉退凡透標之藥做此數不出隱於皮膚肌肉爲出不快非風寒擁遏卽是氣血不振日久變爲紫黑矣。○通治風寒氣血楊柳五斤春冬用枝夏秋用葉長流水煎濃汁乘熱浴洗良久以油紙燃照之纍纍然有起勢陷處有圓暈紅絲此藥影也漿必滿足如不滿又如前浴弱者只浴頭面手足勿浴背如照無起勢則必添湯久浴使透徹肌肉疎通內外令毒氣隨煖氣而發此藥能升提開豁萬竅有起死回生之功凡當出不出當脹不脹當貫不貫當磨不磨均爲陷伏倒靨並用水楊煎浴亦治痒。○附方水楊柳卽水黃荊子也根葉子皆可煎湯以細怕蘸其熱氣頭面上輕輕按摩數次使皮面鬆爽痘易出。又黑痘用忍冬藤湯煎浴亦名水楊湯。又有用水楊柳桃枝桃枝紫背浮萍煎浴者有用銀花紅花紫草煎洗者。○痘疹出不透或腹痛用蟬蛻甘草煎湯浴。按痘出不快或陷伏倒靨一切惡候用黨參黃耆川芎甘草紫草茸木通木香各等分蟬蛻減半入糯米煎湯浴之甚良。○附

方痘不起脹或陷伏宜用黍稷煮湯或芸臺煎湯或
兔皮毛煎湯或臘猪肉煮湯或馬肉煮湯皆可浴

燻荔枝猫爪之烟子閉者風寒內閉眞痘不出也或如麻

荔枝燒烟熏之則眞痘出而癢自止矣夾而出也塗麻黃於胸背痘有從

不可作斑治貫臙時雖斑亦化眞斑症只在六日中

凡夾斑夾疹夾丹而出者此血太過也麻黃雄黃塗於

青布上貼胸背二處一用土硃紫草敷見上紫草化斑

之要藥也如紅斑變黑必死。附方小腸經出痘偏身

發斑片紅片紫如雲如霞無眞痘出不省人事者用芙

蓉花川椒胡椒共末紙捲爲條蘸麻油用燈蓋盛之照

於被內覆蓋一時其斑自退而痘出矣。按紅斑紫斑
稠蜜者宜用生地黃連黃芩防風荆芥連翹梔子紅花
赤芍等以化其毒重者加元參茜草石膏犀角。又夾
濕瘡而出濃水流注者滑石末敷之以防洩氣或萊豆
粉敷如有夾火瘡及頭上脂梨者皆濕瘡類也脂
梨可以棉紙糊之痘落痂而此亦落最妙法 雜而
湧也揩硃砂於首尾雜痘一齊湧出用硃砂一兩同油

身一搭雜痘盡出正痘即現。或用柳葉艾葉及前楊枝等浴法。按解毒奇方未出者不出已見苗者出亦稀若陷沒者立時即起用川芎當歸升麻生甘草各六兩先熬去渣將硃砂一兩絹袋裹之懸空入藥水收乾聽用此製硃砂法甚良可參。又化毒黃蜡丸用硃砂五兩爲君加生地當歸各一兩人參犀角各五錢川連黃柏荆穗葛根生甘草各四錢白朮八錢牛蒡子連翹各七錢升麻二錢牛黃一錢五分右切片將硃砂打如菜豆大絹袋裝縫以水十碗酒二碗同藥入砂鍋內文武火煮之只剩一碗汁爲度搥淨拌硃砂曬乾爲末以猪心血調糊爲丸每九乾重五分凡痘初出即用薄荷湯調一丸用痘即減少輕快神效。原云此方用硃砂仍用補氣和血解毒快斑託元清心諸藥佐之硃砂鎮心安神解週身之毒其功甚大一加紫草茸一兩尤妙并治痘瘟痘疔倒靨倒發始終痘痛毒甚危急之症剖一用硃砂牛黃加冰片麝香用猪尾血丸亦可參。

白鴿覆其胸斯粒自起。無白鴿用前雄雞方全皆補。包正拔毒之法治痲亦用白鴿。

老蟆對其口斯漿自生。痘不起漿癩團包其身爪以大口對兒口離三寸許吸其毒。

而虛軟盜氣之賊血泡銀硃同木鼈子摩

賊痘顆粒獨大按之虛軟

根脚不腫先起先灌盜正痘之氣血者也

過三日或變

成水泡血泡甚則紫泡黑泡宜銀針挑破

塗油胭脂

賊痘微有漿色水泡則全是水亦宜挑破

或塗油胭脂

或以芫荽酒調宮粉塗之遲則潰塌

又有血泡乃血

熱毒熾不能運化成漿也熱甚則紫微熱則赤

宜涼血

解毒用生地赤芍丹皮黃芩白芷紅花牛子紫草之類

凡白泡血泡木鼈子磨銀硃塗之自消

肺火發而皮毛受傷并其膚間津液遂發而為泡也

白

而空者氣虛清水者肺實紅紫者血熱也皆內毒未出

而賊邪先為之病宜內託以行血氣則正痘自長

發隨收皮脫見肉不治○莊在田曰偏身血泡者非血

熱乃氣少不能統血故血妄行宜大補元煎使陽氣充

滿血泡變白而成功矣勿誤用

脹而乾硬閉毒之苗舌

寒涼致成血陷此亦不可不察

疔銅綠和人中白擦

紅痘中有紫黑乾硬暴脹獨大脚無

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

之禍苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

拔疔散敷之即明雄黃二錢棉胭脂五錢浸汁也一如
紫草又京城油胭脂塗甚妙如挑不動捏之有核則疔
已成須割開四邊錯出其疔否則深陷穿筋透髓而爛
見骨可畏也又外無疔而內有核作痛者亦疔疔燈火
燒之凡疔以銅錢眼合疔上再燒則準又有似瘰癧發
無定處者以手撮起紅線縛定艾燒○治疔四聖膏珍
珠豌豆髮灰冰片等分油胭脂和膏挑後填之即紅活
會通加雄黃紫草茸去胭脂亦治黑痘又脚心痘為注
疔痘亦剔破塗四聖膏又拔疔丹珍珠一錢牛黃巴
霜鐵將軍各五分蟾酥三分麝二分油調塗○凡天庭
有黑點心窩舌上必有疔地角有黑點陰處必有疔兩
顙有黑點兩腋必有疔準頭有黑點四肢必有疔即顯
可以知隱舌有痘疔銅綠人中白加雄黃銀硃砂
研擦油胭脂亦妙○按入門云頭面上忽生三五個或
止一個高大紫黑儼似疔痘者名曰飛痘此癢則點以
最輕或只此一痘再不生痘此亦不可不知癢則點以
荆芥其後必成灰白癢塌如見有數點即挑去急補氣
血○痘宜痛不宜癢○癢用荆芥穗末捲紙撚燒之擦
去灰快手指定癢痘一點即止或用荆芥茶葉捲紙撚

燒照亦止否則防塌矣。附方用川椒艾葉紅棗肉芫

萎茵陳乳香白芷梢陳香圓安息香末作紙懸照雖

癰塌之痘火到癰除無安息亦可此神燈照法也或

用鹽和百草霜炒燒烟熏或蜜水拭或滑石敷抓破者

松毛陷則拭以升麻白而變灰血不足也黑陷者由紫

而變黑血太過也血陷者由血泡無漿而變為陷也。

化毒宜用升麻紫草甘草糯米。黑陷不起升麻煎濃

湯入胭脂十餘張浸揉取紅汁加明雄末錢許即用烟

脂棉蘸湯拭瘡上活血散毒甚妙。附方珍珠琥珀明

雄漂珠砂香附川山甲雄鼠糞各一錢蟾蜍三分人乳

浸研共為丸如毒盛者用一丸入前湯拭。又黑陷心

煩氣喘安語見鬼者用不落火猪心血和冰片。空倉

問痘水安息貼。可陷乾收柴歸樺枰葱酒煎蒸。空倉

合填紫草破用脂膏加紫草末填之自成膿可結痂

漏孔且塞松花。漏孔者漿成而漏元氣虧而肌肉不固

松花研末塞之外治聖藥。有小孔宜補氣健脾固表

名漏漿散用人參兔絲子查肉黃蓍歸身桑皮川芎白

名漏漿散用人參兔絲子查肉黃蓍歸身桑皮川芎白

芷之類 實漿時成片作爛濃水不乾者宜用敗 曆未
草散即壇頭上陳稻草燒灰敷之此漏漿痘也

結而勢爛牛糞之散收之 痘破爛不屬陳乾牛糞燒存
取白色者敷名白龍散或鋪

床上令兒臥之。附方川連黃柏地骨皮五倍子甘草
共末搽之此方會通名生肌散 又痘破爛身無完膚

茶葉去梗滾水一燂即撈起濕鋪牀上蓋草紙令兒臥

之一夜膿乾或芭蕉葉亦可 痘瘡斑爛煩痛或臭爛

深坑不收口用芭蕉葉末調猪胆汁塗之 多年墻屋

上敗稻草燒灰摻 新瓦搗粉糝如乾痂堆積內有瘡

膿用鴨蛋清調敷 痘後翻紅腫爛象牙末珍珠末各

三錢炒殭蠶兒茶各二錢調胭脂膏敷 又痘疤橫痃

并治下疳一切瘡上白螺殼煨研一兩橄欖核煨研石

膏各二錢每藥二錢加水片一分麻油調塗。按痘毒

出盛表虛難靨以致肌肉壞爛名曰斑爛如偏身 痂已

臭爛如餅搭目中無神者死 痂落白色無血者死 痂已

落而痕乾蜂蜜之油潤之 如痂落乾燥用白蜜半中入

之乾硬而痛者猪油潤之或用麪店灼油微子油 咳嗽

亦可。滅癍散羊骨髓輕粉煉塗蜆水洗 陀僧搽

方見嘔噦痘初熱吐瀉無妨出後忌。嘔噦者毒內攻
前註嘔噦之兆也。嘔吐男左女右白芥子調酒敷足心
覺足心熱去之。脚心有痘勿用此方并治痘出色不紅
潤毒盛壅塞者。○附方黃騰時欬逆胃氣上越也。真淨
黃土鼻邊嗅之。白汗多則難貫膿收靨。血吐便溺痘
黃連貝母牡蠣各五錢糯米粉一升撲之。或菲菜汁滴之
出齊鼻血無害。但不宜甚耳。髮灰吹之。或桑寄生同
凡血症皆可用。又痘時血吐血栢樹上桑寄生同
黑山梔搗敷臍如無寄生單用黑山梔亦可。或酌用他
血藥代之。起脹時便血血既下漏安能起脹用地榆
生大黃紅花根調勻敷尾脊骨三炷香一換換三次。即
止如夾斑疹用前斑疹方。尿血不治膀胱根於腎此
經見血腎水被火耗絕且血與尿不同血凍眼應早護
而尿不凍也。凡血見黑不治眼耳血不治眼應早護
免痘入眼牛蒡子搗爛敷額門痘不入眼出痘眼目紅
腫雞蛋清塗黃紙貼之。或銀花嚼敷。或黃豆嚼敷。或黃
柏浸濕鋪眼胞。或胭脂汁人乳點。眼中出痘象牙磨
水點痘白退可免。或加雄黃明礬或用麥冬貼足心
痘白落。又蜚蠊蟲放眼皮上周圍游走吐涎水其
痘白散屢試如神。喉中有痘亦可用。眼有膿血鬼子

糞油調搽 護眼膏黃栢紅花菜豆甘草爲末胭脂水
調敷眼之左右痘不入眼 初起發熱風火透於皮膚
眼閉不開內結痘瘡者用益母草白菊花夏枯草防風
荆芥穗白芷甘草七味煎湯燻洗日三次更用鱖魚血
點之不生蘿蔔花痘後餘毒鬱結 鼻亦兼吹 舌與鼻孔
赤腫努翳亦用此洗切忌點藥
老土磚共爲末吹或青布燒灰吹或硃砂檀香燒枯研
吹或皂角末吹再用黃蠟塞鼻○附舌痘方人中白焙
兒茶硼砂末糝或金瑩塗或黃栢黃連元參苦參末
蜜調塗或鴨糞燒研鴨毛蘸糝 凡糝須先茶洗之游
之以涎 喉中有痘用前蟬蚰方○喉痛壁蟾蜍窠鹽炒吹
恐毒結於喉宜用山豆根元參桔梗甘草生地川芎
歸尾木通潤之前喉症又有胭脂擦耳背法可以參
之以鴨 腎嘴有痘公鴨噴氣即消○附方出痘腎腫桑
葉敷之如風腫者槐花葉同鹽炒敷○女子納棟根而
陰內有痘雄黃末清油調勻以鴨毛蘸擦之
蚰下吐蚰者以苦棟根納肛門或鋪柳葉而蛆化痘爛
且同花椒烏梅肉同搗塞自下

鋪柳葉卧 莊云此陽氣不足之故大補氣血則膿乾而蛆自化矣亦是一理 或用鹽醋湯噴之○痘後盡蝕疳瘡膿水不絕出蛾蠶繭填生 喉啞者抹以油 痘後瘡未燒令汁盡成灰為末摻之 喉啞者抹以油 瘡後瘡慈薑清油炒熱偏身抹之再用燈火 腹脹者敷以餅後喉下一點胸膛一點兩乳下一點 肚腹腫脹燈花數十朵入鹽炒過加鉛粉調餅貼臍上一用黃栢苦參為末清油熬膏貼之 一方桐子葉泡軟用清油雄黃塗葉上貼之○又威濕足腫者以水洗之更腫用蒼朮檀香燒熏以破業蓋令出濕氣其腫自退 腫屬虛弱而氣不行 雜症盡退 詳痘餘毒更清者以肉桂燒酒磨搽即愈 疎則無毒密則有毒宜涼解免害眼痘毒攻脾則泄瀉浮腫攻肝則眼生翳膜攻腎則耳痛膿出攻肺則咳嗽痰盛○痘後餘毒用桔梗一兩連翹元參各六錢生地赤苓牛子炒各五錢煨硝犀角甘草各一錢雄黃青黛二錢末薄荷湯丸蜜調餅敷胸○痘後餘毒乃起脹時暗藏骨節間藥所不到一交收醫則毒見矣兩膝及手足骨節不宜見恐是對毒熱甚作渴者重不熱不渴者輕 董氏三豆漿數痘毒聖藥赤豆黑豆綠豆研爛加

醋入鍋炒熱作餅貼半日冷換如口內生嚼貼不加醋
更妙彙通去黑豆加碗豆黃豆各等分蜜水敷可內消
或用公雞屎貼即愈混沌如金散雞蛋一個打破分
蛋白蛋黃爲二處以篩淨細黃土先將蛋黃和作一團
再將蛋白攤作一餅仍包成蛋式入灶內煨候烟盡爲
度勿焦共研細末如毒初起以雞清或醋和敷即消潰
者乾慘虛人亦妙痘毒破腫馬齒莧白蜜和猪油熬
入赤豆菜豆調敷如痘後疔亦用馬齒莧白蜜和敷不敷
日拔出如大螺殼切勿挖割慢事又解痘毒生螞蟥
和飛麤搗敷餘毒不收蠶繭填白礬煨灰加象皮敷
驅毒散即移毒散見下痘後齒癢乃餘毒流於胃
經不治防成牙疳以連翹牛子慈菇生地銀花甘草紅
花石膏煎水頻嗽又痘後牙齦口舌破爛出血或成走
馬疳者人中白一錢銅綠一分半麝一分末濃茶洗後
敷或雄黃牛糞尖燒存加冰片吹立愈餘見前痘風
痘逢春即發黃芩黃柏大黃黃丹輕粉共末猪油調敷
末油敷立愈又獨羊糞炙麻油調敷神痘後回毒
膏麻油四兩木鼈仁一個煎枯入壯髮三兩熬
化黃丹二兩收貼一個即消并治一切熱毒
痲與痘

同亦與痘異

候噴熱者痘之同類而異名者也因時行氣

其將出未出之際必咳嗽噴嚏鼻涕故曰肺病始以發

散出盡為貴終以寒涼清火為事雖標已三日而下身

無麻氣喘煩躁發悶不安者尚宜重加發散用麻黃升

麻羌活川芎之類麻出而氣自平矣大抵欲出已出之

際雖寒勿用桂枝雖虛勿用參朮雖嘔而有痰勿用半

夏南星此症多泄瀉陽明之毒亦從下解切忌止瀉但

用升麻黃連甘草葛根自止麻後痢亦全麻始終惟用

清涼多以芩連地芍收功古云麻疹無補法。發熱三

日始出一日出三遍三日出九遍至六日出盡及出至

足頭面將收熱亦漸退至八九日收齊熱乃退盡大熱

未退不可與食始終避風為要麻重者偏身繃脹眼亦

封閉其色赤白微黃不同仍要紅活最怕黑陷麻不出

而喘破其筋療上紅筋紅療開其毛竅白湯抹之使毛

者死竅中常微汗圓葵之酒試噴半煎噴身上勿噴頭面亦

潤澤則易透

忌夜噴以疹日出而夜斂河柳之湯足浴發疹者用西

也非治痘惟起脹後勿用

兒不任升葛發散者尤妙或用紫蘇同。按初發熱可用西河柳同連翹乾葛防風薄荷前胡桔梗牛子蟬蛻甘草淡竹葉麻隨出隨沒可用西河柳同麻黃荊芥防風牛子薄荷連翹甘草淡竹葉角刺麻已出復回頭面稀少發熱神昏至五六日不可再大表須解毒內消可用西河柳陳者更妙同荊芥防風桑皮牛子黃芩黃連浙貝地骨皮甘草麻子已退音啞發瘡肺火未清可用西河柳同麻黃天花粉桔梗杏仁瓜萸桑皮黃芩百部麻後胃火不清可用西河柳同元參桔梗石斛熟石膏黃連黃柏牛子荊芥生地花粉甘草連翹等

熏仰天之皮塗護火之草

陸方瘳症用仰天皮卽陰濕地下苔蘚嫩柳皮各半斤星

星草四兩蟬蛻二百個水十碗煎三沸去滓乘熱氣熏洗遍體黑疹變爲鮮色十有九生之妙。穢觸不出用沈香檀香木香燒烟熏之。治癰疹久不瘳或先心腹痛痰噦麻痺及筋脉不仁用護火草鹽生薑連皮研塗甚處餘處自消無護火草亦可按癰疹者疹出多癢色紅赤隱於皮膚乃心火灼肺外受風濕而成。附方瘳垂用桃葉浸鹽齒擦。○疹後患痘者豆也見醫書又痘牙疳及痢疾癆症者隨症施治

故治之以豆

三豆方見前 按赤豆黑豆菜豆為疫痘聖藥 凡皮肉紅腫而痘不腫者用三豆

醋調掃神效

又痘毒等

麻者麻也

疹如粟米

故治之

卽用豆渣掃患處亦良

以麻

頭發不透氣喘欲死芝蔴五合滾水泡之乘熱熏

紫色用燒酒博黃

皆大人之常有

女子出痘天癸忽至

土慢揉擦心口

抹周身

孕婦出痘腹痛胎動用益母草蓮蓬殼俱燒

存性艾葉共末醋調敷臍連換三次胎自安或胎欲下

及死胎不下蟻螂連所推泥一并焙末加靈仙研酒調

敷臍下并治經閉不通

按草胎飲用人參當歸白朮

川芎條芩防風陳皮荆芥生甘草紫草茸赤芍柴胡白

芷乾葛砂仁糯米阿膠熬此方可敷臍大熱加鬱金荷

蒂野麻根甜瓜蒂一

非小兒之獨然

附治痘神方不論

枝○後生出痘見前 初起灌漿收靨皆

用之黨參二兩白芍一兩元參白朮各八錢茯苓五錢

陳皮生甘草神麴各三錢柴胡查肉各三錢蟬蛻一錢

黃連五分水丸用 又治疹方不論初出及已出透皆

可用熟石膏二兩乾葛歸身桑皮各一兩地骨皮荆穗

各八錢枳殼炒六錢牛子炒陳皮川貝赤芍薄荷各五錢生甘草四錢紅花三錢桔梗一錢水丸用一方去桑皮加前胡一兩黃芩防風各八錢連翹五錢全二方可以預合備濟故存之或煎浴或調敷俱可臨症斟酌

雷作傷寒並視勿與諸瘡其論按古云痘疹傳變與傷寒同大症也亦險症也

自有種痘之法而險者悉化為平然當疫痘盛行不能預種往往有不免者且有一家數日而死數兒者是可憫也余既輯傷寒外治方故於此症亦博采之并與內治諸方相證明以為痘科之一助而即為傷寒篇之終

云至於潰癰拔疔續筋接骨亦見全文姑從省筆按心肝肺

脾腎胃大小腸三焦皆有生癰之症名為內癰初起嚼黃豆試之不醒者是用五神膏即杏仁一兩元參五錢蛇蛻蜂房亂髮各二錢牛油丹熬者或加大黃皂刺貼臍取瀉腸癰六一散敷縮脚腸癰梅花點舌丹敷臍癰平胃散加黃連敷胃癰吐盡膿血白愈不必治肝癰照腸癰治○癰疽名詳見外科書凡毒小而頭者有也大而無頭者癰也欲驗頭以濕紙覆之先乾處是頭或蛇皮貼之即有頭出癰與疽別陰滯於陽發癰大而

高起屬六腑陽也易治陽滯於陰發疽平而內發屬五
藏陰也難治癰則紅腫熱痛疽皆皮色不變然亦有
腫痛堅柔之分如其初起疼痛者可消若重按不痛而
堅者毒根深固不易消也陰疽詳王全生○諸癰初起
以疎託解毒為主忌熱藥既潰以補託元氣為主忌冷
藥諸疽初起毒陷陰分宜陽和開其腠理既潰陰血乾
枯宜溫補厚其膿漿然通腠與滋補當兼用之若半陰
半陽症宜託裏以轉陽用藥清不傷胃溫不助邪可也
沖和清涼陽和諸膏已見○凡外症試腫法以手按之
腫而痛者為實邪漫腫不痛者為虛邪又腫而赤者為
熱腫而不赤為留氣停痰又實痛者熱若虛而癢者寒
也試膿法手掩腫熱軟而即復者有膿不熱強而不
復者無膿按之堅硬者未膿半軟半硬者已膿也小按
即痛膿淺重按方痛膿深又深按之而速起者內是稀
黃水深按之而緩起者內是壞汚膿按之實而痛甚者
內必是血按之虛而不痛者內必是氣薄皮剝起者膿
淺皮色不變不高阜者其膿必稠大抵癰疽瘡瘍先宜
出黃白稠膿次宜出桃花膿再宜流淡紅水胖人宜膿
多瘦人宜膿少若胖人膿少是肉不腐瘦人膿多是肉
敗壞皆非吉也又氣實者多開黃膿氣虛者多稀白膿

半虛半實者多稠白膿又有膿出如粉漿如污水者謂之敗漿難治膿出而身猶大熱者亦難治。附載諸法以備用。○護心法雄黃明礬硃砂琥珀遠志乳香甘草桑豆粉同癩團搗敷胸。○止痛法槐白皮煎膏敷或加當歸乳香對口痛不可忍百藥不效吳萸雄黃油熬塗。止痛札藥如魚肚癰等草麻肉搗敷布扎止。卽去之遲恐有後患。○收爛法發背潰爛不堪只隔一膜者鯽魚破腹去雜以山羊屎入魚腹炙研加麝一錢乾糝效并治諸爛及反花瘡名山蓮散。又雞肫皮同棉花焙末搽。脇宜見藏者山荳根水調塗入麻根末尤佳。○脫腐法凡腐肉黑暗死肌堅硬臭穢難聞者生枯白礬各三錢雄黃一錢乳香沒藥各二錢慘腐肉自脫離如恐痛先以黃丹二兩石膏八兩共研團護好肉再糝作擦亦可去管。○化管法三仙丹加硃砂三錢礬砂一錢紙燃打入管名五虎丹或加蟾酥卽金蟾化管丸之意。凡驚毛管鹿角屑或蓑衣蟲或大蒜煨灰糝皆能化管。驚甲末炒麻油敷功稍遲京城礪砂膏亦可貼如止久漏用蜂房山甲龍骨麝香。取多骨法凡瘡口日久不斂內有多骨也陀僧末日搽能推骨出。蟻同乾薑炙研吹治骨槽風及多骨疽能推骨出。按無

蟻蠅或用蟬蛻亦可出 又烏雞骨人言鹽泥固濟煨
研納之或去人言加砧板鍋蓋上垢屑燒灰搽 又蝦
蟄髮團猪油熬膏先用桑根皮黑豆煎洗龍骨末擦瘡
四畔令易收斂然後貼之。軟肛法凡毒開刀後翻花
起肛用癩團破腹刺孔覆之可軟牛蒡子草紫花地丁
搗爛塗肛內亦軟。收努法因擠膿太過努肉不收者
枯熟地一兩烏梅炭三錢參貼自收 癰疽努肉生附
子濃醋煎洗丁香敷。拔毒根法烏梅一錢輕粉五分
加津唾研膏貼或單用烏梅燒灰敷根落止 疔根用
銀簪刺破將水中鐵釘上銹或加青鹽牡蠣研塗孔內
膏蓋并收紅絲人心腹。塞漏孔法漂黃丹枯礬赤脂
冰片末塞或搓紙捻插入又搗藥插竅用童便煨蘆甘
石牡蠣龍骨陀僧二方亦可併用。搜膿法廣木香末
真輕粉各二錢飛丹枯礬各五錢雄猪膽汁拌勻曬乾
研末磁瓶收存聽用解毒去腐正為生肌之本若驟用
龍骨血結恐增腐爛也。疔是火毒凡有瘡起泡或痛
或癢或麻木或寒熱或先癢後痛或先寒後熱熱定則
寒或始末只癢皆是疔之候也有朝發夕死有隨發隨
死有遲久終死者其症至惡宜留心照看 凡瘡腫以
針刺之不痛無血者是疔如形長者名刀鐮疔不可針

又嚼生黃豆無腥者是疔又明疔易見暗疔難防取甌
中氣垢少許含口中覺一處痛甚卽知疔所在疔有
五色分屬五臟項以下者三陰受毒宜灸忌風藥散紅
絲宜割斷○內疔與外疔同寒熱頭痛體痛但瘡形不
見過數日胸背腹脇頭面手足間有一處甚腫卽內疔
所發處又腹痛甚者亦是內疔○困疔法初起水泡不
知弄破其毒牽引經絡隨脉腫去增寒壯熱久則惡心
不治殺人槐子炒黃平對陳石灰末雞子清調圈至破
處令毒仍從舊口出○點疔法土炒山甲一錢銀硃五
分麝三釐點疔化水毒不入心又硃砂雄黃火硝礞砂
青鹽礪砂膽礬等分點全名七聖散或加蟾肝丸○起
疔法疔瘡危急欲死蟬蛻僵蠶末酸醋塗四畔留口根
出稍長拔之塗藥○急救走黃法白梅乾肉醃荔枝肉
加銀硃少許共搗爛糖雞矢拌勻留頭敷效無白梅用
烏梅肉此味能拔疔根○簡便方用巴豆或葶麻飯丸
或香肥皂銀硃白蜡搗丸納之膏蓋○瘰癧等俱見篇
中○接骨凡若此者覩症識名觀方悟法傷寒雜病自
續筋見下

昔爲昭

仲景

帶下小兒隨俗而變

扁鵲

有膏有藥或貼或敷

外治均通內治古人不欺今人是堪悉數豈曰無稽以上
徵引古方首舉傷寒者傷寒外治別於諸醫家書一篇
所重在此遞及中風以至六淫爲一段臟腑醫之本特
爲一段身體承臟腑合爲一段痘疹承兒科列之末段以
於內也婦科兒科各爲一段痘疹承兒科列之末段以
與傷寒首尾相應瘍傷不別爲段落者二科向皆外治
於此篇意非所重且傷寒痘症均載遺毒風氣亦兼破
傷筋骨後文更有諸方故此作省筆焉共分六段每段
各錄數症每症各采數方數方各具一法虛實寒熱分
別敘次稍加論斷并於裁對中寓伸縮變化以爲一段
之小結構合六段則爲一大結構字句皆令承接先後
詳略均有意在彼此要可以互相參證雖曰六段不過
一段也此非鈔方乃論外治用藥之道不能悉虛掉筆
特借古方以爲鑒使人知此說之確有依據而可行耳
引方以實吾說故不覺其汗漫也至于擇不精而語不
詳則限於天資才力無如何也方之佳者不論內外症
雜取數條補於註內以備參考症項碎者亦如之不入
於文者以行文亦宜有律也此以上徵引古方之大意
也以下則言今推之以爲膏而有製藥施治之法也

夫說酢梅而涎出想懸崖而足酸情之造於虛者其境

不能窮也

壽世新編引釋家語云情想所結自無之有故病境無窮盡也

而用雞頭

以已癭取斲木以愈齩理之徵於實者其類有可推也

淮南子狸頭愈鼠雞頭已癭瘰散積血斲木愈齩此類之推者也

爰廣醫不著書之例

別開藥能療病之端一變湯頭以為膏子匪醫而醫不

藥之藥以膏為主以藥為輔

膏與藥是一是二向只外科加藥內科未明對症發

藥之理呆膏活病宜乎其不應也今特分而析之以熬而攤貼者為膏膏一成不易研而糝於膏中敷於膏外者為藥藥隨時消息示人以呆方活用之法也諸科皆然工拙仍在乎人功力之淺深耳

考神農本

草之經究雷公炮炙之論造化無言而精英自獻古今

未道而祇要堪搜

補外臺祇要字

天取其氣如春風散之吹喉

閉也春風散治喉風喉閉及乳蛾重舌木舌等神方

黃連薄荷殭蠶明礬火硝各五錢用猪膽五六個

一尺以竹紙橫懸此膽在內蓋以木板用土填實至立

春日氣至取出風乾去膽皮青紙研細密收加冰片吹

即散灰候氣之法也名春風散者以得春風溫和之氣

也此法古人亦常用不獨喉症為然博覽者自知○

按日曬夜露亦是取氣之法又有用朝陽東壁土者亦

取其得氣之早且有生氣也最奇者太陽太陰二丸用

水和麯於日月蝕時對日月搓丸以丸之中心亦闕為

驗此非通於天地萬物之理者烏能知之○西醫有收

電氣法治風痛者亦外治也足知精於外治可奪造化

地取其理如急流沙之數催生也食物本草催生用急

腹上先下墊葱白再敷按用急流沙者取其速也又

如順流水順而下流取治下焦腰膝通利二便逆流水

逆而倒上取治痰飲發吐頭風咽喉之人取其神如雄

類亦有用地漿龍心土竈脾泥敷者

黃硃砂之縛於童女也古方治虛勞咳嗽吐血蒸熱者

但脉息有神無不效驗用雄黃

硃砂各一兩綿紙包固或單用硃砂亦可縛於鄉村牀
實童女臍上周時取下縛於自己臍上渴飲人乳渴止
去藥此亦以人補人之法然神存於無形與邪術迥別
又有以硃砂令壯實婦人懷之然後合藥者又有以
藥丸佩於身上時時物取其性如草麻乳香之通乎內
摩之云得人神氣者物取其性如草麻乳香之通乎內
外也膏藥第一欲其能達患處耳古言草麻能拔病
氣出外乳香能引藥氣入內木鼈仁能追病源金鳳草
能透骨節皆膏藥中必須之藥此即內科之用引也舉
此亦可以配五神於午日以擇吉也見前截瘡方又
知餘矣如合蟾蜍丸造六

神龜之類皆是獻北斗於先夜以鎮邪也亦見前
截瘡方采於四時而

芳香之氣始備十集散用蓉葉荷葉蕉葉菊葉銀花葉
蘇葉柳葉槐葉冬桑葉天名精葉風乾

所吹治喉症亦敷一切火毒分四時采取○又百草膏
隨時取田野間不拘何草芳香者為佳麻油熬黃丹
收可貼百病又水鼓腫脹者取山野百草辛香者煎
濃湯二三鍋大盆盛之單被遮蓋避風熏洗亦可熬膏

貼合以五行而中和之體乃成又沖和膏配五行見前○

疼切熱毒不服水土等即三黃解毒法可尤服可磨

敷可熬膏貼甲巳年甘草為君屬土乙庚年黃芩為君

屬金丙辛年黃柏為君屬水丁壬年梔子為君屬木戊

癸年黃連為君屬火每用二兩值年倍之加大黃三兩

麻油熬黃丹收入雄黃硃砂各五錢和勻臨用糝藥末

貼一方加紫蘇香附各一兩○五行湯治赤眼用黃柏

末濕紙包泥裏火煨棉包浸水盞內飯鍋上蒸熟熱洗

此合五行又是一法○按醫雖小道其本出於聖帝賢

臣之所為漢唐以來闡述者皆當代之名儒碩學固不

得僅目為賤工之事也觀其所製外治之名儒碩學固不

治尤奇而闢凡造化盈虧之理男女感應之情與夫格

物致知之功俱見於是蓋治在外則無所窒碍故得以

肆其才也外治為能盡醫之變者此也自後人視此道

為營生之具但取常用之湯頭以為酬應而外治一法

遂廢而不講矣或用之不得其道概以為無驗而置之

矣此段為上智者說法陳義稍高亦以古今人未必不

相及也然而以藥物既具療治斯起以下施治於是稽

為迂遠者多矣

六經之屬

傷寒中風雜症皆有六經見症外科亦然古

傷寒中風分經見前 痧症指微云痧症各有十二

經所屬不可不知腰背頭項連及風府脹痛難忍屬足

太陽膀胱經兩目紅赤如桃唇乾鼻燥腹中絞痛屬足

陽明胃經脅肋腫脹痛連兩耳屬足少陽膽經腹脹板

痛四肢無力不能屈伸泄瀉不已屬足太陰脾經身重

腰以及外腎小腹脹硬屬足少陰腎經心痛腹吊痛身重

難移作腫作脹屬足厥陰肝經半身身疼痛麻木不仁左

足不能屈伸屬手太陽小腸經半身身腫痛俯仰俱廢右

足不能屈伸屬手陽明大腸經咳嗽聲啞氣逆發喘屬

手太陰肺經病重昏沈或狂言亂語不省人事屬手少

陰心經或醒或昧或獨語一二句屬手厥陰心包絡經

胸腹熱脹揭去衣被乾燥無極屬手少陽三焦經。痧

症分經醫書鮮見故特詳之 餘不備載。外科須觀

鑑本 治癰疽法陽明多氣多血太陽厥陰多血少氣

少陽少陰太陰多氣少血多者破之行之少者託之滋

之宜視氣血多少以爲消補而已。辟瘟囊方用羌活

太陽大黃陽明柴胡少陽蒼朮太陰細辛少陰吳黃厥

陰共研細末絳囊盛之佩於當胸卽羌活湯治四時傷

寒藥備六經法也又治衄火在胃水紙搭鼻衝陽明脉
俠鼻也火在膀胱涼水拊頸後太陽脉經頭項也火在
包絡色線扎中指中指屬胞絡也此分經治法也二
方一合一分凡外治按經用藥之道倣此推又按四
時傷寒麻黃去節四兩太陽柴胡一兩少陽升麻一兩
陽明加黨參當歸各一兩赤芍甘草各四兩硃砂雄黃
各一兩五錢春夏加石膏枳實秋冬加桂枝細辛各五
錢石膏或重用亦可此方油熬丹收貼亦能發汗傷寒
汗後變為雜症亦可用徵五氣之應天以五氣食人入
乾霍亂並妙亦以汗解徵五氣之應鼻五藏蘊其精氣
面形五色五氣即風寒暑濕燥也詳鑑本又五藏
之氣見前當議臟腑註并與中庭各部註參看○此句
言相其面以下分苗竅舌齒審其苗竅五藏病不可見
周身相之即四診中之望也審其苗竅驗之苗竅見前
臟腑註○又夏禹鑄有審小兒苗竅法舌為心苗紅
紫心熱也腫痛心火盛淡白虛也鼻準與牙牀乃脾之
敦鼻紅燥脾熱也慘黃脾敗也牙牀紅腫熱也破爛胃
火也唇乃脾之竅紅紫熱也淡白虛也黑者脾將絕也
口右扯肝風也左扯脾之痰也鼻為肺竅乾燥熱也流
清涕寒也耳與齒乃腎之竅耳鳴氣下和也耳流膿腎

熱也齒如黃豆腎氣絕也目乃肝之竅勇視而睛轉者
風也直視而睛不轉者肝氣將絕也以目分言之又屬
五藏之竅黑珠屬肝純見黃色凶證也白珠屬肺色青
肝風傷肺也淡黃色脾有積滯也老黃色乃脾受濕也
瞳神屬腎無光彩又兼髮黃腎氣虛也目外角屬大腸
破爛肺有風也目內角屬小腸破爛心有熱也上胞屬
脾腫則脾傷也下胞屬胃青色胃有風也睡而露睛者
脾虛極也唇紅而吐胃熱也唇慘白而吐胃虛也唇色
平常而吐作傷胃論小便短黃澀痛心熱也清長而利
心虛也大腸祕結肺有火也肺無熱而便祕血枯也不
可攻下脫肛肺虛也口苦膽火也聞聲作驚肝虛也又
面有五色紅為心熱青屬肝多腹痛黃為傷脾白為肺
病中寒也黑而無潤色腎氣敗也。按此不獨小兒為
然。祕錄看小兒山根上有青筋直現者肝熱橫現者
亦肝熱但直者風上行橫者風下行有紅筋直現者心
熱斜現者亦心熱有黃筋現於山根或皮色黃不論橫
直皆屬脾胃吐瀉諸症。又在鼻上眼之中間中正精
明穴辨之色紫心肺俱熱也白者肺有痰也黑者風甚
或腎現其舌齒凡舌鮮紅滑濕為吉燥澀為凶青黑而
寒也現其舌齒紫者為陰寒赤而紫者為陽熱純黑有

二症火極似水者熱極水來乘火者寒極。初起表症雖發熱津液如常口不燥渴若舌苔粗白漸厚而膩是寒邪入胃挾濁飲而欲化火也此時已不辨滋味矣宜半夏藿香迨厚膩而轉黃色邪已化火也用半夏黃芩若熱甚失治則變黑胃火甚也用半夏石膏若黑而燥裂則去半夏用石膏知母花粉之屬以潤之至厚苔漸退而舌底紅色者火灼水虧也用生地沙參麥冬以養之此表邪之傳裏者也其有脾胃虛寒者則舌白無苔而潤甚者連唇口面色俱萎白此或泄瀉或受濕脾無火力速宜黨參焦朮木香茯苓炙草乾薑大棗以振之虛甚欲脫者加附子肉桂若脾熱者舌中胎黃而薄宜黃芩心熱者舌尖必赤甚者起芒刺宜黃連麥冬竹心肝熱者舌邊赤或芒刺宜柴胡黑山梔其舌中苔厚而黃者胃微熱也用石膏知母花粉麥冬之屬若舌中苔厚而黑燥者胃大熱也必用石膏知母如連牙牀唇口俱黑則胃將蒸爛矣非石膏大黃生地二冬人中黃之屬不救此傷寒及時疫發斑症中多有之再有舌黑而潤澤者腎虛也宜熟地山更川皮澤瀉之類若滿舌紅紫色而無苔者此名絳舌亦是腎虛宜二地二冬等更有病後絳舌如鏡發亮而光或舌底瑣乾而不飲冷此

腎水虧極宜大熟地重藥等救其津液方不枯涸。葉
天士溫熱症有相火相齒法今錄相齒。齒為腎餘
為胃絡熱邪不燥胃津必耗腎液且二經之血必走其
地病深動血結於上陽血者色必紫紫如乾漆陰血
者色必黃黃如醬發陽血宜安胃陰血宜救腎齒光燥
如石胃熱甚枯骨色腎液枯若上半截潤水不上承心
火炎也咬牙者胃熱氣走其絡也若脈症衰胃虛無穀
以養榮也齒縫流清血痛者胃火衝激不痛者龍火內
燔齒垢如灰糕者胃津亡濁濕用事也多死齒焦其
無垢者亦死有垢腎熱胃劫也當清胃救腎為要相其
形者清明之府頭傾視深精神將奪矣背者胸之府背
曲肩隨府將壞矣股者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝
者筋之府屈伸不能行則樓俯筋將憊矣骨者髓之府
不能久立行則振掉骨將憊矣凡病人身輕自能動者
易治身重不能轉側者難治又凡病觀其形肉脫知脾
敗於內。聆其聲。五音按五臟見前天地萬物之所以屬
必死。病入語聲啾啾然細而長者頭中病暗暗然不徹者心
暗間病寂寂然善驚呼者骨節間病。出言壯厲先輕

後重者外感邪實也。語言懶情先重後輕者內傷元虛也。肺邪入心爲譫言妄語。又或自言平生常事或開目言人所未見事或獨語或睡中喃喃或呻吟不已甚則狂言罵詈皆胃熱乘心也。鄭聲者語不接續虛也。心下汨汨有聲先渴後嘔停水也。喉中漉漉有聲痰也。腸如雷鳴氣不和濕也。喜與笑皆心火也。鴉聲氣將絕直聲氣將散也。雜病發喘癆瘵聲啞久病發呃危。邪入於陰搏則爲瘡有喉有舌聲嘶者喉破也。大驚不語者敗血頑痰塞心。究其受病之何因。凡也。小兒驚風口不能言心熱也。病家問其病起何日日少爲新病實症居多日多爲久病虛症寒症居多也。又問曾食何物傷何物卽以何物治又飲冰水者多陰寒食燒炙者多熱毒也。曾有怒勞房欲等事怒則傷肝勞則內傷元氣房勞則傷腎也。又問初起何症如初起頭疼發熱是外感初起心腹疼痛瀉痢等症是內傷也。又問後變何病如痢變瀉變瘧爲輕瘧變痢變瀉爲重先喘後脹者病在肺先脹後喘者病在脾先渴後嘔者爲停水婦人先經水斷而後浮腫者先治血先浮腫而後經水斷者先治水也。又問今日口渴思飲否口渴喜飲爲熱不渴無熱或

濕也口雖渴不思飲老人主津液少若嗽水而不欲嚥
主蓄血主陰極發躁也又問喜熱喜冷舌喜熱內寒
也喜冷內熱也又問口中有味否口苦熱也鹹寒也
甘脾熱也淡胃熱也陰虛有味陽虛無味又問胸寬
否不寬有痰食積滯氣不行也又問腹中有無痛處
否無痛病不在內主虛有痛處主食積痰血之類有痛
處而手按之則減者虛也又問大小便如常否凡病
小便赤澀大便秘結為熱小便清白大便秘結便閉通者為
大便祕者為實若內外無熱症則為陰實熱利小便紅者為熱若平
虛若內外無寒症則為陽實熱利小便紅者為熱若平
素淺紅淡黃屬陰虛白者為寒若平素白渾如米泔者
則為濕熱所化也又問足冷暖否足暖陽症足冷陰
症乍冷乍煖便結者陽症大便如常者虛也又問平
日勞逸喜怒憂思并喜食何物勞則氣散逸則氣滯喜
傷心怒傷肝憂傷肺思傷脾恐傷腎喜饒厚味則生痰
醉酒則發熱也此問法也猶未也如咳嗽發熱瀉痢
諸病病之總名也一症中各有火有寒有痰有氣有虛
有實致症之原不同如治咳嗽問得有火有痰有氣有虛
有寒有痰有氣即作寒作痰作氣治舍病名而究病原
良工之道也○又摘要問法一問寒熱以察表裏凡

病身熱脈緊頭疼身體痛拘急無汗而且得於暫者必外
感也若無表證而身熱不解多屬內傷二問汗表邪
盛者必無汗有汗而身涼熱退者邪已去也有邪在經
而汗在皮毛者非真汗也汗後邪雖少減未盡也不可
因汗而遂謂其無表邪也三問頭身問其頭可察上
下問其身可察表裏頭痛者邪居陽分身痛者邪在諸
經前後左右陰陽可辨有熱無熱內外可分但屬表邪
可散之而愈也四問便者前陰通膀胱之道可察氣
化之強弱凡患傷寒而小水利者以太陽之邪未劇即
吉兆也後陰開大腸之門可察陽明之虛實凡大便熱
結而腹中堅滿者方屬有餘通之可也若新近得解而
不甚乾結或旬日不解而全無脹意者便非陽明實熱
不可攻下五問飲食者一可察胃口之清濁一可察
臟腑之陰陽病由外感而食不斷者知其邪未及臟而
惡食不惡食者可知病因內傷而食飲變常者辨其味
有喜惡而愛冷愛暖者可知素欲溫熱者知陰臟之宜
煖素好寒冷者知陽臟之可清或口腹失節以致悞傷
而一時之權宜亦因以辨用藥即由此可推○六問胸
中者欲辨其有邪無邪及宜補宜瀉也凡胸腹脹滿則
不可補而不脹不滿則不可攻此大法也然病與滿不

同當分輕重重者脹塞中滿此實邪也不得不攻輕者
但不欲食不知飢飽似脹非脹中空無物乃痞氣耳非
眞滿也此或邪陷胸中者有之或脾虛不運者有之病
者不知其辨但見胃氣不聞飲食不進問之亦曰飽悶
而實非眞有脹滿此在疑虛疑實之間非細察眞確不
可也七問耳聾耳爲腎竅宗脈所繫非惟可辨虛實抑
且可知死生尋常氣閉耳聾無足怪若因病而聾不可
不審○八問渴者察裏之寒熱而虛實亦因以辨凡大
渴喜冷而腹堅便秘結脈實氣壯者陽症口雖渴而喜熱
不喜冷非火證中寒可知何以渴水虧故耳又口無津
液則口乾勿作渴治又凡陽邪盛而眞陰又虛者不可
因其火盛喜冷便云實熱蓋其內水不足欲得外水以
濟其涸精虧眞陰枯也可兼脈症察之○八條問中有
小兒尤非問不可○按四診中問爲最確如不知
色脈大半可以此作準外治能問之詳細亦儘有把握
矣故全錄焉其中有未備
者當於各症本門求之
者諸證治寡婦尼姑異於妻妾是脈理幽微○唐許氏語
達其性懷所致也兒爲啞科亦然

脉者先天之靈非心清氣定者不能察識醫者平時對
先天圖靜坐調息觀氣往來庶可默會據此則診脉
談何敢高談夫七診七診浮中沉上下左右也浮者輕
容易略重指於肌肉之間察其微脉裏也上者即上胸喉中是
中者略重指於筋骨之間察其微脉裏也上者即上胸喉中是
重指於筋骨之間察其微脉裏也上者即上胸喉中是
也於寸內前一分取之下者即下少腹腰股膝脛中是
也於尺內後一分取之左右者即左右手也九候者每
部有浮中沈合爲九也○診法掌後高骨爲關關前曰
寸關後曰尺兩寸之脉主候上焦關中兩關之脉主候
中焦關中兩尺之脉主候下焦腹中左寸浮候心絡沈
候心左關浮候膽沈候肝左尺浮候膀胱小腸沈候腎
右寸浮候胸中沈候肺右關浮候胃沈候脾右尺浮候
大腸沈候腎男女皆以尺脉爲根本關前一分左
爲人迎右爲氣口○六脉者浮沈遲數滑濇也浮者如
水漂木在肉上行也主表屬外感爲風虛動之候心肺
在上俱浮浮而散大者心浮而短濇者肺浮遲表寒浮
數表熱有力表實無力表虛沈者如石墜水底在肉下
行也主裏屬內傷爲濕爲實重濁在下之象陰逆陽鬱
之候肝腎俱沈牢長者肝按之濡舉指來實者腎

病冷沈數內熱有力裏實無力裏虛脈一息四五至爲
平和遲者一息三至也主寒爲陰盛陽虧之候或脾虛
或腎冷也浮遲表寒沈遲裏寒寸遲氣寒而縮尺遲血
寒而凝數者一息六至也主熱陽數君火陰數相火皆
數表熱沈數裏熱有力實火無力虛火滑者如珠走盤
往來流利也主吐爲血實氣壅之候血不勝於氣也滑
而收斂脈形清者血有餘滑而三五不調脈濁者痰滯
者如刀刮竹如雨沾沙遲細而短也主少血爲氣多血
少爲精血不足之候男子多傷精女子多傷血也濇而
堅大爲有實熱濇而虛軟虛火炎灼○六脈加細大爲
八要細者沈細而直且軟壘壘紫紫如線如蛛絲然主
氣少細尚有形可見微則模糊不可見洪脈來盛去
衰如洪濤之鼓卽大脈鉤脈也爲脹爲血氣燔灼表裏
皆熱之候按鑑云脈大者火也病得於內傷者陰虛
爲陽所乘當作陰虛治之病得於外感者邪客於經絡
亦大當作邪勝治之○秘錄八要加虛實爲十脈虛脈
浮大遲軟無力虛者有表無裏也主氣血兩虧之候亦
爲暑若虛熱則生驚實脈惕惕長大而堅主熱三部皆
壯邪氣盛也○二十七脈者浮芤滑實弦緊洪爲七表
微沈緩濇遲伏濡弱爲八裏長短虛促結代牢動細爲

九道又有數脉大脉散脉合爲二十七脉脉理須觀

鑑本及李瀕湖脉訣方能詳細景嵩厓四字訣於浮沈

遲數中觀其有力無力以別虛實最爲捷要學者先從

事於此再參以秘錄十脉外兼任督二脉果能將十脉

辨得分明然後再講二十七脉可矣○四時平脉春弦

應肝木夏洪應心火秋毛一日浮曰瀦應肺金冬石一

曰沈應腎水四季月和緩而大應中央脾土凡脉以兼

和緩爲有胃氣所謂有神也只見弦洪毛石無胃氣者

爲眞臟脉因○又代脉遲而中止不能自還且止有定

數主氣耗如十動而一代卽主一藏無氣惟婦人妊娠

見此非病又婦人腎脉微瀦與浮或肝脉沈急或尺脉

滑而斷絕不勻者主經閉若滑而冲和主孕又三部浮

沈正等無他病而經停者孕經曰陰搏陽別謂之有子

搏伏而鼓也寸陽尺陰言尺陰搏指而動與寸陽迥別

主有子又心脉動甚胎已結滑數不散者胎三月但疾

不散者五月左疾爲男右疾爲女又妊娠七八月脉實

牢強大者吉沈細者主難產又新產宜緩小忌實大堅

牢○兒未五歲看食指內側關紋男左女右第一節寅

位爲風關脉見易治第二節卯位爲氣關脉見爲病

第三節辰位爲命關脉見爲病危紋紫內熱紅爲傷寒

黃爲傷脾青爲驚白爲疳積紅黃隱隱爲平黑凶紋入
掌向中指者爲內鉤順向大指者爲外鉤逆透關射指
射甲者主脾氣大敗凶。推法以我左手握兒食指用
右手大拇指側面推之其紋愈推愈出察其三關形色
可辨表裏虛實寒熱最確紋浮病在表紋沈病在裏紅
而鮮艷者初傷於寒深紅則化熱矣淡紅者脾胃虛寒
先天不足也但須從命關推上風關切勿倒從風關推
上命關反透其關亦忌覆指而推以螺紋剋制肺金紋
必變色也慎之。半歲以下小兒於額前眉端髮際之
間以名中食三指候之食指近髮爲上名指近眉爲下
中指爲中三指皆熱外感於風鼻塞咳嗽三指皆冷外
感於寒內傷飲食發熱吐瀉食中二指熱主上熱下冷
名中二指熱主夾驚食指熱主食滯。五歲以上一指
取寸關尺三部六至爲和平七八至爲熱五至爲寒
祕錄云凡小兒先看氣色後看脈脈亦只看數與不數
數甚則熱不數則寒數之中浮爲風沈爲寒遲者濕滯
者邪滑者痰有止歇者痛也如此而已若小兒脈亂身
熱汗出不食食卽吐多爲變蒸非病醫書有變蒸考亦
見彙精。婦人病多諱言而於孕尤甚一誤則兩命俱
傷小兒之病亦難測度古人著脈法於此等處却不可
里甫并之

不講故外治不盡
形症昭著務細覈其六變
六變者表裏寒熱虛

實也凡人之病不外乎陰陽而陰陽之分總不離乎表
裏寒熱虛實盡之察脉察此審症亦審此也醫書有六

變論平易方中亦載之○前有
當議臟腑註又本門均有見症別部分之陰陽而知一

十二經循行之要
詳見鑑本十二經循行部分歌并註

足三陽從頭走足三陰從足走腹○諸陽行外諸陰行

裏四肢腹背皆如此○人之經絡三陽三陰分布一身

太陽少陰在身之後陽明太陰在身之前少陽厥陰在

身之側○前四時日月註載十二經每日氣血所注已

見大
定穴道之正伏而通八十一數主治之原
正伏正人伏正

也
鍼法起於黃鐘九九八十一數膏藥即鍼灸之變
其正伏穴貼法相通
詳見鑑本鍼灸門○前有募俞

及五臟要穴大
母犯所忌忌受其頭而偏於喉忌熏其

身而入於腹忌濯其足而驅於目
醫之道未求有功先求無過故先以所忌

所說為說按忌有醫忌藥忌日月人物之忌俱見醫書
治頭等敷涼藥者防偏熱毒於喉治眼腫敷消藥
者防從四肢入腹丹毒產癰見前又東坡手錄目赤不
可與湯浴并忌用湯泡足湯驅體中熱併集於目喪明
必矣此三者皆外治之所忌三句統括三部可以例
推○按治頭風者忌用熱藥傷眼治湯火者須漸漸從
外圍入留中出氣又如治熱死者忌卧涼地凍死者忌
浴熱湯溺人不可倒提出水及火烘并勿令見火光見
則大笑不治縊人忌刀剪斷繩麗人無燈忌燈照有燈
忌吹息燈治服砒人不可令睡倒恐毒流四肢小兒驚
風抽搐勿抱緊恐筋攣成廢此種陰陽水火冷熱明暗
聚散動靜相反相悖之理倉卒最易疎忽苟不知而誤
犯之在醫者病家只以為命盡不復究其所由而其枉
多矣又如疔毒忌見火麻花則殺人瘋狗咬忌問鑼鼓
爆聲忌見蠶蛹茄子赤豆胡羊之類見則復發不救此
種尤理之不可曉者前人垂之以為戒非無故耳天下
之病萬變其所忌焉能盡悉略舉數端以見醫之難即
外治亦不可不慎不必藥物入口始候事也安得一博
物者而盡推之以為醫者之鑑乎能推外
治之所以害必能推外治之所以利矣
母蹈所誤誤

下火針則洩真氣誤燒艾炷則耗陰血誤習推拿則傷

筋骨

傷寒有誤汗誤下之文外治亦然○火針

禮拜者

誣醫書有

祝禁者僻

祝由之類

此種皆

乾坤體其生

意

醫書有乾坤生意○乾坤一氣膏治諸風癱瘓濕痰

男女精寒血冷不育並貼之當歸赤芍白芍白附子白

芷生地熟地炮甲木龍仁巴仁草麻仁三稜莪朮續斷

靈脂肉桂元參各一兩乳香沒藥各一兩二錢麝三錢

阿魏二兩香油熬黃丹收則醫俞穴如遺精白帶貼丹

田水火占其既濟

錢水火既濟膏用麻油二十兩象皮三

銖錢二個蟾蛛六個頭髮一把紅丹八兩同入鍋內用

槐枝搗熬一滾取起連鍋放水缸內頓一時再熬如此

數十次成膏下乳香沒藥兒茶麝香各四分攪勻攤貼

治風氣跌打損傷夾棍腰痛爛瘡俱可○合下二句為

用膏之義○此二句取乾坤水火四字以概諸膏十劑

乾坤言其理水火言其法即醫通於易之說也

發以宣通

膏藥以宣通為首務

七方收於偶複

七方大小緩急奇偶複也膏藥取之

偶方複方為多此二句言選用古方為膏之道古方精者俱在鑑本名醫方論及初庵集解諸書中豈

惟吹氣灸影憑虛而造奇

豆塞兒鼻不出令兒緊閉目一人以兩手掩兒兩耳一人

以一手掩兒無豆鼻孔口對兒口用力一吹豆自落下奇妙小兒初生陰囊腫大名胎痂日久恐成木痂在

一歲內可治午日以脚盆盛熱水安於中堂隨抱小兒將陰囊放水內一浸再將小兒在於中間門檻上一擱

其陰囊之水印痕於檻將艾火在檻上濕印處灸二次氣亦全又千金灸癰法午日立日光下人影有癰處着

艾灸之口中念癰中蟲毛或若欲治待日中三遍火過添火再灸如此念三遍燒三次亦有効數方奇妙

苟能通之則何病之不可治哉灸檻灸影之法與前乳癰灸碗之法皆灸之變者也凡灸能以此推可不慮其

傷陰血矣附方治晚令細想忘記事或作冤盜狀驟驚嚇之立止此靈樞法也又昔人有臨試場患眼者

醫云眼易愈但恐患脫脚傷寒耳令以脚置大斗中并

理論駢文



重

點一燈於脚後視之患者心注於脚數日而眼愈乃悟
醫以此降其火言脫脚者僞也此亦憑虛造奇之法也
亦或蚊嚼蜚蠊假物以行巧昔名醫夏月治一痘不發
一夜毒解又治腫毒者用螞蝗置筆管中吸其毒名蜚
針法如血出不止以藕節上泥塗之即止如不見頭以
并泥搗之先乾者是頭○按此亦即仲景蠱蟲水蛭之
法推出故奇而不失其正即此可以開發心思○附方
○兒初生不啼勿斷臍帶捧貓置兒耳邊口咬貓耳令
大叫一聲兒即醒貓頭瓜須布包○病人尸厥不醒用
白雄雞置病人枕邊俟雞一啼病人眼自開可治○治
疔及蜈蚣咬用大蜘蛛放毒次吸之蜘蛛一見自奔赴
有二友駢過一云不痛一云須驟然一痛然皆愈○痛
風取黃丹與雄雞食之停取熱糞敷○此皆假物之法
也餘如蜣螂蚰蝓誘之以所欲者如脾欲燥肺欲潤又治積
蠱等已見前誘之以所欲者以所喜者誘之所惡者
攻之治假熱症以膽而蟲且騙通蟲聞甘則起聞酸則
伏○治痰血在胸不能飲食者炙肉令香置口邊引蟲
竇瘰而上胸自開名騙通法○又如髮癩用香油煎香

澤置病人頭邊令氣入口鼻誘蟲出 又如蜈蚣入耳
灸姓伺之蟲入耳偽寢勿動點燈引之 又胃口不開
葱椒醬等烹鰾魚令病人制之以所畏 諸藥畏惡而鬼
嗅之可以開胃亦驅法也
還哀告 鬼崇灸膝眼四穴名鬼哭穴必四處着大鬼曰
哀求去 按古有灸邪人而治腰痛之鬼者當
世服其通靈可以相參○附方治應聲蟲者讀醫書至
雷九則不應又白馬尿化血髓貝母治人面瘡又蛇畏
白芷故蛇咬用白芷塗亦畏蜈蚣故用蜈蚣焙末油糖
調塗蜈蚣畏雞故蜈蚣可用雞冠血雞矢塗全蝎畏蠅
牛故蝎咬用蠅牛塗魚畏鰾鰾故魚骨哽用鰾鰾屎塗
書龍字搔癢癩爪捺鳴涎亦然又貓食鼠故貓涎貓屎治
鼠咬貓毛治鼠癰又貓毛油塗貓屎并泥塗治偷糞鼠
症此從貓食鼠而推者也山甲治腳底蟻漏此從山甲
食蟻而推者也馬咬潰爛以打馬鞭或籠頭索燒灰探
卽愈毒入心者二方亦効又鬼忤塗雄黃雞血於面狐
媚佩麝香於身并抹桐油於陰處自絕皆是制之以所
畏舉此見例不獨可悟醫意并可議格致之理○按憑
虛造奇假物行巧誘以所欲制以所畏四句明用藥之
義吹氣灸影云云特引一方以爲外治之證耳故句中

用豈惟亦或且還等字以見講於未然上工治未然○
法非一端須推擴勿泥看也如治哮喘者於
七八月間先以藥下之使冬時無熱可包妙
法也膏藥可以倣用○預防中風等見前辟瘟塗太

乙紫金之錠祛邪佩眞君七寶之丹太乙紫金錠治百
病亦爲時疫神丹

喉症尤效卽山茨姑續隨子五倍子各二兩紅大戟一

兩麝香三錢也加雄黃珠砂各五錢名玉樞丹再加麻

黃紫蘇香附蒼朮半夏木香山豆根丹參鬼箭細辛川

烏滑石名赤金錠再加升麻吉梗廣藿香廣陳皮銀花

大黃名太乙救苦辟瘟丹可佩可塗按內府紺珠膏

治癰疽腫毒流注頑癰風寒濕痺癩癰乳癰痰核血風

等瘡及頭痛牙疼腰腿痛等症悉驗麻油一斤用當歸

木鱉仁知母細辛白芷巴仁五倍子山茨姑紅芽大戟

續斷續隨子各一兩槐柳枝各二十八寸浸熬去渣另

用松香十斤以槐柳桃桑枝芙蓉葉各五斤煎濃汁入

松香文火溶化下乳香沒藥血結各五錢雄黃四錢輕

粉一錢麝香阿魏酌用和入膏內方巾用紫金錠藥

料是一法可推用○許眞君七寶如意丹絳囊盛之佩

於胸前能辟邪如用油熬丹收貼治諸疾心痛如神用

黨參川烏生附子紫苑當歸柴胡薑製厚樸苦桔梗吳
黃官桂木香檳榔赤芍皂角黃連川椒乾薑石薑蒲各
一兩巴仁五錢硃砂三錢此即溫白丸加木香當歸檳
榔生附子也亦治積聚癥瘕鼓脹痞塞腹痛痢疾等皆
妙可預合又溫白丸加羌活獨活防風即萬病紫苑丸
又去蜀活加三棱甘遂杏仁靈仙即萬病威應丸也
按右方藥料全用加大黃各等分油丹熬入麝香一錢
攪勻貼亦妙。附方。凡疫時以赤豆漿豆置井中買
仲置水缸中常燒大黃蒼朮再煎蘇合丸於中庭加入
病家先塗雄黃或紫金錠於鼻與病人談男勿向其面
女勿坐其脚跟以避穢氣既出紙撚取嚏家有病者以
蓋屋柏草勤熏病屋病愈後即將汗衣入甑蒸過以免
再發并絕傳染。疫時預合藥施送如同仁堂辟瘟方
川大黃一兩二錢蒼朮檀香三奈雄黃硃砂甘松各一
兩川椒貫仲枳香龍骨虎骨各八錢苘蒲白芷各六錢
官桂五錢細辛丁香吳萸黃沈香各四錢共末絹包盛佩
辟邪解疫甚効。辟瘟線香蒼朮桃枝各十二斤香芷
三奈各八斤甘松大茴桂皮香附檀香枳香各二斤烏
頭二斤白茯苓貫仲鬼箭各一斤雄黃雌黃各八兩榆
麝量用原云閉戶焚之令烟氣隨鼻息出入可以起沈

疴絕傳九卷瓜客乞丐獄囚皆可施濟凡蛇蟲毒氣
瘴氣六畜瘟疫皆可熏治○夏日大人小兒恐失其夜
間蓋被受寒瀉瀉用薑蔥蒜各二兩木鼈仁五錢山甲
三錢油熬丹收八乳香沒藥各二錢半丁香五分攪攤
一張益臍睡即免○預免瘧疾三伏日生薑半斤煎湯
熏洗腿灣兩脚○預免凍瘡午日薑蔥蒜洗擦脚手○
小兒初生三日內以手指蘸雞蛋白腦後風門骨節
即頸窩處即按骨是至尾間節即脊骨盡處是男左旋
◎女右旋◎按背脊骨逐節輕揉周而復始不可由下
擦上有黑毛出如髮愈揉愈出務令揉盡可以稀痘且
免驚風六七日再揉并揉前心手足心肩頭有窩處以
手平抬窩即見按稀痘方甚多驗者甚少且恐因此以
爲不出誤事故不錄試於當然古方瘟疫初起以葛根
此方預免驚風却妙試於當然古方胎孕以川芎試之
驗其腹中動否之類古人不諱言試慎之也今人自信
太深以試爲恥此所以不及古人也舉傷寒雜症二法
以概之而百病可推矣然
外治試法較內治尤穩
擦生野芋以識傷寒真假貼
一枝梅以探諸病死生試傷寒法以野芋頭擦背脊第
三骨節不覺痛癢者是即以手

擦周身得汗解。探男婦刺久諸病生死名一枝梅用
硃砂靈脂雄黃各三錢銀硃一錢五分巴仁葶麻仁各
五錢麝香三分加油胭脂為膏捏小餅貼印堂一炷香
去之貼處紅腫飛散者生皮色不變者危遠客可以早
送回鄉亦一陰德此方蜜丸放眉心紙蓋可治瘰癧
疾。附方。小兒急驚諸藥不效以此探其生死雄黃
沒藥各一錢乳香五分麝香二分五釐吹少許入鼻淚出
可治或用皂角生半夏吹亦可有嚏則治無嚏不治
此以藥為試即治也 救於已然 前有誤用麻黃汗不止
與前測內景法異 救於已然 以病人頭髮浸水中方
○又用硝黃下利不止者用參朮薑草加炒糯米烏梅
肉陳壁土搗爛數腹上 舉汗下二法以見例餘不備
載

循石室不應改用之文

石室祕錄云寒涼不應改用溫熱攻發不應改用滋益此

補過之方抑亦立功之道也 按河間云如傷寒誤用

巴豆等熱藥下之而熱勢轉甚者更宜調胃承氣湯寒

藥下之又醫貫云凡外感皆作鬱看以逍遙散加減出

入無不獲效倘一服即愈少頃復發或類發而愈甚此

必下寒上熱之假症此湯不可復投當改用溫補之劑

陽虛四君加溫熱藥陰虛六味加溫熱藥據此二條知

古人用藥或寒或熱亦未能盡保其應手而無悞然病勢有遲速而藥以先入為主至改用他藥解救其先入之藥要不能去安危卽難自必令人才力萬不及古人能無悞乎能如古人之解救乎膏藥異於湯藥差可改換防於復然如勞復食甲華陀病痊皆斷之戒華陀云日內酒肉五辛油麪生冷醋滑房室皆斷之蓋防其復發也。按鼓腫宜嚴禁鹽醬醋一百二十日曾有忌至百日開鹽而復發不救者不可不慎吐血噎膈黃疸淋症亦宜忌鹽。有以巴豆治病者愈後謂病者曰巴豆性熱非得硝黃後遇熱必復發乃大泄之而愈用膏藥者亦宜知之。凡病根不除者均須防其復發。四句統用膏藥術日以精懷日以虛名日以高行日以謹惟之始終言

痛癢之相關匪趨營之是務

以上言臨症之用膏藥以下言膏之名義與膏之貼

法并以藥輔膏爲用之膏有名可采亦有義可尋大都

內不出太乙觀音罪雲金絲天竺五養萬全之素而外

不越清涼陽和神異石室奇效百應

一作五蹄十香之常太

膏原方大黃四兩元參生地當歸赤芍白芷官桂各二
兩小磨麻油二斤熬黃丹十四兩收治婦月不行結塊
作痛癰毒不論膿已成未成皆可太乙方加土木鼈
仁二兩輕粉四錢槐柳枝各百寸血餘一兩乳香沒藥
各五錢阿魏二錢名加味太乙膏治筋骨并心背胸腹
腰脚諸痛及跌撲湯火癰毒瘡癰等皆可太乙原方
七味加升麻陳皮各一兩名生生膏治勞傷內症加沈
香少許參貼心臍治陰瘡加胡椒七粒參貼頸後第三
骨節治外患奇瘍初起加冰片貼立消已潰加花粉可
拔老膿將愈加貝母或棉舊未可生肌此絳囊方○回
春萬病無憂膏照太乙膏去元參生地加苦參皂角川
烏草烏連翹白芨白斂木鼈仁烏藥各等桑槐桃柳棗
五枝各四兩油熬丹收入乳香沒藥蘇合油攪治風寒
濕氣及一切癰毒跌打諸症消腫定痛生肌○太乙保
安膏羌活草烏川烏蠶蠶獨活麻黃桂枝當歸烏藥防
風荆芥良薑海風藤開楊花油熬丹收治五勞七傷風
寒濕氣筋骨疼痛痰喘咳嗽心疼腰痛瘧痢脚氣痛氣
及跌打損傷瘰癧陰毒瘰瘡○又方治風寒暑濕百病

川烏草烏羌活獨活南星半夏麻黃桂枝蒼朮大黃細辛當歸白芷希敏海風藤各一兩薑蔥蒜槐枝各一斤油丹熬松香二兩收加木香乳香沒藥輕粉川椒末各五錢○觀音救苦膏藥店有賣者并有人新刻加增煎藥方故此不載○罪雲祖師膏見集驗良方及幾希錄○金絲萬應膏治風寒濕熱脾胃虛弱面色萎黃胸膈飽悶泄痢瘧疾痞積血痕并心腹諸痛大黃生地元參歸尾赤芍白芷官桂川烏草烏羌活獨活南星半夏麻黃杏仁川芎荊芥防風連翹細辛苦參蒼朮山梔烏藥青皮藿香黃芩枳殼藥本靈仙牛膝續斷貝母忍冬藤甘節蘇木紅花桃仁木香丁香艾葉五加皮青風藤秦艸白蘚皮白芨白斂牙皂僵蠶蟬蛻蛇蛻全蝎蜈蚣蜂房鼈甲木鼈仁萆麻仁五倍子黃栢降香骨碎補良薑炮山甲乳香沒藥各一兩蒼耳草槐柳榆桃桑楝楮各四兩麻油熬黃丹收松香一斤攪勻加薑蔥蒜尤良此方亦從太乙膏出藥味甚多舊云治內症效錄之以爲準繩○敬信錄有天竺膏○五養膏生地熟地天冬麥冬附子肉桂遠志牛膝茯苓肉蔻仁杏仁木鼈仁兔絲子蛇床子鹿膠虎膠各二錢麻油熬黃丹收松香調勻槐柳枝攪下雄黃硫黃赤石脂龍骨硃砂沈香木

香各三錢麝一錢黃蠟三錢一加紫梢花陽起石阿芙蓉紅緞攤貼臍兩月一換此即暖臍膏也加杜仲元參當歸防風白芍黃耆白芷續斷甘草山甲地龍丁香乳香沒藥厚樸血結桑槐柳枝各四十九寸熬名五養膏壯陽助氣并治風痿惟多溫補不可誤貼腫毒瘡癰○心悟有萬全膏○以上治內症兼治外症古方治內症者甚少舉此為例然金絲五養兩方治脾胃已見大概增減用之其法亦無窮矣餘見前○清涼膏治內外熱症大黃元參當歸赤芍白芷苦參黃耆杏仁木鼈仁殭蠶山甲蜂房蛇蛻忍冬藤黃芩荆芥黃栢桃仁防風梔子羌活獨活黃連連翹南星生地甘草髮團各一兩槐柳枝各一斤油熬丹收麝香攪勻外症初起貼即消○又清涼膏大黃元參苦參生地當歸白芷黃芩黃栢甘草各一兩五錢白芍一兩紅花八錢油熬黃丹鉛粉合收○陽和膏見前瘧疾註○神異膏照太乙膏大黃二兩元參當歸赤芍白芷生地官桂各一兩加川芎羌活防風黃栢首烏牛子桃仁杏仁生黃耆木鼈仁山甲蛇蛻蜂房髮團各一兩槐柳枝各半斤油熬丹收入乳香沒藥栝香各一兩血結五錢麝香一錢攪治外症不拘已成未成已潰未潰皆可用潰後不長肌肉不合口者

神效。又神異膏用杏仁一兩生黃耆元參各五錢蛇
蛻蜂房各二錢半治內癰效去黃耆加木鼈仁一兩黃
麻仁五倍各二錢半鉛粉收即會通靈應膏也治癰毒
疔瘡皆可。又神授膏治無名腫毒癰疔瘡癰均妙黃
栢赤芍紅花乳香沒藥各五錢生地當歸白芷各四錢
草麻仁二錢馬前子七個蟬蛻三錢蜈蚣十一條蛇蛻
一大條全蝎十五個男髮一團麻油熬鉛粉收貼此
方共研末入鉛粉炒二兩和勻糝膏貼亦妙。石室神
効膏治外症潰後者用黨參三兩元參五兩生地八兩
生黃耆當歸麥冬各三兩川芎二兩丹皮牛膝荆芥生
甘草各一兩銀花一斤防風茜草各五錢油熬丹收下
廣木香乳香沒藥血結各一兩象皮末五錢麝一錢臨
用再加川楝五倍兒茶血結藤黃炒乳香貝母冰片末
糝貼此方可為外症清補之法。奇效膏治疔毒瘰
癧皆妙草麻仁四兩石上搥爛入松香三兩再搥至膠
粘扯長不斷滾入銀珠扯至光如明鏡紅如鮮血收存
臨用呵軟捏圓貼或加樟腦冰片麝香乳香沒藥九妙
或加黃丹輕粉油熬如治疔加蟾酥內府不用銀珠加
巴仁杏仁木鼈仁乳香沒藥銅綠各一兩全一無巴仁
加輕粉血結全。又方松香草麻仁銀珠加大黃牡蠣

栢油白蠟入麝收全。○又方用松香草仁各一兩，荔枝全用七個，蓮子連心七個，土木髓生甘草各二錢，如
上捷法貼瘰癧腫毒俱妙。○百應膏治一切瘡毒，隨貼
隨愈，亦治風氣川烏草烏羌活獨活大黃當歸兩星半
夏桃仁紅花髮團各一兩，麻油熬松香陀僧硫磺收集
驗，薑蔥汁先製松香亦可，如汁再加商陸鳳仙開楊花
大蒜烟葉希斂草等製松香，用藥再加乳香沒藥血結
胡椒樟腦細辛牙皂各一兩，同熬即治痺集寶膏再加
藥即前見，眼膏也，錄此以見增減之法，瘡用硫磺最効。
○普濟五蹄膏專治外科疑難險症，一切無名腫毒未
成消已成，即拔毒收功，神効無比，惟耳後眉心忌貼，用
巴豆肉一兩，胡椒黃連川黃連黑丑白丑沙參元參柴胡
連翹香附三錢，莪朮木香地骨皮各一錢，半天花粉白
芥子各一錢，神麴山查麥芽各六分，麻油二斤，四兩先
將猪羊牛馬驢蹄殼各稱五兩，熬爛次入前藥，一同熬
枯去渣，下黃丹一斤三兩，收其渣，收存遇牛馬騾驢銀
鞍斷梁破損，先以花椒湯洗破處，敷末填滿，七日愈。
○十香膏沈香丁香白檀甘松鬱金各五錢，麻油浸七日，
慢火養五日，後以文武火煎三二十沸，去渣入黃丹收
以乳香木香白膠香龍齒蘇合油末五錢，麝一錢，攪勻。

候凝作片攤紅絹上貼按膏藥須加香料此方可以

意加減臨用攪和甚妙。以上皆治外症。諸方不同

爾迺撮其要撮古膏數味亦可熬與湯頭同廣其略參其異從其宜浸

之以清油熬之以烈火燥入之而潤毒化之而芳湯劑

毒藥膏順天時而老嫩體物情以後先濾必淨攪必勻

漬以水去火毒蒸以湯盛於甌展於布如漆之明似鵝鳥粘

之軟合之擬海月之拾海月兩片合形海舟開之疑元

壁之獻以上言膏之用油熬者以下則言用松香石灰

膏之不顧能學古而有獲亦自出奇於無窮如鍾松

香膏有用松香未收者亦有搗松香貼者皆法也。按

治痺血結膏槐柳枝各二寸七寸香油十兩當歸白

芷細辛知母木鼈仁五倍子各五錢熬松香十兩收乳

香沒藥各五錢明雄四錢真血結三錢輕粉二錢麝一

錢攪勻難貼 臂痛貼 臂腿痛貼 腿 如貼腿痛貼後
用熱湯露脚指在外從痛處淋洗至下自用布蘸熱湯
奄於膏上蒸之令熱則其痛漸移下骨節間然後如法
貼之逐節趕下至脚腕再貼足心發一泡出黃水愈亦
治癰疽等生能散熱能穿遂敗生肌首尾皆可 古方
以松香收膏甚不便利此方蒸法極佳錄以待推 又
松香白水煮搓洗九次入銀硃一錢輕粉三錢麻油煉
蜜少許搗為餅貼治膿瘡大毒周時再用水搓洗翻轉
再貼醫過三人其效尤速 治癰久患諸藥不效者松
香同猪骨髓搗貼 治膿松香同猪油搗作夾紙膏貼
○餘已見○此皆用松香之法也不必外科為然苟得
其意則內外一理蓋藥不止治一症變而通之是在能
者因內科方少姑錄其法之善者以為例意不在方也
故文中不列焉識者鑒之○有嫌方太多漫無頭緒者
不知正於無頭緒中悟法之變方為如調石灰有用石
者亦有有用石灰作膏者 石灰能治痰積瘀血○奇効
膏大黃六兩香油一斤熬黃丹收以炒陳石灰五錢製
乳香沒藥各四錢攪勻紙攤貼治瘰癧未破消已破合
亦治破傷等如加槐枝艾葉花椒全 按石灰同小老

鼠搗陰乾研收更妙。瘰癧毒用石灰同大黃五倍銅綠
枯礬黃丹牛黃麝香加葱白馬齒莧蝸牛為錢磨數甚
妙。瘡不收口整石灰一斤放缸內以清水八斤燒滾
傾入攪勻澄清傾在另盆濾渣聽用如要收口剪新白
布浸入一刻取起貼患處此西洋祕法也或以象皮浸
灰水內用亦可。瘰癧膏大黃海藻昆布芫花各二兩
以青炭灰水加醋熬入半夏五倍南星末各一兩石灰
炒紅研二兩收初起可消已成瘰癧過百日可不再大。
杖瘡用如意金黃散一兩加樟腦末三錢石灰水一中
對香油一中調稠如膏貼患處湯洗換又是一法。按
瘡用水龍骨即脩船油石灰也煨灰收水甚良可奈。
治積等方見前。瘰癧毒不破頭草烏木鼈仁靈仙鳳仙
子石灰水碱水熬膏點之或加蟾酥名蟾靈膏可代刀
針。附鉛灰方瘰癧用黑鉛炒成灰四兩醋敷不痛不
破一月內消而愈。如化犀膠謂以牛膠化難亦法也。
銀黝亦佳俱可參。海犀膏五月午日以水膠
一兩乳香一兩煎水攤紙上陰乾剪貼能治諸痛或入
明雄飛礬等分硃砂三分刷紙全。一用端午艾四兩
煎湯去渣先下紅花次象皮次乳香。或藥各四兩煎去
渣下牛膠二兩煎至汁黏刷桑皮。或木紅紙數遍陰

乾臨用以唾沫調軟貼可治狗咬蟲蝎蛇傷并跌打破
傷一切爛癰癤瘡等能活血生肌如金瘡或跌傷慘
藥後以此封之甚妙○痰注牛膠三錢醋煎化下鳳仙
子末人中白煨研攪勻貼○牛膠十二兩醋二斤熬下
黃丹鉛粉各三兩收治發背對口乳癰魚口便毒癰瘡
爛腿俱妙孕婦用此最穩亦可臨症調藥用○凡瘡不
斂用牛膠醋化塗紙上貼瘡口再用熱醋浸布罨如融
於瘡上以瘡癢膿盡爲度椒礬湯洗淨貼生肌膏如融
蟲蠟謂以蠟難膏又是一法○治癰風等方見前○一
丹收入黃蠟白蠟和勻攤貼或加乳香沒藥明礬全
此方加當歸二兩生地一兩生甘草五錢熬即當歸膏
治癰毒湯火一切疔瘡諸般爛瘡生肌止痛補血積筋
如再加寄奴合歡皮熟地各一兩龍骨象皮血結各
五錢治金瘡杖瘡夾棍傷○蚌灰可代珍珠蟹黃可代
牛黃收口入之亦妙○貝葉膏髮團油熬白蜡收棉紙
蘸油貼磁器挈上陰乾用能定痛去腐生肌以紙蘸油
是一法○硃砂膏松香兩半黃蜡樟腦各一兩硃砂五
錢凡瘡癰不收口及金木蛇蝎犬傷皮破血流者皆可
貼攤時宜薄厚則不效○腫毒一切白龍膏香油熬宮

粉黃蜡收。綠蜡膏麻油熬黃蜡白蜡收。如煉豕脂之。
加松香或黃丹陀僧皆可銅綠末攪勻。
豕膏即猪脂也。內症如血燥用生地猪油熬膏聽擦。
○治金瘡杖瘡止痛止血不作膿法并杖傷死血鬱結
吮逆不食內爛者皂役合之可以積德煉淨猪油一斤
半熬膏入製乳香製沒藥各一錢牛血結三錢兒茶二
錢冰片三分樟腦二錢四分麝香一分松香黃蜡各一
兩面粉四錢收。猪油一斤黃柏大黃麻黃檳榔等分
水熬調瘡藥用甚妙。又方膿窠疥瘡用斑毛三個同
雄猪油四兩煎數滾去斑毛入麻黃五錢煎黑去渣將
草仁大楓子肉各五十粒搗勻搽一。去草仁用杏仁桃
仁同猪油能解斑毛毒。白玉膏蘆甘石同猪油搗貼
治臙。大鯽魚亂髮猪油熬膏塗治手足諸瘡亦可加
藥。猪油先熬去渣入蘇合油八兩再熬以人指甲末
血餘各二錢陀僧松香各四兩收治疔毒諸瘡可調藥
末貼。有用猪肝貼腰毒者有用猪腰摻藥貼大毒者
藥即鉛粉一兩輕粉銀硃雄黃製乳香製沒藥各二分
半也。治對口發背癰疽拔毒滅痛定瘡口出膿穢俱妙
可參猪網油包松香燈火上燒着滴下油來以蚌殼如
裴馨承之貼禿瘡及陰陽頑癬油紙攤貼此又一法如

炙雞黃

古有以雞蛋收膏者。頭髮二兩麻油熬入煮

黃膏亦名外科膏子

如加赤芍黃柏大黃白芷當歸各

一兩紅花五錢川連四錢再熬枯去渣下製乳香沒藥

各一兩六錢血結一兩兒茶八錢琥珀五錢輕粉四錢

熟石膏黃蜡各二兩冰片一錢麝五分收去腐生新極

妙。按原方雞黃膏調入煨蘆甘石赤石脂兒茶黃柏

末紫豆粉紫蔗皮灰即治胎乘梅瘡陰爛等敷藥也如

調入苦參末可治熱瘡調入鹿角屑甘草末可治乳癰

調入醋煨牛牙末可治禿瘡及脚了破爛調入黃丹石

膏硫黃末可治膿窠調入川椒花椒枯礬硫黃末可擦

肥鰓膿疥濕風坐板諸瘡調入川椒雄黃可治肥瘡白

頭黃水瘡赤游丹調入乳香沒藥兒茶甘草末可治禿

瘡一切瘡調入海螵蛸龍齒象皮輕粉松香乳香末可

敷瘡口調入大黃末治湯泡火傷調入白蜡冰片末治

杖瘡調入防風白芷末治濕熱諸毒調入斑毛生半夏

末可擦癰單用亦治囊如杵糯團糯米膏用川烏草烏

風隨症量加不能盡述如杵糯團糯米膏用川烏草烏

米飯搗膏貼治風痛又糯米一斤皂角切碎半斤銅

錢一百個同炒至焦黑去銅錢共研末酒調如膏塗治

理瀾駢文

真

筋斷骨折效。小金丹用糯米丸痘科用糯米餅如熬

均見前。腰痛用熟糯米飯作大餅貼布拴之。如熬

麥粉一陳小粉四兩炒黑醋熬膏名烏龍膏治一切熱毒

一。加生白芨五錢白斂三錢百合百部乳香沒藥百草

霜糯米炒各一兩麝一分敷治筋斷骨折腫硬青紫者

又是一法。又方陳小粉炒黑醋熬入大黃黃連黃栢

槲硝南星半夏白芷白芨白斂牙皂草麻仁榆皮五倍

龜板各等分末臨用加猪膽汁白蜜和勻留頂敷治一

切熱毒未成即散已成出膿定痛解毒真靈藥也。散疔膏

膽蜜如搗棗梅。大戟棗肉搗如膏貼臍取瀉。散疔膏

亦效。如搗棗梅。專敷疔毒紅絲蛇頭及諸惡毒效。蟾蜍

象皮焙人言淨青黛乳香沒藥血結兒茶各一錢麝六

分水片四分同棗肉丸硃衣臨用以白蜜調成膏貼毒

頂。有。有用白梅烏梅肉搗膏貼者。外如。如刷桑竹。桑

荔支肉治疔肥皂肉治毒皆可搗貼見前。如刷桑竹。皮

見上。有。有用葱涎刷桑皮貼金瘡者。金玉珠寶之貴黑

。竹。即。竹。紙。帛。紙。木。紅。紙。亦。全。皆。膏。之。名。紫。金。膏。治。風。寒。濕。氣。漏。肩。髃。

黃青白之奇。膝。疔。積。中。氣。跌。打。夾。棍。棒。瘡。松。香。十。斤。用。

薑蔥各六斤取汁再以麻黃白芷川烏草烏闍楊花各
六兩胡椒四兩吳萸附子各三兩煎汁和一處收松香
另用麻油三十六兩熬入松香成膏以煨綠礬一斤乳
香沒藥靈脂肉桂木香各二兩攪勻貼此方藥性溫熱
。又白玉膏紺珠膏入寶膏黑膏白膏綠膏藥
黃明膏皆見篇中其餘膏名甚多茲不備載 崇之曰
比天 趙府比天膏。金鎖比天膏治外症諸瘡不論已
未破並用葱椒湯洗淨貼初起毒盛將膏剪去中
心留頭出氣不必揭起。膏可愈一毒用紫花地丁劉
寄奴淨野麻根蒼耳草連根葉子稀莧草各一斤山甲
一斤蟾皮一百張麻油十二斤內分四斤煎山甲餘藥
入八斤油內加老酒蒸汁各二碗熬膏炒黃丹收下牙
皂五靈脂大黃末各四兩白膠香三兩攪勻 神之曰亞
此彙精驗方 此方所用皆是外科要藥
聖 內府亞聖膏治破爛諸瘡楊梅結毒用槐柳桑榆艾
各二十一寸象皮一兩驢甲一塊木鼈仁七個炮甲
六錢蟬蛻四錢蛇蛻二錢雞子清三個血餘三錢麻油
三斤熬黃丹收黃蜡一兩五錢和入靈脂血結煨牡蠣
五錢乳香沒藥末三錢攪勻貼。此類方不過借其名
義以言其用之神耳勿泥定方藥看然方藥亦未嘗不

佳其造之也非一式膏式以上其用之也非一端如下文所

膏藥有因十二經五藏六腑所在而貼者有因患處而貼者如病在頂而貼頂病在額而貼額此患處也有病不在頂而貼頂病不在額而貼額此取穴之法也內外症皆然膏藥貼法與鍼灸通但不必如鍼灸之點穴不差毫釐在得其大意與取或摩於巔足太陽之脉上其要穴而已觀下文可知額交巔直入絡腦別下項其病衝頭痛目似脫項似拔即正頭痛也○項為百會穴○蒼耳藥本並能通巔項凡各部皆有專藥舉此為例又而分督任○按督脉起於溺孔繞前有方者皆不贅又而分督任○腎貫脊歷命門穴在十四椎至大椎即百勞穴在第一椎循風府在髮下一寸上頭至腦戶在百會穴後四寸百會穴在前髮上五寸下鼻至人中之水溝穴而終其病脊强反折又任脉起於臍下四寸中極穴之下即少腹胞宮之所由兩陰間會陰穴上毛際循腹裏之中央歷關元在臍下三寸至氣海在臍下半寸越陰交在臍下一寸臍之中央曰神闕臍上二寸為下腕四寸為中腕五寸為上腕鳩尾在腋骨下五分臄中在兩乳之間循是至咽喉上頤入口

其病男子內結七疝女子帶下癥聚或曰寒熱或因虛
勞而犯陰傷筋一也。督脉上顛任脉不上顛至下唇
稜下陷中而止。與或覆於額而合巽坤。額中印堂主
前部位脉絡參看。雖火左額角巽小腸也右額角坤命門也左額震木肝
右額兌金肺也左腮艮土胃右腮乾大腸下頰坎水腎
也鼻為中央脾也。又膽筋脉皆上頭角柴胡治頭角
痛。手陽明大腸筋上額左角。手少陽三焦筋結額
上角。足太陽膀胱筋下額。足或眉之左稜右稜屬
陽明胃脉至額顛。方見篇中。肝眉又應膀胱。眉心屬肺。眉心上應咽喉。或目之
眉稜骨痛屬風熱與痰。眉心屬肺。眉心上應咽喉。或目之
內眥外眥。目眥外決於面者為銳眥太陽經所起也在
陽下稱陽明熱則筋縱目不開。兩眥皆屬心。按心
痛用雄黃火硝等分末加麝少許新汲水調點內眥即
精明穴也。男左女右扶行數步立愈。腰痛用西瓜皮陰
乾末點全眥見蔣氏說約。凡病點眼者多膏仿照水
丸法為小餅。或在側而附於郭。郭謂耳郭也。按小腸
納於眥內。脉膽脉三焦脉俱入耳。

中三經合病俱令耳痛胃筋脉膽脉三焦筋脉俱到

耳前小腸筋膀胱筋脉胃脉之支膽脉三焦脉俱到

耳後耳輪焦枯受壓垢者病在骨耳間青脉起者

掣痛凡耳聾虛鳴脫頰口噤頰腫牙疼用前樊氏大

乙鍼法鍼耳後陷中翳風穴按或居中而橫於梁血

之引兩耳內膏有夾耳貼法或居中而橫於梁以濕

紙搭鼻衡即貼法也按鼻旁下屬手陽明大腸經

鼻青者腹中痛微黑者有水氣黃者小便難白者氣虛

鮮紅者有留飲鼻燥如烟煤屬陽毒熱極鼻孔冷滑而

黑屬陰毒冷極膏視症貼腦漏膏貼鼻樑眉心頸

後頂或列於頤并咸其頰手太陽小腸經頰又為骨

上本陰火上乘兩頰俱深紅赤又赤色出兩頰大如拇指

主卒死有疔名頰疔頰腮頰也喉症醋熬杜牛

膝敷兩頰腮腫細辛草烏未入蚌粉猪脂調敷口含

白梅置腮邊良久吐涎腫自消疔腮見前腮邊穿

一小孔名漏腮夜合花敷胃頰車穴在耳下車者言

其能載物也陽明經受風熱頰車痛口喎者瀉頰車

穴最效貼或承於頰更觀其頰頰脫有由大笑者有由

病後元虛者令患者平身正坐一人以兩手託住下頰
向腦後送上關竅用南星末薑汁塗兩頰布樊之膏照
貼○五發腦鬚頤或夾乎脰挾咽令咽乾小腸脉循咽
肩背而頸尤險
令盛痛肝脉循喉後令咽乾三焦脉由喉令咽腫膏
皆貼於頸上○附方山梔黃栢各五錢煎汁去渣杭
粉五錢麝五分龍骨一錢入山梔黃栢汁內煮乾研黃
蜡和藥溶化攤絹上貼牙一夜取下黑處是毒此貼牙
法○舌上起核飲食難進食鹽以竹篾春干搥則粘膩
紙離作膏貼提出瘡頭易愈篾染毒勿入口此舌上貼
膏法二方均可仍用○按喘嗽貼天突穴在結喉下
三寸或曰一寸以華蓋穴在天突下三寸三分○喉癰
中間者名結喉或貫平膜頸前有缺盆空屬胃在橫骨
兩旁者名夾喉或貫平膜上左右各一為十二經道路
缺盆下曰胸膈下曰胃脘蔽心之背心位在此心下有
膈膜與背脊胸膈周圍相着遮隔濁氣不使上熏心肺
十二經脉惟膀胱脉不貫膈或上貫而下幽喉為吸門
餘皆能令膈痛○膏貼膈上或上貫而下幽喉為吸門
上口曰賁門屬上焦胃下口曰幽門屬中焦或直衝而
大小腸下口曰關門屬下焦胃分此貼

橫帶衝脈與督脈任脈皆始於氣衝氣衝起於胃脈一

氣街源而分三歧督行背任行腹衝脈起於腎下出於

足滲三陰灌諸絡為十二經之海主血帶脈橫圍於

腰如束帶總約諸脈○治衝脈為病者貼臍下治帶脈

為病者貼腰間○按臍下發痛者腎經也非熟地不除

又腰痛脈大者腎虛也久痛必用官桂以開或宗筋之

之腹脇痛亦然婦人帶病宜用白朮可參

所聚此言前陰○宗筋謂陰毛中橫骨上下之豎筋也

筋所以主束骨而利機關也陽明為水穀之海主潤宗

筋凡痿症由陽明虛宗筋縱帶脈不引所致轉筋症亦

由津液傷宗筋不潤所致○前陰者宗筋之所聚太陰

陽明之所合也謂脾胃二脈皆輔近宗筋故曰合○宦

者去其宗筋傷其衝血故無鬚○陰囊垂者寒在內熱

在外結者寒在外熱在內○傷寒及熱病入厥陰則囊

卵縮者熱傷筋筋急故或廣腸之所容此言後陰○後

也○膏有熱前陰者或廣腸之所容此言後陰○後

廣腸又有直腸○按膀胱筋脈抵腰絡腎貫腎走肝環

於後二陰○小腸熱痔大腸熱便血枯痔散熊膽膏用

螺膏痔藥膏子又有猪膽汁同蘇合油用者皆效○
凡五痔腸癖兩腎尖痛泄瀉久痢陰濕汗痒腸風脫肛
用太乙針法針會陽兩穴在尻骨兩旁各開一寸五分
如破腰腹痛瘕瘕背針命門下血或披之於肩臂
不止灸命門左右腎膏照貼
手之安否○肩下曰腋對腋為臑腋下曰脇脇下曰季
脇在肝下臑之位治同肋助者脇骨也○手膊臂外面
屬手三陽裏面屬手三陰○東垣云臂痛有六道經絡
當以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而
定之則其臂臑之前廉痛屬陽明大腸後廉屬太陽小
腸外廉屬少陽三焦內廉痛屬厥陰心包絡內前廉屬
太陰肺內後廉屬少陰心視其何經而用鍼藥治之
按內者即裏面也此即鑑本上行中行下行之謂○凡
腎病經絡倣此○凡肩痛取手三里穴背痛牽引肩上
者乃膏盲穴為患宜灸此及肩井即肩髃穴在肩端兩
骨間陷中○臂痛麻痺鍼曲池屈手按胸肘灣橫紋尖
盡處陷中手三里在曲池下二寸兌肉端○肩井曲池
手三里皆手陽明或握之於指掌三陽皆起於手指
大腸穴膏多貼此
大指屬脾外側屬肺

食指屬大腸中指屬胞絡無名指屬三焦小指屬心外

側屬小腸一云大指脾二指肝中指心四指肺小指

腎掌心屬心胞絡掌心熱則腹中熱掌心寒則腹中

寒傷寒手背熱者邪在表手心熱者邪在裏也小

兒驚指以男左手女右手男大指在外女大指在內為

順反是逆○附方指頭疔有雞蛋猪膽套法掌中生痘

為掌疽亦曰託盤有雞矢塗法脫骨疽生手足各指或

第四指或指頭及指節指縫白色或黃泡久則潰爛節

節脫落古有截指法不可為訓宜用大甘草末麻油厚

敷在脚趾者不治則腿亦能脫以土蜂房煨末醋調敷

即効膏或繫之於股脛膝上曰髀髀骨與髓骨接處

亦可時一尺九寸膝下曰脛脛之後魚腹曰腓即腿

根至膝長一尺九寸膝下曰脛脛之後魚腹曰腓即腿

壯也足之腕骨曰踝○按膝眼下三寸外側足三里穴

是要穴三里下三寸為上廉屬大腸再下三寸為下廉

屬小腸均為陽明胃脉凡五勞七傷翻胃氣膈腸鳴腹

痛癖疾膨脹胸膈畜血咳嗽咽痰腿膝痠疼足痿失履

皆用樊氏太乙針針之或貼膏後熏之○足膝外面屬

足三陽前行屬陽明胃中行屬少陽膽後行屬大陽膽

足三陽內面屬足三陰足大指外側前行股內之土行

屬厥陰肝內側中行厥內之前行屬太陰脾足心繞踝
之後行屬少陰腎。水性潤下氣不能煦注於足脛則
腫痛。西醫有或綴之於腕踝三陰皆起於足指足
貼腿肚引下法或綴之於腕踝大指外側屬肝內側屬
脾中指屬胃四指屬膽小指指下屬腎外側屬膀胱
膀胱病咽似結胸似裂足小指不用。小兒痘症觀脚
心部位即知寒熱虛實日前誤服何藥脚跟向後爲水
屬坎湧泉穴爲中屬土大拇指爲裏屬震小指爲外屬
兌脚中指爲離屬火脚無名指爲前屬火又觀人面
部五色與脚掌相應否可知誤服何藥心離宮正色紅
脚上亦相同若帶赤紫誤服熱藥腎坎宮正色暗脚上
亦相貫若帶黃色誤服散藥肝震宮正色青下面亦相
應若赤帶白誤服參著肺兌宮正色白下面亦相得若
帶慘暗誤服涼藥中央正色黃湧泉亦相當若見青色
誤服大黃此邵公言也其法絕奇可爲誤服藥之一
證亦見病無有不形於外者既知其誤則必有法治之
矣錄之以或前或後頭後頭項分七行中屬督脉惟兩
待善推者旁第二行屬膀胱經其餘第三行
第四行五行皆屬膽經頸前中行屬任脉二屬胃經三
行屬大腸經四行屬小腸經五行屬膽經六行屬三焦

經七行屬膀胱經項後中央屬督脉經也。胸腹之中

行屬任脉兩旁第二行屬腎經第三行屬胃經第四行

屬脾經乳下脇上第五行屬肝經脇後第六行屬膽經

脊外兩旁二行三行俱屬膀胱經脊之中行屬督脉經

膏前後或左或右男左旋女右旋。左心肝膽腎小

貼照此或左或右男左旋女右旋。左心肝膽腎小

央脾居胃右脾胃皆土俱從田字胃中故田字亦中脾

右故田字亦右雖俗字亦有意西法脾在胃左肝居膈

肉右方右靠腎而左或當或對如前後心相當膽眼或

枕胃與中國不同或當或對如前後心相當膽眼或

交或互如左病治右右病治左之類又如鼻衄白糯米

兩耳若耳聾塞兩鼻亦或上因下引即下治法。如治

互法也膏藥貼法全赤眼用生太黃生

南星醋熬膏塗足心或熟地生地草烏南星乾薑桂枝

末醋調如膏敷足心却用牛膝煎湯洗眼引下之按加

牛膝之法甚妙凡貼足心者可倣此用口瘡方見前

又有生硫黃硝石水麯調貼足心之法又有黃連黃芩

黃柏水敷足心之法。大吐不止附子煎湯抹足。小

便不通黃酒浸脚。百會疔亦用敷足法。餘見前不

或下以上取印上治法。凡升提之法皆是。如腰

又有香附生薑青鹽擦牙之法。又小便不通有探吐提

氣法。又脫肛有醬塗頂艾灸之法。膏做此用。餘見

前或相同而相感之類。又腫毒用棉裹鐵屑塞耳口含磁石

磁石頻頻吸之。吞針用磁石棉或相反而相應。如三

裏納下部自出。膏中調末做此。或相反而相應。反八

反膏治痞塊一切用葱蜜髓甲莧菜甘遂甘草杏仁木

龍仁熬貼之類。又通頂散用人參藜蘆之類。耳聾朝

用生地甘草麝脂包三分塞耳夜用甘遂葱白草烏棉

裹包三分塞耳數日効。治瘡甘草煎濃湯在瘡外圍

三次後另用醋調大戟荒花甘遂末夾其中勿近甘草

次日縮小再如前。寒自然焦落。此分用者也。葱蜜

膏治腦破骨折効。陰毒用附子肉桂川烏草烏甘遂

大戟荒花甘草乾薑各等分熬膏貼。福本集靈接骨

膏川烏草烏大黃當歸生地紅花大戟荒花甘遂甘草

劉寄奴紫荊皮靈脂地龍蟲雄鼠糞上肉桂山甲髮團

野麻根麻油二斤半桐油二十四兩熬加乳香沒藥血

結阿魏各一兩又桃柳槐桑枝各四十九寸另用地鱉

里會并之

臺

盡開楊花收膏。此合用者也。觀音膏。或始終單行

之飲甘草湯則內外用也。餘見篇中。一膏。或彼此兩借。其意觸處皆通。不必執定一症也。說

獨用。或新舊兼收。如治腫用樟腦三錢。銅綠一錢。猪油和勻。搗爛油紙夾貼一二日。翻轉貼亦是。松香膏見前

見篇。或新舊兼收。如治腫用樟腦三錢。銅綠一錢。猪油和勻。搗爛油紙夾貼一二日。翻轉貼亦是。松香膏見前

背面之類。又如治腫用樟腦三錢。銅綠一錢。猪油和勻。搗爛油紙夾貼一二日。翻轉貼亦是。松香膏見前

物以礫而得全功。以協而成和。黃丹協製以秘而能彰

脩合雖秘。法以周而益專。形附麗而不離。故親氣閉藏

其用則彰。而弗洩。故聚脉之流者。竅亦通焉。臭之入者。味亦滋焉

膏分門而類。應藥審因而特加。有搥錠以和。紫金

錠搥碎入膏之類。按紫金錠亦有五倍牙皂乳香

沒藥四味者。五毒錠雄黃硃砂膽礬礬麻麝香和捏

為錠治一切腫毒蟲蝎傷甚効。此方或加巴豆輕粉

潮腦乳香沒藥或加蜈蚣白丁香或加藤黃人中白自

及白蠟牛皮膠化開和錠全。或用蟾蜍麝香皂角明
礬四味或用雄黃硃砂京墨熊膽牛黃麝香六味為錠
全。又鹽水錠用火硝黃川皂礬雄黃硃砂風化硝後
投四味全。坎宮錠治熱毒并治痔京墨一兩熊膽三
錢胡連兒茶各二錢冰片七分麝五分牛黃三分猪膽
汁生薑汁醋和捏為錠全。白芨錠治瘰癧效生南星
生半夏各三兩海藻昆布各一兩冰片麝香各二錢紅
花牡蠣各二兩青鹽六錢共生研末以白芨半斤切片
熬膏和藥為錠聽用。凡錠皆可用牛有研末以糝
膠水白芨水和如醋磨圍膏外亦妙。

有剖丸而調如蘇合丸抱龍丸黎洞丸蟾蜍丸有煎油
活絡丸梅花丹之類無不可入膏。

而攪如丁香油蘇合有束素以厚其氣之類有縮金以
油薄荷油之類。

固其力如赤豆或白芨或白蠟末水調敷內外症皆宜
流注貼膏後必用敷圍藥方不走。鐵箍散治

癰毒并疔即蒼耳草灰芙蓉葉赤小豆末醋圍者亦有
金箍鐵井闌諸名。內府鐵桶膏治發背將潰已潰時

縮根五倍一兩炒白芨五錢膽礬三錢銅綠五錢明礬
四錢鬱金輕粉各二錢陳醋熬如膏調藥塗紙蓋上瘡

里禽獸文
裏

根白生纒紋收緊矣。○絳囊方治腫毒圍之即消已成
毒氣不走無膿長膿已潰膿即追出蓉葉四兩大黃一
兩黃柏或薑黃亦可白芨白飯五倍陳小粉有若罐拔
妙蠟殼焙各五錢醋敷三方皆效隨用
如疳疔取黃用藥筒有若瓶吸如風寒用熱燒酒空瓶
及風痛用火罐之類有若瓶吸如風寒用熱燒酒空瓶
擦破傷瘀血。○乳腫用瓦瓶裏煑火以葱白有若筆收
蓋面布扎倒執熨患處此法甚妙可做用
如一筆消鐵筆圈之類。○大黃藤黃明礬蟾酥香沒
藥乳香蝟牛搗爛為條遇毒醋磨以筆圈之日口小
并以筆畫引到別處消散或用蟾蜍麝香蝟牛搗爛為
丸硃衣水磨用全二方取蝟牛之性甚妙。○又治疔
走黃用倒回蟲亦妙此皆物理有若繩引青布捲為繩
宜推今人有以筆收腮毒者有若繩引燃置竹筒中
然火炷瘡口頻頻熏之引毒外出名布撚熏法如布捲
藥末治風氣腫毒亦妙二方皆引法一斜引一直引
也。○按輔膏之法甚多此有若帶繫寒腹痛鋪蔥艾熨
特取其新別者以待類推有若帶繫之再用帛三摺縫
慈艾繫於有若線扎鼻蠟方見前。○又如治紅絲疔用
腹上甚良有若線扎鼻蠟方見前。○又如治紅絲疔用

紅絲如由臂走至心由腿走入腹則難治矣 又先有
花壁錢煮線繫壓痛亦是并治尻骨生尾等異症 有
若丸搓之以鐵丸手搓 有若筒裏穿繩掛腰間坐時以脚

踏裏之有若礬之傾 虎狼咬傷白麪作圈護傷處白礬
一月效 一兩銅杓化開傾於圈內頃刻礬

化為水其毒即解甚妙 蜈蚣全蝎等傷 有若蠟之化
只用礬一塊燈上燒化滴於患處即解

即外科黃蜡灸法以蜡置患處麪圈護住火烘之蜡化
毒解治疔用白蜡全連根拔出此法甚佳然人怕痛故

無用者錄 有瓜合蒜鋪 治背發冬瓜切頂合背上瓜爛
以膏法 再切瓜完毒解凡熱病皆可傲

此又雞矢一升瓦罐煎以瑣帽一項棉胎一塊覆罐上
熏之輪流取覆患上亦妙。有鋪蒜艾灸法有貼蒜代

灸有鐵熨銅刮 王全生治陰疽用鐵鏡二塊石上煎熱
法有鐵熨銅刮 輪流順熨千遍自消又西法吐血有治

鐵熨背法一涼一熱用法迥殊可悟物理篇中采方多
如此亦欲人之隨症而變不拘於一也。銅錢刮頸治

喉症刮背治 有煖之以火 如日曬爐烘熨斗 有溫之以
疹症俱見前 熨火紙熏之類

湯如熱湯浸

有行之以酒

如以酒擦風氣之類。湯火傷冷燒酒澆之雞子清調塗

塗免起泡如渾身火燒者坐酒缸中此皆得酒之性者也。○西醫有鴉片酒斑毛椒樟酒

有走之以

鹽能走血或開竅有香

如冰麝沉檀

破結有辛胡

椒白芥乾薑官桂之類

有先而導有後而收有膏所不足者補之

有膏所未及者助之

以上言用藥輔膏之法。○按外科之升降二丹及刀針藥線之類皆

所以輔膏者也然能者亦可不用故不備載

主則護心客則驅外膚則清肺

骨則堅

腎肉則豐

脾

筋則榮

肝

橫者以折有餘萎者以

振不足

鬱者以宣

九氣

乖者以協

七情

泛者以歸吐血

停者以逐

痰飲

滿者以洩

腫脹

牢者以破

疔積

滑者以

留

精濁

阻者以行

婦月

逆上者

陰逆

為之降陷下者陷陽

也為之提即升也靈樞陷下者則灸之此是一法格於中者為之通三焦越

於外者為之斂元神險者移而居內科有移深居淺法由

科有移毒法○按移山過海散用雄黃小麥麩蜋醋

調塗患處白能移過不致命又移險膏用草烏南

星黃柏白芨各二兩五倍一兩醋塗全又痘症移毒

散用白芨一兩六錢紫花地丁八錢大黃五倍子炒各

二錢雄黃硃砂輕粉烏雞骨煨各一錢牙皂八分醋塗

上牛截即移至下半截而散凡毒生於骨節間者移之

免殘疾按古方有用地龍麝在經霜絲瓜內煨焦連

瓜為末者每用瓜末三錢乳香沒藥各五分雄黃一錢

麝香二分蟾蜍一分共研黃蠟丸如在上部要處用麻

黃桂枝甘草酒調三分服可移在手上而散在背用羌

活防風薑汁調可移臂在下部用木瓜牛膝靈仙陳皮

獨活薑汁調可移足其用地龍之法與前全可悟內外

用藥一理錄以備參觀此數方嘆古人用藥真奧者

有挽回造化之妙如能推之則天下無險症矣

隔而取內科有隔二隔三之治外科有隔皮取膿法

用驢子脚底剔下皮用砂炒一兩草烏四錢蕎

麥麴一兩末加鹽五錢糊餅炙研醋調攤貼腹從毛孔
出或從瘡旁出奇效又腫瘍將潰塗之膿從毛孔吸
出腐不盡者塗之立化木鼈仁十四個斑毛八十一個
柳枝四十七寸驢甲片三錢草烏一錢麻油三兩熬入
巴仁三個煎黑研泥加麝一分和勻收此方太峻存其
法以待增減按舊有巴霜雄黃冰麝加乳沒法可參
當生者能回內症如回生丹回陽膏之類見上。陽毒
末酒調餅蓋瘡上熨之微熱勿燙。起陰疽法丁香雄
黃艾茸煎乾搗敷如病而色轉紅活者可治。又陰疽
頭四沈點不痛不熱內補不發者宜用人牙同麻黃川
烏當歸木鼈仁山甲末以生薑汁和麴敷無人牙亦可
○疔有與回欲絕者可接內症如接命丹接命索之類
丹用鐵銹數欲絕者可接見前。耳鼻脫蘸髮灰安上
四圍將老薑嚼融厚敷紮縛自接。斷指蘇木末敷絲
棉裏或接梅香末參蘇藥裏縛白接。自刎者食藥在左
屬骨易接氣喉在右屬肉難接水膠頓化塗粘敷藥。
傷腹腸出麻油潤瘡口以通關散取嚏其腸自收以桑
皮線將腹皮縫合用封口散塗傷處外用藥敷貼封
口散卽乳香沒藥兒茶當歸杉木炭葛根葉各一錢麝

香五釐米片一釐也一切割喉斷耳缺唇傷破肚皮跌
破陰囊皆用此糝手足折者用生地一斤生薑四兩
搗爛入酒槽一斤炒熱布包熨傷科詳見內府正骨書
茲不備載○內府萬靈膏治跌打損傷消瘀散毒舒筋
活血止痛接骨如神兼去麻木風痰寒濕疼痛三日一
換白鳳仙紫丁香根酒當歸醋煨白然銅瓜兒血竭沒
藥各一兩川芎八錢赤芍二兩醋淬半兩錢一枚紅花
一兩川牛膝五加皮石菖蒲蒼朮各五錢木香秦艽蛇
床子川附子肉桂半夏石斛革薺鹿角各三錢虎骨一
對或用虎骨膠代之麝一錢香油十斤熬丹收細藥後
攪如腫痛者先用紫丁香根川芎當歸白芍官桂紅
花升麻防風三奈麝香蔥頭搗敷醋浸濕紙蓋上熨斗
熨之再貼膏換時有瘀血用番木鱉紅花猴薑半夏
甘草蔥頭醋煎洗後換膏貼○接骨神異膏用薑蔥韭
蒜槿樹皮各四兩麻油二斤猪油一斤大黃當歸桃仁
紅花川烏草烏羌活獨活赤芍蘇木骨碎補五加皮甘
松三奈浸熬另用油二斤煎亂髮一斤勿洗俟枯合前
藥為一鍋再熬下丹一斤收徐徐下提淨松香五斤末
收再下土鱉蠶炒黑四兩龍骨煨三兩血結一兩自然
銅醋煨淬乳香沒藥虎骨炙肉桂各二兩血結末另研

一兩攪勻。附方碎骨在皮內作膿者田螺搗爛加酒糟同敷四圍留孔骨自出再用藥接不以賤

而忽勝枚舉不以穢而棄類。如狗屎治膈猫尿治重癆之

塘難矢途之立刻止痛不作膿此症最難治故錄此以救急又如鼻衄不止用溺壺烘熱熏鼻牙疼不止用

溺壺烘熱熏耳又溺坑瓦糞坑磚起其痼而作其新皆可治傷瘍古方甚多舉此例推

培其虛而還其元以上合論內外膏藥功用以下則發明膏藥與湯藥殊途同歸之理

而實目見其可用者此說之所由立乃維膏與藥猶若一龍精神之所聚也於文則為大結

若臣經曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使占方有君臣散膏藥則以膏

為君而藥各分而理膏與藥各相得益彰膏得敷藥又為臣也自為川其用益彰

為體用因之闔闢變動不居廣大悉備因所感而悟從

入之機藥病先從皮毛入心所劫水火皆而信能應之故藥即可由此推

切於皮膚

切近也

徹於肉理

醫書云凡藥入胃由胃分布經脈在肉理之中藥之糟粕

焉能得到所到者氣味耳然則膏藥亦可到也

攝於吸氣

膏藥隨人氣之呼吸而入

融於滲

液

經曰五穀之津液相合而為膏內滲入於骨空補益髓腦下流於陰股膏藥貼久則與五穀之膏融化為

一矣○凡膏中川透骨草少許即能深入骨髓

導達匪由脾胃

膏藥不經脾胃故不致傷脾胃

既無傷水穀之精攻伐不連臟腑

醫書治表必連裏

亦免迫陰

陽之變

虛則生變

直而能致何慮乎氣之格

格者病氣與藥氣相拒也如藥

入即吐者是也

輕而可任

借用禮經輕任併字

何憂乎形之羸

醫書形羸不能服藥

治不其量度在當胸臂仲景之納餅

抱撲子仲景穿胸以納赤餅

其操

縱只舉手擬梁公之抽針

狄梁公善於針藥每治病抽針即愈

方寸有定

詎空洞之懸揣分明共觀奚隱曲之可欺

取諸已成

不勞以深文淺經於歷試毋煩避重就輕泥古者淺病好為深論起

時者重症但用輕藥皆醫之過疑可用之課候險可用

膏則人所常用只在臨症制宜之衝也以心之所生為主是求其原病未有不由心生

○經云治病必求其本註云謂但治其所生之本原則

後生諸病不治自愈惟中滿及大小便不通當治標耳

膏藥無論何病既隨其所見以治之皆當以一膏貼臍

中所以治其裏亦所以治其原也如七情總隸於一心

五志等以平心火為主諸痛癢瘡瘍皆屬心火亦可以見矣以身之所患為歸即適

其所經云適其至所謂適其病至之所而不可過也

所不能至者膏自虛入者此外叩從來於天牝經云天

藥固無不至也復得其往氣出於腦即不邪干註云天牝鼻也氣自空

虛而來亦欲其自空虛而去氣出於腦為嚏或張鼻泄

之則邪從鼻出也觀音救苦膏自內得者傷也保根本

有塞鼻法凡以膏塞鼻本此

於丹田

經云十二經脉皆係於生氣之原即下丹田也此藏府經脉之根本三焦之原內症俱宜貼此

又腦為上丹田心

衛中州之營運有干城之象焉

脾為

中州經絡之氣皆交歸於中以營運真靈之氣者也人以胃氣為本膏藥補法在借胃氣故無論何病總以一膏先顧脾胃使脾能健通則飲食增而精氣自足雖有外侮亦可禦矣此干城之義也

司關門之

輸泄有掌管之思焉

腎者胃之關腎不能司胃之關時其輪泄而病於下凡欲補火以生

上而行者皆當以一膏治其命門俾輪泄以時則諸病皆安矣腎位在北故用掌北門之管語八句分上下

前見微則預絕渾乎先調後調

經云從內之外而盛於外者先調其內而後治

其外從外之內而盛於內者先治其外而後調其內中

外不相及則治主病主重也膏藥見病則治無所隔礙

可以防微杜漸預為消得熱則皆行統乎正治從治

經

弭而渾乎先後之迹也

熱者寒之寒者熱之是正治也又云治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之是借熱以行寒借寒以行熱即

從治也膏藥貼後無論寒熱皆可以熱手摩之則氣易透寒症則以熨斗熨之偏藥氣入內如前治瘡病用平胃散敷法最妙蓋得熱則行也艾火能透諸經而治百病外科以火攻火毒隨火化其意如此敷藥忌寒涼亦全

岐之弗乖

可並用雖兩歧而無所乖戾也類磁珀之

並引

磁石引針琥珀拾芥

併之無犯

併合併也經曰補

其留布上部也補下治下制以急欲其直達下焦也又云治上不犯下治下不犯上治中則上下無犯誅伐無過是為大惑膏藥則上下緩急可各用雖合併而無所侵犯也按上熱下寒及丹田有熱胸中有寒者又上虛則眩下虛則厥者又上實下虛同韋弦之各佩韋性者又下虛中壅者治法並可推

急氣以開提而外泄非啟之反入於深

膏藥能拔病氣外出○今人治

心病者用心經藥往往

勢以拘伏而內平非壅之還決

於後膏藥能抑邪氣內銷○經云必伏其所主而先其所因此伏字所本○今人治血病者用藥過之兩

終必致橫決膏藥不中截以斷其路分殺聲以散其部

攻實者易為力不妨用全以克之有用加倍重藥劫之者有一身即數膏者

有膏外再加敷藥者所謂全力也補虛者難為功亦可加厚以護之上全

勿竊遺篇而貌虎賁勿據專門而局轅下始於一而終

於九流散之數操以總經曰天地之數始於一而終於九數之可十推之可百千萬然

其要一也知其要者一言而終不知其要者流散無窮膏藥能治百病探陰陽之總木似金而火

似水變遷之道寓乎通物極則反原病式序云木火水金土

變原生我以逮我生相及者母子之義故膏宜該貫滙

勝已而兼已勝合同者甲乙之源古方甲已乙庚日單

日引加藥仿此是一是二損益皆能共信雖事怪症因舊藥發作變異

名而心可安用舍并任自為膏藥雖貼後去取即情失

而責亦薄變古實承夫古千金外臺皆是我師古方之峻厲者

人多不敢用矣為增減則失古人之意而用之亦多不效今本以合膏藥適得其平而古方之妙益顯是非變

古正是遲時不忤乎時渤海咸陽各行其道渤海謂扁鵲咸陽謂

秦太醫李謚蓋忌扁鵲之技者膏藥高醫飲者苦而彈

者痛見韓非子其孰能堪痛為劇見藝文志而壽為殤呂氏春秋

不變向之壽民又何以解茲則義取小心孫真人云膽

今為殤子矣術歸無弊顏洪都之兄奚傷

語醫之寶訓實本淮南死乃服藥多而傷五臟也今人鮮悟此理者特引為鑒

邵康節之妹焉恨邵康節先生之母李夫人病瘦醫下

藥夫人如期生康節同墮死胎女後

李夫人夢一女子拜泣曰母不察庸醫以藥毒兒稚齒可恨此事亦今所常有膏藥先註孕忌人皆察之稚齒

固妙衰齡愈宜

小兒老人不喜服藥者多又臟腑嬌嫩精血耗竭皆不堪攻伐傷人產婦用藥

更難古人所以出外治一方也今人自矜湯藥遇此等症每有失手者何如參用外治與雖非良工

之所貴而儼為吾黨之所許

自來文人每好言醫以其泛覽所及多明於內經之

肯外治一陰一陽之為道豈師陰而無陽莊內取外取亦本經

求其過胡務內而遺外加以飲食自調

詳見食物本草食醫心鏡及經

驗良方等書蓋病家必須忌口又喜補益者多以此治病兼以養生真兩得之術也。按經曰毒藥攻病五穀為養五果為助五畜為益五菜為充又云穀肉菜果食養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法謂病之有餘未盡者則當以穀肉等盡之亦不可過也起居復慎此可為飲食自調之法。飲食方另有編

縱無參苓之預蓄不虞沈痼之久嬰

以上總結膏藥干戈未靖

鄉村尚淹瞻望北斗懷想西湖愁聞庾子哀賦怕覽陶

公歸辭案有醫書庭多藥草幸晨夕之閒暇借方技以

銷磨地去一二百里人來五六十船

余曾於一月中治二萬餘人遂得心

疾力却不診者數月今但日限以百人而已

未挹上池之水

扁鵲事

空懸先天

之圖

見前脉理幽微註

笑孟浪而酬塞

簡文勸醫文理疾者衆必孟浪酬塞誤人者衆

愛人者鮮句自謂

愧不良而有名

物理論醫有名而不良者有無名而良者

徒以肺

腑無言

古諺肺腑而能語醫師色如土

且託毫毛是視

扁鵲云仲兄視毫毛

浮沈

遲數之不明

余不切脉

汗吐下和之弗問

余不處劑

或運以手

趙見

壹傳或點其背

見華佗別傳

膏既分傳藥還數裊愛我者見而

訝之思我者聞而議之然而非蕭敵魯之明醫詎能知

病遠史蕭敵魯明於醫望形色而知病所在比羊叔子之饋藥要不酖人羊晉

祔傳寄諸遠道偶同段翳之緘封後漢段翳治易有學生辭歸翳合藥并簡書封

於筒中告曰有急當視之到葭萌與津吏爭舟槌從者頭破發取膏藥敷之而愈平以數旬非

必陳珪之縫合魏志陳珪精於方藥有疾結於內針藥所不及者先令以酒服麻沸散既醉無

所覺因割破腹背抽割積聚若在腸胃則斷截去疾穢既而縫合傳以神膏四五日瘡愈一月之間皆

平復按今之傷科尚有其遺法特內科不能耳一作華陀時無上工十全聊作窮

鄉一劑卽或我術非誣人言各異謂臣意之未精云扁

鵲之最下皆見本傳恐受季長之紿唐書方士孫季長紿李抱真鍊金丹曰當昇仙

慮遭申受之謬邵伯溫聞見錄趙諫議病申受舉郝老治之藥劑苦大趙不能禁乃呼申受責

之曰君謬舉郝老者由是死生所寄疑信相參占易而誠知有喜

觀書而又懼弗殄乍馳想於九轉之丹倏迴思乎五分

之熨斯膏也既並行不悖斯藥也亦相與有成況當豎

人膏盲姬避靈府

許智藏傳秦孝王病夢亡姬曰智藏將至當爲所苦既而曰妾得計矣入

靈府以避之智藏至曰疾已入心卽當發癰不可爲也

醫皆束手藥難下喉宵長

兮爐冷人靜兮燈昏犬鳴咽於庭中鳥啁噍於屋上共

憐待斃之形莫冀返生之路季梁之子環而泣陽里之

妻析而請

註皆見下

則是膏與是藥不能造命猶可盡人一

息尙存其機竟轉此非獨儒門之所求事親

張從正著儒門事親

而亦太上之所云濟人者也

以上治驗○一層膏藥可代湯藥二層膏藥可與湯

藥並用三層湯藥不能用尙可以用膏藥也

膏施數載說成一篇援古方以

為證述用法之不同論症則重於內言治則專於外屏

耳目之剽襲憑胸臆而結撰文約其大文中所列方不

撮其要藥一二味以為註覈其詳傷寒大症應博觀諸

題以明虛實寒熱而已家書故不具載其餘

除藥味外有辨症者有與內治方相北附者有彙集諸

家而刪節補綴之者有敘其始末而自為一論者皆以

補文中之精者載於文又素鮮外治方者又有舉一而

未詳也可概其餘者襍者存於註凡症類多者及外科方皆列

皆載之文中取以備高手之選用其中未免龐雜俟他日刪繁就簡

前行重刊其自製膏方亦皆列於註內者不敢自信而

待折衷於君子也根柢往訓醫理皆標揭來例每症各有數語

惟羞同不為湯頭歌字不忌複如虛實寒熱及熏洗敷

詔助不能改也羅散佚而使聚諸書從前未有集者扶幽奧而

令顯

春風散諸方亦未

詞空理實論常慮別

四診為醫

治則別有心思如窺其性懷及十二經八十數

博其類

如搗松香起

推闡以昭其義

維膏與藥起至不

截割雕刻以為偶銜接聯貫而成章變叔庠采藥之篇

吳均有學簡文勸醫之作

簡文有勸醫文是駢體大旨

采藥篇之要實在良方本不素習卒難改變思不出位事局輟

下欲求反死者於元都揚已名於綠籍其可得乎○此

必醫者之知其說也與簡文之勸醫異

魏文帝典

醫不拘法觀法而明

其意則無法有法自可忘筌

曾其意則觸處皆通古人

以也醫家亦

藥豈執方得方而善於療則有方無方奚

庸膠柱

即圓神之神旨

自慚拾燕石之遺詎比探龍宮之祕

孫真

人有龍宮祕方

譬之製錦以章身而非適口如彼爲兩欲美已

而恐傷人

美已二字本河間語

固知違道從新或乖聖法亦謂去

疾就安卽爲良方

語本內經註

視急救之編均足應於倉卒

擬元詮之刻

醫書有勿藥元詮明養生之理又云有人素不服藥者不爲無見

不更涉

於虛無其體略近於醫方考藥性賦其功實抵於行軍

散救苦丹雖張園而冀偶遇究勝於終朝之不獲也

唐書

諸氏曰今人莫識病源以情度病多其藥味以倖有功
善知病不知免廣絡原野冀一人獲之術亦疎矣膏藥
治病亦類於是然此中稍有分別在縱緣木而惜空求亦未至後日之有

災也是可以廣金匱之鈔

葛洪有金匱方鈔

而不必效青囊之

焚者已

華陀以青囊書與獄吏曰此可以活人吏畏法不敢受陀索火焚之○以上刊方以下乃自述

其事母學醫為人治病傳家示世與辨所以醫治之意亦古人篇終序志之義也

嗟乎金液徒

聞玉版空在

素問有三醫之謁誰是神手

列子季梁得疾其子環而

泣季梁令揚朱歌以曉之其子勿曉終謁三醫○一藥

三醫者矯氏衆醫也俞氏良醫也盧氏神醫也

之悞每欲噬臍

孟堅語

夙披古籍仰企前脩李元忠研習

積年

北齊書李元忠以母老多疾乃專心醫藥研習積年見有疾者亦不問貴賤皆爲治療

高若

訥兼通諸部

宋史高若訥因病遂兼通醫

慨此事之難知覺而方之

非是

而汝也史記慶謂意曰盡去而方書非是也

昌陽豨苓欲反韓公之論

韓文嘗醫師以昌陽引年欲進其豨苓也

楮實薑豆恨乏廷紹之才

南唐吳廷紹以

楮實治烈祖喉癢薑豆治馮公腦痛羣醫誌其方他日效之多不驗廷紹曰烈祖餌金石不吾以木之爲勝之木

旺則金絕矣馮公好食山雞鷓鴣二鳥皆食烏頭半夏
吾以薑豆解其毒耳羣醫大服此不獨得醫理亦微博
物因思合歡蠲忿萱草忘憂見博物志博物者詎必應病投

藥艾炷灸額瓜蒂散鼻隋書麥鐵杖對知名者何曾診

脉處湯四字見周書是以慕元化之術華元化有神膏傳神膏於漢

季不復避韓皋之諱嫌膏硬於天寒韓皋有疾令醫治之醫曰天寒膏硬

寒膏與韓皋同音嫌名也今夫懾於勢者必不能盡其意狃於習者

亦無以得於心是以郭玉治病多在賤貧郭玉治病於貧賤厮養必

盡其心而醫療貴人時或不愈云有四難元素處方自為家法張元素字潔古試進士下

第乃去學醫其治病不用古方自為家法云老幼各塞門而來庭前擬列竈

之煮侯鯖錄王彥伯醫名既著列竈於庭者煮藥老幼子塞門而來請効者負錢而償不來者亦不責之

里會年二

孫當濟世以術壺中想鏡經之傳

南史張融傳秦望山道士以一葫蘆與徐

熙曰君子孫當以道術濟世熙開之得扁鵲鏡經一卷遂精心學之至子秋夫彌工其術按徐熙錢塘人

且夫大賢任運常闔戶而集方隱士逃名罔入市而賣

藥是以宣公之五十篇樂示於鄉人

陸宣公有集驗良方五十篇示鄉人

伯休之不二價羞呼於女子

漢逸民傳韓康賣藥於長安市口不二價有女子從

康買藥曰君是韓伯休耶乃不二價乎康曰女子亦知我名遂入山

然則非纂鴻烈之解

何用赴淮南之招不懸君平之簾奚事居成都之肆

時居

泰州東鄉

厯稽往事可證今情聊假述懷匪矜數典大抵優

絀無憑成敗有據斗火盤氷同歸於是

方勻泊宅編蜀人石藏用偏於

熱餘杭人陳承偏於寒而皆有名著於時人語曰藏用膽頭三斗火陳承篋裏一盤氷此言醫不必存南北之

見鍼石精藉所收維鈞淮南子病者寢席醫之鍼石巫之精藉所救鈞也病家信巫

不信醫者有之此言醫之知我者當更教以精審之用

外治與巫之不服藥同也孫真人初爲千金方後三十年復作千金翼用志精

志審不苟如此茲篇迫於時事倉卒付刻自知粗略多

所訛繆有駁正篇嗣出皆承教而勿第强爲寂寞之解

嘲楊子或謂審言以詩名之孫曾許身稷契安仁有母

惟稱壽家園見安仁賦何弗出而軫乎黎元杜窮年入而

聯乎斑白安仁賦兄弟斑白兒童稚齒稱萬壽以獻觴

十餘故序口知命之年賦曰兄弟按安仁作閒居賦時年五

斑白也余與仲弟今亦皆斑白矣顧甘賤役自擾閒居

豈欲附於名姓物理論古用醫必選名姓之後而妄冀於神仙乎葉夢

脩道養生者必有陰功協濟而後可得成仙思不知幼

邈之書天下以爲司命也其爲神仙固無可疑

艾保延

宋王微茯苓贊

亦關民事井里親睦彌悅慈顏思構大

厦者

杜詩方今廊廟具構厦豈云缺葵藿傾太陽物性固莫奪

語以張里之擊鐘

漢書

張里以馬醫而擊鐘

奚必已羞與為伍也幸御板輿者

安仁賦太夫人乃御

示以銅川之述方

文中子銅川夫人好藥子始述方

豈得曰未暇斯

務也矧猶有論病以及國者焉

藝文志論病以及國原胗以知政

且亦

有因藥以養親者焉茲乃傳非三世搗只一人

龔慶宣鬼遺方

序云劉涓子於丹陽射一物尋其踪跡至山下聞搗藥聲遙見三人一人卧一人閱書一人搗藥見客皆走道

一蠱疽方與一

重不逾乎半兩

錢名○膏藥重不過數錢

惠比散金

小僅限於寸紙義均焚券

朱清居善藥人不持錢者亦與之歲終度不能償焚其積

竊欲以抒難之懷救患之誼并屬望於儒之聖

倉公傳其

人聖財之雄矣李杲以則或又謂靈素之書久為河

漢張孫之學多視同鑿柄胡不以家之名士作古之功

臣推簡尋篇別著明解懸衡立矩獨表正傳而乃自執

偏見好為新語欲使萬金之品但付手揮九折之功惟

從膚治

見石室秘錄

則是麋蕪藁本不必盡辨其真

淮南子夫亂人

者芎藭之與藁本也蛇床

之與麋蕪也此皆相似也漆葉青麩無庸更求其益有

陀求方可服食益於人者陀授

以漆葉青麩散服之壽百歲何能折彼探丸徒爾貽

其獲甌不知曩所未達

仲景書為撰次詮註者失其真

今豈可加心本

無解口奚能宣沛公之性知不免謾罵

高祖疾甚呂后欲迎醫高祖罵

曰命自在天雖福

張湛之筆任目為游戲

見前眼病註

亦惟

是期潤色於桑氏

張子和書為儒生桑氏所潤色

要未敢效竊撰於高

陽矣

高陽生竊撰脈訣託名叔和反掩叔和之真云

懿夫掌醫師而各供其事

功全於可療難療之間

內外治咸備

此

盛世之所以同登

於仁壽也至於舍藥石而默化其心神運在有意無意

之際

并無外治

殆魯生之所以莫知其施為乎

應首意療○列子華子中

年病忘魯儒生自媒能治其妻願析產而請其方儒生曰此非藥石之所攻吾試化其心屏左右獨與居室七日莫知其所施為也而積年之疾以除○按仙經曰古

神聖之醫能療人之心預使不致於有疾今醫惟知療人之疾而不知療人之心是猶捨本逐末不通其源而

攻其流欲求疾愈不亦難乎此可與魯儒事相參皆上一層之說也○又列子魯公扈齊趙嬰二人有疾同請

扁鵲求治扁鵲謂公扈曰汝志彊而氣弱齊嬰志弱而

氣彊若換汝之心則均善矣遂醉以酒剖胸探心易而置之此雖寓言可悟醫因人而治而使各歸於善之理

○附施濟驗方○清陽膏治風熱第一凡頭面腮頰咽
 喉耳目鼻舌齒牙諸火及三焦實火口渴便秘者又時
 行感冒傷寒瘟疫熱毒結胸症中風熱症鶴膝風等一
 切內癰外癰丹毒腫毒凍瘡發熱濕熱流注腸痔並畜
 血症胸腹脹痛者婦人熱結血閉小兒驚風痰熱痘後
 餘毒爲患皆可貼孕婦忌如不得胎處亦可貼下全
 老生薑蔥白連鬚韭白大蒜頭各四兩槐枝柳枝桑
 枝各連葉二斤桃枝連葉半斤馬齒莧全用一斤白鳳
 仙花莖子葉根全用半斤蒼耳草芙蓉葉各半斤小蘇
 油五斤先熬炒黃丹妙鉛粉收聽用元參苦參生地
 常歸川芎赤芍羌活獨活天麻防風荆穗葛根連翹白
 芷紫蘇柴胡黃芩黑梔仁黃柏知母桔梗丹皮骨皮
 黃連花粉鬱金赤苓枳實麥冬銀花甘草龍膽草牛子
 杏仁桃仁木通車前子五倍子山茨姑用山豆根代紅
 大戟芫花甘遂生半夏大貝母橘紅陳膽星升麻白菊
 花石莖蒲赤小豆皂角木鼈仁草麻仁山甲鼈甲蟬蛻
 僵蠶全蝎石決明細辛羚羊羊大青麝皮香附白芨白斂
 各一兩草烏官桂紅花蒼朮厚朴木香各五錢薄荷四
 兩大黃芒硝各二兩犀角片三錢髮團一兩二錢小磨
 麻油十斤熬炒黃丹六十兩收加生石膏八兩飛滑石

四兩廣膠二兩乳香沒藥雄黃青黛各一兩輕粉五錢
冰片油或薄荷油二三錢攪兩膏合併捏如雞蛋大者
數十團浸水出火毒每用以一團隔水化開量大小難
○散陰膏一名陽烏膏治寒濕第一凡風寒濕痺筋骨
疼痛及一切氣血痰凝滯陰酸漫腫疼痛腎虛腰痛
受寒腹痛與跌撲閃挫諸痛又瘧疾火衰泄瀉脾虛久
痢疝氣凍瘡陰疽等皆可貼孕婦酌老生薑葱白韭
白蒜頭白鳳仙花莖子葉根全株桑枝槐枝柳枝各一
斤桃枝八兩乾柏葉艾葉各四兩小磨麻油五斤熬炒
黃丹收白芥子川椒末各二兩乾薑炮薑末各一兩攪
聽用生白附子四兩生附子生川烏生草烏生大黃
各三兩蒼朮甘遂生南星生半夏川芎當歸麻黃各二
兩天麻荆穗防風紫蘇細辛甘草羌活獨活蝎尾陳皮
赤芍白芷紫荊皮石菖蒲靈仙草麻仁木鼈仁乳香沒
藥骨碎補續斷官桂廣木香延胡靈脂白芨白斂殭蠶
皂角炮甲桃仁紅花白然銅煨蛇蛻露蜂房乾地龍杜
仲香附木瓜五加皮雄黃明礬蕪木遠志烏藥牛膝蛇
床子秦艽各一兩薑厚朴五錢蠶砂一兩六錢髮團二
兩四錢小麻油十斤熬炒黃丹六十兩收加提淨松香
入兩赤石脂煨二兩陀僧陳石灰炒鹿角膠或用廣膠

代各區兩蘇合油樟腦各一兩攪與前膏合併難
方治風氣痛貼膏後可用太乙鍼藥末卷紙撚點火熏
之或桑枝扎把燒熏亦可或炒蠶砂或炒花椒熨之
治三陰瘧膏上慘靈仙肉桂吳茱萸丁香白胡椒末貼背
後第三骨節下火衰泄瀉慘肉蔻仁末貼命門穴痢氣
慘川棟荷香末貼臍下治濕痰流注等貼膏後外用
白芨磨生薑汁圍之則不走陰疽全舉此三法例推
○金仙膏本古開鬱消積和中諸方而推廣之能祛風
寒化濕熱並行氣血痰食凡咳嗽哮喘惡心嘈雜噎氣
吞酸嘔吐噎膈痞塊積聚腫脹黃疸瘡疾水瀉痢疾淋
症疝氣脚氣一切利肺平肝調胃健脾皆妙并治心腹
脇肋諸痛周身走注氣痛乳塊腹癰腫毒初起皆可消
散尋常飲食不甘以此寬胸進餐勝服神曲檳榔之屬
治症甚多不能盡述衰年小兒俱可貼婦人兼有解鬱
調經之功跌打損傷行瘀止痛亦効此方具理氣理
血升降之用孕婦忌貼前有安胎諸膏最穩生薑葱
白韭白蒜白各一斤白鳳仙花莖子葉根全株槐枝柳
枝桑枝桃枝側柏枝各半斤蘿蔔子白芥子山查子蘓
子艾葉花椒菖蒲各二兩陳香圓一兩小磨麻油五斤
熬黃丹炒三十兩收白朮四兩大黃蒼朮二兩生香

附醋香附生靈脂醋靈脂生延胡醋延胡川芎白芍當
歸柴胡薄荷羌活獨活防風白芷杏仁神麴麥牙陳皮
半夏大貝母膽南星前胡鬱金烏藥蒲黃炒赤苓澤瀉
條芩黑山梔川烏草烏桔梗甘草枳殼枳實萸仁大戟
皂角官桂檳榔黃柏青皮木香靈仙砂仁川棟赤芍桃
仁紅花沒藥乳香三棱莪朮煨廣藿梗良薑小茴草果
仁連翹僵蠶全蝎木鼈防已山甲木通車前子明雄明
礬降香益智仁吳萸黃連細辛茵陳車麻仁厚樸葛根
生巴仁甘遂羌花黑白丑陳壁土輕粉葶藶各一兩小
磨麻油十斤熬炒黃丹收飛滑石六兩牛膠四兩攪與
前膏合併以油少酌加寒症可加肉桂丁香隨症用
○雲台膏一名夔膏言一已足也通治發背搭手對口
髮疽頸癰乳癰肚癰腰癰一切無名腫毒爛腿膝瘡等
症初起消腫已成潰膿已潰斂口不假刀針升降爛藥
始終只用此膏極為簡便神速且能減痛可以眠食放
元氣不傷虛人卽不託補亦愈爛腿有水者用燥藥收
水再貼陰疽勿用孕婦酌用此膏拔毒氣於無形而
又攻補並進故能消能潰能斂潰後雖眼小如豆不必
然藥線入管而膿自出有腐肉者亦自然剝離消化無
須鉗割有骨者亦能推出與舊傳外科治法迥然不同

大約症愈重則愈見力量雖久潰無不收口又如狗咬
者貼之則爛爛而仍自收口並無得餘可見矣至敷藥
參藥乃與此膏相輔補荳蔻蒜槐柳桑蒼耳鳳仙各四
兩生大黃五兩木鼈仁三兩元參生地忍冬藤生甘草
南薄荷土貝母朴硝各二兩生黃耆當歸各一兩五錢
赤芍川芎白芷苦杏仁生草烏生南星生半夏生黃柏
殭蠶生山甲蜈蚣全蝎露蜂房有子者蛇蛻蟬蛻漂銅
綠銀珠枯礬製乳香沒藥明雄牡蠣草麻仁生饅蟾皮
各一兩五倍輕粉各五錢丁香四錢髮團二兩小磨麻
油八斤熬炒黃丹四十八兩炒鉛粉一斤松香提白入
兩黃蠟陳石灰炒陀僧各四兩樟腦蕪合油各一兩大
蜘蛛十个焙燥研末攪或加羌活防風連翹蒼朮香附
陳皮花粉各一兩黃連細辛紅花官桂各五錢敷藥
大黃八兩五倍礬灰花粉白芨香附蓉葉木鼈仁各四
兩草烏南星各二兩共末以醋六七斤入皂角四兩同
熬去皂角下陳小粉炒黑一斤再熬一時和前藥為錠
聽用如加蒼耳草灰四兩更妙熱痛甚者用猪胆汁或
雞清和醋磨敷餘用葱汁和醋磨敷須留頂潰後亦可
用此圍并圍痰毒跌打傷均效如欲移毒滿敷可偏入
下截出頭全又腫毒勢甚者膏內參龍虎散貼未潰

可破頭已潰可拔毒毒盡自收口其藥用蜈蚣十條焙
蟾酥三錢全蝎七個大山甲炮七片土貝母雄黃各二
錢公母丁香製乳香製沒藥硃砂樟腦輕粉冰片各一
錢麝香五分鳳仙子十四粒共研細末磁瓶裝好聽用
如倍冰麝加殭蠶蜘蛛焙各七磁石一錢犀黃五分全
又疔毒重者膏內糝黃丸子末貼可拔毒其藥用提
淨松香四兩草麻仁二兩石上同搥干徧入銀珠明雄
各二錢漂黃丹五錢輕粉一錢蜈蚣焙一條共末扯拔
十徧用蝸牛或蟾肝丸聽用亦可合龍虎散同用貼後
疔化為膿有長條硬膿出即疔根也疔出後只用龍虎
散糝膏貼收功如紅絲疔以磁鋒割斷絲路再貼膏
○催生膏治交骨不開及各種難產大龜全個初死
者佳頭足血肉俱用約十兩外者無用生龜板一斤代
以小麻油二斤熬去渣炒黃丹十二兩炒鉛粉四兩收
每用四五錢皮紙攤貼臍上外用車前子四錢川芎當
歸各三錢冬葵子二錢枳殼白芷半夏白斂各一錢研
末麻油葱汁各一大鍾調藥敷於膏外紙蓋布扎令產
婦平身安睡睡醒即生蓋睡則陰氣復母子皆有力也
○按前四膏皆日日施濟用者症候雖多大約虛症外
以此四膏治者十有七八催生亦驗十七人故特錄之